

1907

BIBLIOTECA DELLA R. CASA
IN NAPOLI

N.° d'inventario 122 108
Sala Grande
Scansia H. Palchetto 1
N.° d'ord. H 3



Digitized by Google

Pal. IV 2.

547590

FLORA

DEI LIDI VENETI

DI

G. RUCHINGER

GIARDINIERE DELL'I. R. ORTO BOTANICO

DEL LICEO DI VENEZIA

Biblioteca Nazionale
FONDO
PALATINO
Napoli

IN VENEZIA

PRESSO GIO. GIACOMO FUCHS

Dalla Tip. Picotti, 1818.

Digitized by Google

OPERE CITATE.

Barr. ic. Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae a I. Barrelliero, fol. Paris, 1714.

Bauh. Hist. Historia universalis Plantarum, Auctoribus I. Bauhino, I.-H. Cherlero, D. Chabreo, vol. 3, fol. Ebrodum, 1650-1651.

Diet. Lex. Lexicon der Gärtnerey und Botanick von F. G. Dietrich. Berolin vol. 10. 8.vo.

Donat. marin. Della Storia naturale dell' Adriatico di V. Donati, 4.to Ven. 1750.

Fuchs Hist. De Hist. Stirpium etc. fol. Basil. 1542.

Ginan. op. post. Opere postume del co. Giunani, fol. Venezia, 1755.

Linn. Sp. pl. Caroli a Linnè Species Plantarum, vol. 2. 8.vo Holm.

Ejusd. *Syst. Nat.* Systema Naturae et XIII. a Gmelin, tom. 2. 4.to, Lyon, 1797.

Matth. Piet. And. Matthioli nelli sei libri di P. Dioscoride, vol. 2. fol. Ven. 1604.

Pers. Syn. Synopsis Plantharum curante. C. H. Persoon, vol. 2. 16.mo, Paris, 1805-1807.

Röhl. germ. Deutschlands Flora von J. C. Röhling, Frankf. 1813.

Roth. cat. Catalecta botanica ab I. W. Roth. vol. 3. 8vo, 1797-1806.

Ejusd. *neue Beitr.* Neue Beiträge zur Botanick von A. W. Roth. 8.vo, Frankf. 1802.

Sav. Bot. Etrusc. Botanicon Etruscum ab C. Savi, 8.vo, 1807.

Ejusd. *Mat. med.* Materia medica Vegetabile Toscana di Gaetano Savi, fol. Florent. 1805.

Ejusd. *Obs.* Observationes in varias Trifoliorum Species, 8.vo, Florent. 1811.

Schreb. Gram. Beschreibung der Gräser nebst ihren Abbildungen von I. C. D. Schreber, fol. Lips. 1769 1810.

Schult. aust. Osterreichs Flora von Schultes, vol. 2. 8.vo, 1814-1815.

Tratt. Fung. Fungi austriaci ab L. Trattinick, 4to, Wien. 1805.

Wulf. Crypt. Cryptogamia aquatica ab X. Wulfen, Lips. 1800.

Zannich. Ven. Istoria delle Piante che nascono nei Lidi intorno a Venezia di I. *Zannichelli*, fol. Venetiis, 1735.

MONANDRIA

MONOGYNIA.

SALICORNIA. (Glasschmalz) Salicornia.
Cal. ventricoso intero. *Petali* o. *Seme* 1.

1. *S. fruticosa*. (Strauchartiges G.) S. frutescente.
Fusto dritto fruticoso. *L. Pers. Syn.* I *p.* 5. *Röhl. germ.* II *p.* 90.
S. geniculata sempervirens. *Zannicheli Ven. icon. tab.* 32.
Nasce abbondantemente nei luoghi detti comunemente Barene; *fiorisce nei mesi* d' Agosto *e* Settembre.

2. *S. herbacea*. (Krautartiges G.) S. erbacea.
Fusto erbaceo allargato, articoli compressi nell' apice, smarginato-bifidi, spighe ascellari opposte picciolate, squame ottuse. *Pers. Syn.* I *p.* 5. *Röhl. germ.* II *p.* 90. *Schult. aust.* I *p.* 4.
S. geniculata annua. *Zann.. Ven. ic. tab.* 33. *f.* 11.
Cali geniculatum sive Salicornia .*Bauh. Hist. tom.* III *p.* 705. cum icone.
Kali geniculatum. *Barr. ic. tab.* 192.
Nasce nei luoghi detti Barene; *fiorisce nei mesi di* Luglio *e* Agosto, *ed è* annuale.

DIANDRIA

MONOGYNIA.

LIGUSTRUM. (Hartriegel) Ligustro.
Cor. 4 fida. *Bacca* con quattro semi.

L. vulgare. (Gemeiner H.) L. volgare.
Foglie ovate acute, pannocchia con fiori approssimati. *L. Pers. Syn.* I *p.* 8. *Röhl. germ.* II *p.* 81. *Schult. aust.* I *p.* 15. Ligustrum. *Zann. Ven. p.* 164. *Bauh. Histor.* I *p.* 528. cum icone.
Ligustro. *Matth. p.* 187. cum icone.
Nasce intorno il luogo detto Malghera *e nel* Cavallino, *nelle* Siepi; *fiorisce nei mesi di* Maggio, e Giugno, *ed è* frutticoso.

ORNUS. (Waldesche) Orno.
Cal. 4. partito. *Cor.* 4. partita con petali bislunghi, lineari. *Filamenti* lunghi. *Noce* alata.

O. europaea (Europäische W.) O. europeo.
Pers. Syn. I *p.* 9.
Fraxinus Ornus. *L. Röhl. germ.* II *p.* 91. *Schult. aust.* I *p.* 81.
Fraxinus tenuiori et minori folio. *Bauh. Hist.* I *p.* 177. cum icone.
Nasce in Campalto *e* Treporti; *fiorisce il mese di* Maggio, *ed è* arboreo.

VERONICA. (Ehrenpreis) Veronica.

Cor. col limbo 4. partito, colla lacinia inferiore minore. *Cass.* di due cavità.

1. *V. spicata*. (Ehrentragender E.) V. spicata.

Spiga terminale, foglie opposte intaccate ottuse, nella cima interissime, fusto ascendente semplicissimo. *L. Pers. Syn.* I *p.* 10. *Röhl. germ.* II *p.* 82. *Schult. aust.* I *p.* 15. *Savi Bot. Etrusc. p.* 1.

V. spicata minor. *Zann. Ven. ic. tab.* 73.

V. spicata recta minor *Bauh. Hist.* III *p.* 282. cum icone.

Nasce nel Cavallino *nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

2. *V. Chamaedris* (Wald E.) V. dei boschi.

Grappoli laterali, foglie ovate sessili rugose dentate, fusto munito di due serie di peli. *L. Pers. Syn.* I *p.* 12. *Röhl. germ.* II *p.* 85. *Savi. Bot. Etrusc. p.* 13. Chamaedris spuria latifolia *Bauh. Hist.* III *p.* 286. cum icone.

Nasce in Campalto *appresso le* Siepi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* perenne.

3. *V. agrestis*. (Aker E.) V. campestre.

Fusto giacente, foglie cordato-ovate intagliate, più corte del peduncolo richinato. *L. Röhl. germ.* II *p.* 86. *Schult. Aust.* I *p.* 29. *Savi Bot. Etrusc. p.* 14.

V. flosculis longis pediculis insidentibus, Chamaedrios folio. *Zann. Ven. p.* 274.

Alsine serrato folio glabro. *Bauh. Hist.* III *p.* 366. cum icone.

Nasce comunemente negli Orti; *fiorisce nei mesi di* Marzo *e* Aprile, *ed è* annuale.

4. *V. serpyllifolia* (Quendelblättriger E.) V. a foglie di Serpillo.

Fiori solitarii quasi in spica, foglie ovate, le inferiori intaccate, fusto alla base serpeggiante. *Pers. Syn.* V. foemina quibusdam aliis Betonica Pauli, Serpillifolia. *Bauh. Hist.* III *p.* 285. cum icone.

Nasce in Campalto *nei* Prati *umidi*; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

5. *V. hederae folia*. (Epheublättriger E.) V. a foglie d'edera.

Fiori solitarii, foglie cordato-subrotonde piane 5. lobe, più corte del peduncolo, foglie calicine ovate, fusto giacente. *L. Pers. Syn.* I *p.* 13. *Röhl. germ.* II *p.* 86. *Schult. aust.* I *p.* 30. *Savi Bot. Etrusc. p.* 16.

V. cymbalariaefolio, verna *Zann. Ven. p.* 274.

Alsines Genus, Fuchsio, Folio hederulae hirsuto *Bauh. Hist.* III *p.* 368. cum icone.

Nasce comunemente negli Orti; *fiorisce nei mesi di* Marzo *e* Aprile, *ed è* annuale.

GRATIOLA (Purgierkraut). Graziola.

Cal. di 7. foglie, delle quali le due foglie esteriori patenti. *Cor.* resupinata. *Stami* 4. dei quali due sterili. *Cass.* di due cavità.

G. officinalis. (Echtes P.) G officinale.
Fusto eretto semplice, superiormente quadrangolare, foglie lanceolate seghettate, fiori pedunculati. *L. Pers. Syn.* I *p.* 14. *Röhl. germ.* II *p.* 87. *Schult; aust.* I. *p.* 32.
Savi. Mat. Med. tab. V. Bot. Etrusc. p. 18.
G. centauroides. *Zann. Ven. p.* 134. *tab.* 293.
Gratiola. *Bauh. Hist.* III *p.* 434. cum icone.
Gratiola *Matth. p.* 734. cum icone mediocri.
Nasce comunemente intorno Malghera *e* Campalto *nei* Prati *umidi*; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

UTRICULARIA. (Wasserschlauch) Utricolaria.
Cal. di due foglie eguale. *Cor.* ringente spronata. *Stami* piegati in dentro. *Cass.* di una sola cavità.

U. vulgaris. (Gemeiner. W.) U. volgare.
Nettario conico, labbro superiore intero, eguale al palato, foglie pennato-moltofesse *L. Pers. Syn.* I *p.* 18. *Röhl. germ.* II *p.* 88. *Schult. aust.* I *p.* 33. *Savi. Bot. Etrusc.* p. 19.
Millefolium aquaticum flore luteo galericulato *Bauh. Hist.* III *p.* 783. icone.
Nasce intorno Malghera *e* Campalto; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sin* Agosto, *ed è* perenne.

LYCOPUS. (Wolfsfuss) Licopo.
Cal. tubuloso 5. fido. *Cor.* tubulosa quasi eguale 4. fida, colla lacinia superiore smarginata. *Semi* 4.

L. vulgaris. (Gemeiner W.) L. volgare.
Foglie sinuato-seghettate appendicolate. *Pers. Syn.* I *p.* 24.
L. europaeus. *L. Röhl. germ.* II *p.* 88. *Schult. aust.* I *p.* 35.
L. palustris glaber. *Zann. Ven. p.* 177.
Marrubium aquaticum quorumdam. *Bauh. Hist.* III *p.* 318. cum icone.
Siderite prima. *Matth. p.* 1056. cum icone.
Nasce comunemente in Malghera e Malamocco *nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre *ed è* perenne.

SALVIA. (Salbey) Salvia.
Cor. ringente, filamenti con un'appendice nella parte inferiore. *Semi* 4.

S. pratensis. (Wiesen S.) S. dei prati.
Foglie cordato-bislunghe intagliate e intaccate, brattee più corte dei calici, labbro superiore glutinoso, più lungo dell'inferiore. *Pers. Syn.* I *p.* 26. *Röhl. germ.* II *p.* 89. *Schult. aust.* I *p.* 36.
Sclarea pratensis, foliis serratis, flore caeruleo. *Zannich. Ven. p.* 239.
Gallitrichum sylvestre vulgo, sive silvestri Sclarea. Flore purpureo caerulcovemagno. *Bauh. Hist.* III *p.* 311. cum icone.
β con fiori rosei.
Nasce comunemente nei Prati *specialmente intorno* Malghera; *fiorisce tutta la* state, *ed è* perenne.

ANTHOXANTHUM. (Ruchgras) Antossanto.
Cal. *Gluma* 2. valve con un sòlo fiore. *Cor.* *Gluma* 2. valve acuminata restata. *Seme* 1.

A. odoratum (Wohlriechendes R.) A. odoroso.
Pannochia spiciforme cilindrica. *Pers. Syn.* I *p.* 30. *Röhl. germ.* II *p.* 91. *Schult. aust.* I *p.* 83. *Schreb. Gram. p.* 49. *t.* 5. *Savi Bot. Etrusc. p.* 23.
Gramen avenaceum odoratum spica flavescente. *Zannich. Ven. p.* 124.
Gramen Anthoxanthon spicatum *Bauh. Hist.* II *p.* 466.
Gramen Alopecurum, spica glumosa lutea. Villis crispis *Barr. rar. ic. tab.* 124. *fig.* I.
Nasce comunemente in Campalto *nei* Prati *erbosi*; *fiorisce nei Mesi d'* Aprile *e* Maggio, *ed è* perenne.

TRIANDRIA

MONOGYNIA.

VALERIANA. (Baldrian.) Valeriana.
Cal. o, ovvero un margine piccolissimo. *Cor.* monopetala 5. fida, alla base più o meno gobba, superiore. *Seme*, coronato da un pappo piumoso.

V. dioica. (Klecner. B.) V. dioica.
Triandra, dioica, foglie radicali ovate interissime, le caulinari pennate. *Röhl. germ. Schult. aust.* I *p.* 96.

V. minor pratensis vel aquatica *Bauh. Hist.* III *p.* 211.

Nasce in Campalto *nei* Prati *umidi*; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

FEDIA. (Fedie) Valerianella.

Cal. dentato. *Cor.* 5. fida alla base gobba. *Noce* di due o tre cavità, delle quali una senza seme.

F. ololitoria. (Küchengarten F.) V. olitoria.

Frutto tridentato, fusto quasi glabro. *Röhl. germ.* II *p.* 93. *Schult. aust.* I *p.* 100. Valeriana olitoria *Pers. Syn.* I *p.* 39.

Valerianella arvensis, praecox humilis semine compresso. *Zann. Ven. p.* 270.

Locusta herba. *Bauh. Hist.* III. *p.* 323. *cum icone*.

Nasce comunemente negli Orti, *e ai* Treporti; *fiorisce il mese di* Aprile, *ed è* annuale.

GLADIOLUS. (Siegwurz) Gladiolo.

Cor. 6. partita ineguale, lobi superiori conniventi. *Stami* ascendenti. *Spata* 2. 3. valve, con valve lanceolate. *Stimm.* 3. *Semi* alcune volte alati.

G. communis. (Gemeine) G. comune.

Foglie spadiformi nervose, fiori laterali, spate più lunghe dei tubi, fusto semplice. *Pers. Syn.* I *p.* 43. *Röhl. germ.* II *p.* 94. *Schult. aust.* I *p.* 101.

G. sive Xiphion. *Zann. Ven. p.* 113. *tab.* 53. *Bauh. Hist.* II *p.* 701. cum icone.

Gladiolo. *Matth. p.* 1042. cum icone.
Nasce ai Treporti, *nei* Prati *umidi*; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

IRIS. (Schwertel) Iride.
Cor. 6. partita, con lacinie alternativamente richinate. *Stimm.* petaliformi.

I. *Pseud' Acorus.* (Wasser S.) I. aquatica.
Cor. senza barba, foglie spadiformi, petali interni minori dello stimma. *Pers. Syn.* I *p.* 52. *Röhl. germ.* II *p.* 95. *Schult. aust.* I *p.* 105.
I. palustris lutea. *Zann. Ven. ic. tab.* 96.
I. palustris lutea, sive Acorus adulterinus. I *Bauh. Hist.* Ii *p.* 732. cum icone.
Acoro falso. *Matth. p.* 24. cum icone.
Nasce comunemente intorno Malghera *e* Campalto *nei* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* perenne.

SCHOENUS. (Knopfgras) Marisco.
Squame fascicolate ammucchiate, le esterne sterili nitide. *Cor.* o. *Seme* 1. subrotondo nudo, ovvero setoloso.

1. *S. Mariscus.* (Gemeines K.) M. comune.
Culmo terete folioso, foglie nel margine e nel dorso aculeate. *Pers. Syn.* Cladium germanicum. *Röhl. aust.* II *p.* 91. *Schult. aust.* I *p.* 82.
Pseudocyperus palustris, foliis, et carina serratis. *Zann. Ven. p.* 219.

Cyperus longus inodorus sylvestris Lobelio: *Bauh. Hist.* II *p.* 503. cum icone.

Nasce comunemente in Malghera *e* Campalto *nei* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

2. *S. mucronatus*. (Spitziges K.) M. mucronato.

Culmo terete nudo, spighette ovate fascicolate, involgliò quasi di sei foglie patente, foglie scanalate. *Pers. Syn.* I *p.* 58. *Röhl. germ.* II *p.* 96.

Melanoschoenus maritimus humilis, Cyperi effigie. *Zann. Ven. ic. tab.* 16.

Gramen marinum cyperoides. *Bauh. Hist.* II *p.* 498. cum icone.

Juncus maritimus panicula subrotunda glumosa. *Barell. ic. tab.* 203. *fig.* 1.

Nasce nei Treporti, Cavallino *e* Malamocco *nei luoghi arenosi appresso il mare*; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

3. *S. nigricans*. (Schwärzliches K.) M. nero.

Culmo terete nudo, capolino ovato, invogli di due foglie ovate, delle quali una lesiniforme bislunga. *Pers. Syn.* I *p.* 58. *Röhl. germ.* II *p.* 96. *Schult. aust.* I *p.* 109.

Melanoschoenus palustris, angustifolius, Junci facie, lithospermi semine *Zannich. Ven. ic. tab.* 41.

Nasce abbondevolmente nel Lido *e* Treporti *nei luoghi umidi*; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

CYPERUS. (Cyperngras) Cipero:

Glume paleacee distiche, imbricate *Cor.* 0. *Sem.* 1. nudo. *Spighette* compresse.

1. *C. flavescens*. (Gelbliches C.) C. gialleto:

Culmo triquetro nudo, ombrella quasi composta, spighette lanceolate, glume ottuse. *Pers. Syn.* I *p.* 62. *Röhl. germ.* II *p.* 96. *Schult. aust.* I *p.* III

Gramen pulchrum parvum, panicula lata compressa. *Bauh. Hist.* II *p.* 470. icone.

Nasce nei Treporti *nei luoghi erbosi e umidi; fiorisce il mese di* Settembre, *ed è* annuale.

2. *C. virescens*: (Grünliches C.) C. verdastro.

Culmo triquetro, ombrella composta di tre foglie, spighette lineari conferte, glume acute patenti. *Pers. Syn.* I *p.* 62. *Röhl. germ.* II *p.* 97.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di* Luglio *e* Agosto, *ed è* annuale.

3. *C. longus*. (Langes C.) C. lungo.

Culmo triquetro folioso, ombrella foliosa arcicomposta, peduncoli nudi, spighe alterne lineari. *Pers. Syn.* I *p.* 64. *Röhl. germ. p.* 97. *Schult. aust.* I *p.* 112.

C. panicula sparsa speciosa. *Bauh. Hist.* II *p.* 493, cum icone.

Cipero *Matth. p.* 28. cum icone.

Nasce comunemente intorno Malghera *e* Campalto *nei luoghi acquidosi e fossi; fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

4. *C. monti*.) Montisches C.) C. di Monti.

Culmo triquetro, ombrella ricomposta panicolata, Spighette ovate, glume distanti, involglio di sei foglie, radice serpeggiante. *Pers. Syn.* I *p.* 64. *Röhl. germ. p.* 97. *Schult. aust. p.* 113.

C. serotinus odoratus, radice longa, paniculis et locustis latis, ferrugineis compositis. *Zann. Ven. p.* 82.

Nasce intorno Malghera *nei* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *e* Agosto, *ed è* perenne.

SCIRPUS. (Binse) Scirpo.

Glume paleaccee, imbricate da tutte le parti. *Cor.* o. *Seme* 1.

1. *S. palustris*. (Sumpf. B.) S. paludoso.

Radice serpeggiante, culmo quasi terete nudo, spiga ovato bislunga quasi terete, glume acute, due stimmi. *Pers. Syn.* I *p.* 63. *Röhl. germ.* II *p.* 98. *Schult. aust. p.* 114.

Juncus capitulis longis sive clavatus. *Bauh. Hist.* II *p.* 523. cum icone.

Nasce comunemente intorno Malghera *nei* Fossi *e* Prati *unidi*; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

2. *S. acicularis* (Nadel förmige B.) S. acicolare.

Culmo quadrangolare setiforme, spiga terminale ovata bivalve, seminudi. *Pers. Syn. Röhl. germ.* II *p.* 98. *Schult. aust.* I *p.* 115.

Juncus humilis. *Bauh. Hist.* II *p.* 522.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi inondati; fiorisce la* State, *ed è* perenne.

3. *S. lacustris*. (See B.) S. dei laghi.
Culmo terete prolungato nudo, spighe ovate sessili e peduncolate, terminali. *L. Pers. Syn.* I *p.* 67. *Röhl. germ.* II *p.* 99. *Schult. aust.* I p. 116.
S. palustris altissimus. *Zann. Ven. p.* 239.
Juncus maximus: Holloschoenos. *Bauh. Hist.* II *p.* 522. cum icone.
Nasce abbondevolmente in Campalto *e* Malghera; *fiorisce i mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

4. *S. holloschoenus*. (Knopfgrasartige B.) S. Marischino.
Culmo terete prolungato nudo, capolini glomerati sessili ovvero peduncolati, involglio di due foglie. *Pers. Syn.* I *p.* 67. *Röhl. germ.* II *p.* 99. *Schult. aust.* I *p.* 116.
Scirpoides maritimum, capitulis sparsis glomeratis. *Zann. Ven. p.* 238.
Nasce comunemente in Campalto *nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di* Luglio *e* Agosto, *ed è* perenne.

5. S. *romanus*. (Romanische B.) S. romano.
Culmo nudo, capolino laterale sessile conglobato, brattea richinata. *L. Pers. Syn.* I *p.* 67. *S. Holloschoenus β Röhl. germ. Schult aust.* I *p.* 116.
Scirpoides acutum maritimum capitulo glomerato. *Zann. Ven. p.* 238. *tab.* 45. *fig.* 2.

Juncus minor globoso singulari capitulo, radice tomentosa. *Barrell. ic. tab.* 255. *f.* 3.

Nasce comunemente nel Lido *nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di* Luglio *e* Agosto, *ed è* perenne.

6. *S. mucronatus*. (Zugespitzte B.) S. mucronato:

Culmo triangolare acuminato, spighe laterali ovate sessili glomerate, culmo nella cima orizzontale. *Pers. Syn.* I *p.* 68. *Röhl. germ.* II *p.* 100. *Schult. aust.* I *p.* 118.

Scirpo cyperus maritimus ec. ec. *Zann. Ven. p.* 237.

Nasce in Campalto *nei fossi e luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di* Luglio *e* Agosto, *ed è* perenne.

7. *S. maritimus*. (See B.) S. maritimo:

Culmo triquetro, pannochia conglobata foliacea, squame delle spighette trifide, delle quali la lacinia di mezzo lesiniforme, invoglio di molte foglie. *Pers. Syn.* I *p.* 68. *Röhl. germ.* II *p.* 100. *Schult. aust.* I *p.* 119.

Scirpo cyperus palustris, radice repente. *Zann. Ven. ic. tab.* 50.

Gramen cyperoides vulgatius aquaticum. *Bauh. Hist.* II *p.* 495. cum icone.

Nasce comunemente nel Lido *e* Malghera *nei luoghi acquosi; fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

LIMNETIS. (Meerstrandgras) Limnetide.

Spiga lateriflora. *Cal.* 2. valve delle quali una mi-

nore. *Cor.* di due valve, mutica compressa carenata. *Stil.* bislungo. *Nettar.* o.

L. pungens. (Stechender M.) L. pungente.
Foglie convolute pungenti, spighe poche appoggiate, pubescenti, carina del calice inerme. *Pers. Syn.* I *p.* 72.
Dactylis cynosuroides *L.*
Gramen spicatum secalinum maritimum. *Zann. Ven. ic. tab.* 36.
Nasce nei Treporti *comunemente nelle* Barene; *fiorisce nei mesi di* Luglio *e* Agosto, *ed è* perenne.

DYGYNIA

AGROSTIS (Windhalm) Agrostide.
Cal. di due valve, con un solo fiore, valve acute. *Cor.* di due valve. *Stimm.* piumoso.

1. *A. interrupta*. (Unterbrochener W.) A. interrotto.
Gluma esteriore aristata, pannochia attenuata, approssimata interrotta. *Pers. Syn.* I *p.* 74. *Röhl. germ.* II *p.* 108. *Schult. aust. p.* 177.
Nasce in Campalto *nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* annuale.

2. *A. sylvatica*. (Wald. W.) A. selvatica.
Mutica, pannochia fruttifera approssimata, culmo dritto, radice serpeggiante. *Schult. aust.* I *p.* 182.

Nasce intorno Malghera; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

3. *A. alba*. (Weisser W.) A. bianca.
Pannochia allargata, calici mutici eguali, culmo serpeggiante. *L. Pers. Syn.* I *p.* 76. *Röhl. germ.* II *p.* 51. *Schult. aust.* I *p.* 181.
Nasce comunemente nei Prati *umidi intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Luglio *e* Agosto, *ed è* perenne.

MELICA. (Perlgras) Melica.
Cal. di due valve con due fiori, membranaceo, con un rudimento di un terzo fiore. *Cor.* di due valve, mutica. *Seme* libero, coperto dalla corolla.

M. cærulea. (Blaues P.) M. celeste.
Pannochia approssimata, fiori conico-cilindrici. L. *Röhl. germ.* II *p.* 114. *Schult. aust. p.* 204. Aira caerulea. *Pers. Syn.*
Gramen pratense serotinum panicula longa purpurascente. *Zann. Ven. p.* 130.
Gramen harundinaceum enode minus. *Bauh. Hist.* II *p.* 481., absque icone.
Nasce ai Treporti *nei* Prati *umidi*; *fiorisce* l' Autunno, *ed è* perenne.

CRYPSIS. (Dornengras) Crisside.
Cal. di due valve. *Cor.* di due valve, maggiore del calice. *Seme* libero coperto dalla corolla.

C. schoenoides (Knopfgrasartiges D.) C. mischino.

Culmo ramoso compresso, panocchia quasi spiciforme cinta alla base da una vagina, fiori con tre stami. *Röhl. germ.* II *p.* 105. *Schult. aust.* I *p.* 170.

Nasce benchè di rado, nei luoghi umidi a S. Niccolò di Lido; *fiorisce i mesi di* Luglio *e* Agosto, *ed è* annuale.

PHALARJS. (Glanzgras) Falaride.

Cal. di due valve, con un solo fiore. *Valve* subovate membranaceo-carenate nel dorso, ovvero lanceolate eguali nervose. *Cor.* di due valve pelosa alla base.

P. arenaria. (Sand G.) F. arenaria.

Spiga obovata, glume calicine interissime ciliate, guaina ventricosa, culmo alla base ramoso. *Pers. Syn.* I *p.* 79 Phleum arenarium. *Röhl. germ.* II *p.* 113. *Schult. aust.* I *p.* 174.

Gramen typhinum, maritimum minus *Zann. Ven. p.* 122. *t.* 168.

Nasce comunemente nel Lido *nei luoghi arenosi; fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* annuale.

PHLEUM (Lieschgras) Fleo.

Cal. di due valve, valve colla carena sporgente nella cima. *Cor.* di due valve, minore del calice *Fiorescenza* in spica.

1. *P. Phalaris*. (Glanzgrasartiges L.) F. falaroide.
Spiga composta cilindrica, glume ciliate carenate: *Pers. Syn* I *p.* 79. *P.* Boehmeri. *Röhl. germ. p.* 112. *Schult. aust. p.* 173.
Gramen typhinum junceum perenne. *Barrell. ic. tab.* 21. *fig.* 2.
Nasce nei luoghi arenosi, secchi, *fra* sassi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* annuale.

2. *P. pratense*. (Wiesen L.) F. dei prati.
Spiga cilindrica ciliata prolungata, culmo dritto. *L. Perf. Syn.* I *p.* 79. *Schreb. gram. p.* 102. *tab.* 14.
Gramen typhoides maximum, spica longissima. *Zann. Ven. p.* 121. *tab.* 144. *fig.* 1.
Gramen cum cauda muris majoris longa, majus *Bauh. Hist.* II *p.* 472. cum icone.
Nasce comunemente in Campalto *e* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

ALOPECURUS. (Fuchs schwanz gras) Alopecuro.
Cal. di due valve con un solo fiore. *Cor.* di una sola valve, alla base restata, ovvero mutica. *Fiorescenza* in spiga.

A agrestis. (Aker F.) A. dei campi.
Culmo dritto, spiga cilindrica purpurescente, glume lisce. *Pers. Syn.* I *p.* 80. *Schreb. Gram. p.* 140. *tab.* 19. *fig.* 2. *Röhl. germ.* II *p.* 104. *Schult. aust.* I *p.* 166.
Gramen typhoides, spica angustiore, longiore. *Zann. Ven. ic. tab.* 66. *fig.* 3.

Gramen cum cauda muris purpurescente. *Bauh. Hist.* II. *p.* 473. cum icone.

Gramen typhinum plantagis spica, aristis geniculatis. *Barr. ic. t.* 699. *fig.* 2.

Nasce comunemente nei terreni di S. Marta; *fiorisce nei mesi di* Marzo *e* Aprile, *ed è* annuale.

POLYPOGON. (Bürstengras) Polipogine.

Cal. di due valve, restato, con un solo fiore. *Cor.* di due valve colla valvola esteriore restata.

P. monspeliense. (Französisches B.) P. francese.

Pannochia unita quasi spiciforme, calici quasi pubescenti, ciliati nel margine. *Pers. Syn.* I *p.* 80. *Röhl. germ.* II *p.* 113.

Alopecurus monspeliensis. *L. Sp.*

Phleum crinitum. *Schreb. gram. p.* 151. *tab.* 20. *f.* 3.

Alopecurus altera maxima anglica paludosa. *Bauh. Hist.* II *p.* 474.

Gramen alopecurum majus, spica virescente, divulsa, pilis longioribus. *Barr. ic. tab.* 115. *fig.* 2.

β. *P. paniceum* minore, con glume pelose. *Pers. l. c.*

Alopecurus paniceus. *L. Sp. pl.*

Gramen alopecurum minus, spica virescentes, divulsa. *Barr. ic. tab.* 115. *fig.* 1.

Nasce comunemente intorno Malamocco *e nel* Lido; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* annuale.

PANICUM. (Fennich) Panico,

Cor. di tre valve con un solo fiore: valva terza dorsale piccolissima. *Cor.* di due valve. *Fiorescenza* varia.

1. *P. verticillatum*. (Quirlblütiger F.) P. verticillato.

Pannocchia quasi spiciforme cilindrica, verticillata, invoglietti ispidi all' indietro, valve dei fiori ermafroditi glabri. *Röhl. germ. Schult. aust.* I *p.* 209.

P. vulgare spica simplici, et aspera. *Zannich. Ven. p.* 302.

Gramen geniculatum. *Bauh. Hist.* II *p.* 469.

Nasce comunemente intorno Malghera *e nei* Orti; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* annuale.

2. *P. glaucum*. (Graugrüner F.) P. glauco.

Grappolo spiciforme cilindrico, invoglietti fascicolato-pelosi, corolle ermafrodite trasversalmente ondate. *Pers. Syn.* I *p* 81. *Röhl. germ.* II *p.* 117. *Schult. aust.* I *p.* 210. *Schreb. gram. p.* 21. *tab.* 25.

P. vulgare spica simplici et molliori. *Zann. Ven. p.* 202.

P. sylvestre dictum, et dens canis I. *Bauh. Hist.* II *p* 443.

Nasce negli Orti *nei luoghi umidi fiorisce il mese di* Luglio, *ed è* annuale.

3. *P. viride*. (Grüner F.) P. verde.

Pannochia quasi spiciforme cilindrica, involucretti fascicolato-pelosi, corolla ermafrodita glabra. *Röhl. germ.* II *p.* 118. *Schult. aust.* I *p.* 210.

P. spica cylindrica, involucellis bifloris fasciculato-pilosis, seminibus nervosis. *L. Pers. Syn.* I *p.* 81.

P. vulgare spica simplici, vestibus non adhaerente. *Zann. Ven. p.* 202.

Nasce comunemente negli Orti, *e nei* Prati *intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Luglio *e* Agosto, *ed è* annuale.

4. *P. Crus Galli*. (Hübner F.) P. gallinaceo.

Pannochia unilaterale dritta, spighette restate approssimate, foglie lineari-lanceolate nude. *Röhl. germ.* II *p.* 118. *Schult. aust.* I *p.* 211.

P. spicis alternis conjugatisque secundis, spiculis subdivisis, glumis aristatis hispidis, Rachi quinquangulari. *Pers. Syn.* I *p.* 81.

P. vulgare, spica multiplici asperiuscula. *Zann. Ven. p.* 203.

Dens caninus secundus, s. Panicum sylvestre, panicula divulsa. *Bauh. Hist.* II *p.* 443. cum icone.

Panico salvatico. *Matth. p.* 434. cum icone.

Nasce comunemente nei luoghi umidi; fiorisce nei mesi di Luglio *e* Agosto, *ed è* annuale.

5. *P. miliaceum*. (Hirse F.) P. migliaceo.

Pannochia pieghevole nutante, spighette muticlie, foglie lanceolate pelose. *Röhl. germ.* II *p.* 118. *Schult. aust. p.* 212.

P. (*Milium*). Panicula laxa flaccida, fol. vaginis

hirtis, glumis mucronatis nervosis. *Pers. Syn.* I *p.* 83.

Milium. *Bauh. Hist.* II *p.* 446. cum icone.

Miglio. *Matth. p.* 429. cum icone.

Nasce nei luoghi coltivati, nei Orti, *e nei* Rovinazzi *a* S. Marta; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* annuale.

DIGITARIA. (Fingergras) Ditaria.

Cal. di due o tre valve, concavo, colla valva esterna minutissima, e l'interna lunga al pari della corolla. *Cor.* di due valve, bislungo-ovata terete mutica. *Stil.* lunghissimi. *Fiori* in spighe ditate lineari.

D. sanguinalis. (Blut. F.) D. sanguinale.

Culmo serpeggiante, fiori imbricati, vagine e foglie papilloso-pelose. *Pers. Syn.* I *p.* 84.

Panicum. (*sanguinale*) Spicis digitatis basi interiori nodosis, flosculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis. *L. Schreb. gram. p.* 119. *tab.* 16.

Syntherisma vulgare. *Röhl. germ.* II *p.* 105. *Schult. aust.* I *p.* 168.

Gramen Dactylon folio latiore. *Zann. Ven. p.* 117.

Graminis Genus. Dens caninus tertius s. Gramen primum, vel Galli crus. *Bauh. Hist.* II *p.* 444. cum icone.

Sanguinella. *Matth. p.* 1068. cum icone.

Nasce comunemente nei luoghi coltivati, e Orti; *fiorisce nei mesi di* Luglio *e* Agosto, *ed è* annuale.

CYNODON. (Hundszahn) Gramigna.

Cal. di due valve, patente, lanceolato. *Cor.* maggiore, di due valve: valva esterna grande. *Nettar.* troncato. Spighe ditate imbricate in una sola serie.

C. Dactylon. (Gemeiner H.) G. volgare. *Pers. Syn.* I *p.* 85.

Panicum. (Dactylon) Spicis digitatis patentibus: basi interiore villosis, floribus solitariis sarmentis repentibus. *L. Savi. Mat. med. tab.* 36.

Digitaria stolonifera. *Röhl. germ.* II *p.* 105. *Schult. aust.* I *p.* 169.

Gramen Dactylon folio arundinaceo, majus, et minus. *Zann. Ven. ic. tab.* 192. *mala.*

Gramen repens cum panicula gramïnis mannae. *Bauh. Hist.* II *p.* 459.

Nasce comunemente intorno S. Niccolò di Lido; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

LAPPAGO. (Stachelgras) Lappagine.

Cal. quasi di tre valve, muricato. *Cor.* di due valve, resupinata.

L. racemosa. (Traubenblüthiges S.) L. con fiori a grappoli. *Pers. Syn.* I *p.* 85. *Röhl. germ.* I I *p* 107. *Schult. aust.* I *p.* 191.

Cenchrus. (*racemosus*) Panícula spicata glumis muricatis, setis ciliaribus. *L. Schreb. Gram. p.* 45. *tab.* 4.

Gramen parvum echinatum. *Bauh. Hist.* II *p.* 467: cum icone.

Gramen caninum maritimum spicatum, echinatis glumis. *Barr. ic. tab.* 718.

Nasce a Brondolo *nei luoghi arenosi e secchi; fiorisce nei mesi di* Luglio *e* Agosto, *ed è* annuale.

CYNOSURUS. (Kammgras) Cinosuro.

Cal. 2. valve multifloro. *Ricett.* proprio unilaterale fogliaceo.

C. echinatus. (Stachliges K.) C. echinato.

Pannochia unita ovata, spighette restate brattee ineguali, foglie lanceolate. *Röhl. german.* II *p.* 140.

C. Bracteis pinnato-paleaceis aristatis. *Persoon. Syn.* I *p.* 86.

Gramen alopecurum spica aspera. *Barel. ic. t.* 123. *f.* 2.

Nasce intorno i terreni di S. Marta, *nei luoghi erbosi; fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è pianta* annuale.

DACTYLIS. (Knaulgras) Dattilo.

Cal. di due valve compresso, delle quali una valvola maggiore carenata. Spighette ovate o capitate.

D. glomerata. (gemeines K.) D. comune.

Pannochia unilaterale glomerata. *Pers. Syn.* I *p.* 88. *Schreb. gram. t.* 8. *f.* 2. *Röhl. germ.* II *p.* 134. *Schult. aust.* I *p.* 232.

Gramen asperum, *Zann. Ven. p.* 132. *tab.* 194.

fig. 1. *mala*. *Bauh. Hist.* II *p.* 467. cum icone.
Gramen spicatum, folio aspero, spica grumosa.
Barr. ic. tab. 26. medioc.
Nasce nei Rovinazzi, *specialmente intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

POA. (Rispengras) Fienarola (*Savi*):
Cal. di due valve, multifloro. *Spighette* ovate mutiche. *Valvole* scariose nel margine.

1. *P. acquatica*. (Wasser. R.) F. acquatica.
Pannochia diffusa ramosissima, spighette lineari con 5-9. fiori, radice serpeggiante. *Röhl. germ. p.* 119 *Schult. aust.* I *p.* 217.
P. altissima, panicula diffusa, spiculis sexfloribus linearibus. *L. Pers. Syn.* 1 *p.* 88.
Gramen majus aquaticum. *Bauh. Hist.* II *p.* 481.
Nasce nei fossi intorno Mestre; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

2. *P. maritima*. (Meer. R.) F. maritima.
Pannochia patente, rami fruttiferi approssimati, spighette lineari con cinque fiori, fioretti un poco acuti, con cinque nervi, valve calicine con tre nervi, radice serpeggiante. *Röhl. germ.* II *p.* 119. *Schult. aust.* 1. *p.* 217.
Nasce nei luoghi inondati dall'acqua salsa *specialmente intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

3. *P. bulbosa*. (Zwiebeltragendes R.) F. bulbosa.
Pannochia diffusa, spighette ovate, quasi con cinque fiori, fiori alla base villosi, culmo quasi nudo, alla base tuberoso. *Pers. Syn.* I *p.* 89. *Röhl. germ.* II *p.* 121. *Schult. aust.* I *p.* 224.
β *P. crispa*. Pannochia crispa. *L.* Sp.
Gramen vernum radice ascalonitidis. *Zann. Ven. p.* 131.
Gramen cum panicula molli rubente. *Bauh. Hist.* II *p.* 464. cum icone.
Gramen arvense panicula crispa. *Barr. ic. tab.* 703.
Nasce nel Cavallino *nei* Prati *erbosi*; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

4. *P. pratensis*. (Wiesen R.) F. dei prati.
Pannochia diffusa, spighette bislungo-ovate con cinque fiori, fiori alla base villosi, culmo e vagine glabre, Ligula breve, radice serpeggiante. *Röhl. germ.* II *p.* 121. *Schult. aust.* I *p.* 226.
P. Panicula diffusa, spiculis 5. floris glabris, culmo erecto tereti glabro, ligula brevi truncata, foliis planis. *Pers. Syn.* I *p.* 89.
Gramen pratense paniculatum majus latiore folio Poa Theophrasti. *Zann. Ven. p.* 130.
Nasce comunemente nei Prati; *fiorisce il mese di* Maggio, *ed è* perenne.

5. *P. annua*. (Iähriges R.) F. annuale.
Pannochia quasi unilaterale, diffusa, spighette bislungo-ovate con 5-7. fiori, culmo compresso obliquo, radice fibrosa. *Röhl. germ.* II *p.* 123. *Schult. aust.* I *p.* 228.

P. parvula, foliis margine subundulatis, panicula diffusa angulis rectis, spiculis obtusis, culmo obliquo compresso. *Pers. Syn.* I *p.* 90.

Gramen pratense paniculatum minus album. *Zann. Ven. p.* 131.

G. paniculatum minus album. *Bauh. Hist.* II *p.* 465. cum icone.

Nasce comunemente negli Orti; *fiorisce nei mesi di* Marzo *e* Aprile, *ed è* annuale.

6. *P. pilosa*. (Haariges R.) F. pelosa.

Pannochia approssimata, dopo la fiorescenza allargata, rami inferiori alla base e alle ramificazioni pelosi, spighette lineari con 7-9. fiori, fioretti acuti, radice fibrosa. *Schult. aust.* I *p.* 219.

P. Panicula patente stricta: ramificationibus primariis pilosis. *L. Pers. Syn.* I *p.* 90.

Nasce intorno Malghera, *nei* Prati *umidi*; *fiorisce nei mesi d'*Agosto *e* Settembre, *ed è* annuale.

7. *P. Eragrostis*. (Schönstes R.) F. bellissima.

Pannochia patente, rami inferiori alla base e alle ramificazioni pelosi, spighette lanceolate con 9-15. fiori, fiori ottusi, radice fibrosa. *Röhl. germ.* II *p.* 120. *Schult. aust.* I *p.* 220.

P. Panicula patente, pedicellis flexuosis, spiculis serratis decemfloris, glumis trinerviis. *L. Pers. Syn.* I *p.* 90. *Schreb. gram.* 81. *tab.* 38.

Gramen phalaroides sparsa brizae panicula, minus. *Barr. ic. t.* 44. *f.* 2.

Nasce negli Orti *nei luoghi arenosi erbosi; fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* annuale.

8. *P. megastachia*. (Grossähriges R.) F. a spighe grandi.

Pannochia patente, rami inferiori alla base e alle ramificazioni pelosi, spighette lanceolate con 15-20. fiori, fiori ottusi, radice fibrosa. *Röhl. germ.* II *p.* 120. *Schult. aust.* I *p.* 220.

Briza. (*Eragrostis*) Spiculis lanceolatis, flosculis viginti. *L. Schreb. Gram.* II *p.* 83. *tab.* 39.

Gramen amoris dictum. *Bauh. Hist.* II. *p.* 470. sine icone.

Gramen Eranthemum, sed Eragrostis, phalaroides paniculatum, multiplici tenui brizae spica. *Barr. ic. t.* 43.

Nasce *e* fiorisce *come la precedente*.

9. *P. rigida*. (Steifes R.) P. rigida.

Pannochia distico-unilaterale conferta rigida, spighette lineari acute con 5-11. fiori, fioretti con cinque nervi, radice fibrosa. *Röhl. germ. Schult. aust.* I *p.* 218. cum descript. bona.

P. panicula lanceolata disticho-secunda coarctata glabra: rachi marginata spiculis 7. floris, flosculis teretibus enerviis. *Pers. Syn.* I *p.* 92.

Gramen arvense, filicina duriore panicula gracilius. *Zann. Ven. p.* 133. *tab.* 126. *Barr. ic. t.* 49.

Gramen loliaceum minus multiplici spica. *Bauh. Hist.* II *p.* 544.

Nasce nei muri antichi in S. Niccolò *di* Lido; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* annuale.

BRIZA. (Zittergras) Tremolina (Savi).

Cal. di due valve, con molti fiori. *Spighetta* distica. *Valvole* esteriori cordate ottuse ventricose, le interne molto minori.

B. *media*. (Gemeines Z.) T. volgare.

Pannochia dritta, spighette quasi con sette fiori, ovate, calice minore dei fiori. *Röhl. germ. Schult. aust.* I *p.* 232.

B. spiculis ovatis, calice flosculis (7.) breviore; *L. Pers. Syn.* I *p.* 92.

Gramen tremulum majus. *Zann. Ven. p.* 129. *t.* 220.

Gramen tremulum, *Bauh. Hist.* II *p.* 469. cum icone.

Gramen tremulum, seu phalaroides minus, lata sparsa panicula. *Barr. ic. t.* 16. medioc.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi montuosi ed erbosi; fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

Festuca. (Schwingel) Paleo. (Savi).

Cal. di due valve, con molti fiori. *Spighetta* bislunga un poco terete mutica ovvero con una resta terminale.

1. *F. Myurus*. (Mauseschwanzartiger S.) P. miuro.

Pannochia spicata lunga nutante, calici minutissimi

mutici, fiori scabri, reste lunghe, foglie setacee: *Pers. Syn.* I *p.* 93. *Schult. aust.* I *p.* 240.

F. panicula spicata, calycibus minutissimis muticis, floribus scabris, ristis longis. *L. Sp. pl.*

Gramen festuceum myurum, minus spica heteromalla. *Barr. ic. t.* 99. *f.* 1.

Nasce nei luoghi sterili a S. Marta; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* annuale.

2. *F. uniglumis*. (Einspelziger S.) P. uniglume.

Pannochia unilaterale dritta quasi semplice, fioretti lesiniformi compressi restati, una valvola del calice brevissima. *Savi bot. Etrusc. p.* 73.

Gramen bromoides spicatum maritimum, glabrum ec. ec. *Zann. Ven. p.* 128.

Nasce nel Lido *e a* Chioggia *nei luoghi arenosi appresso il* mare; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* annuale.

3. *F. elatior*. (Hoher S.) P. alto.

Pannochia patente ramosissima, spighette ovato-lanceolate, quasi restate, con 4-5. fiori, foglie lineari-lanceolate, radice serpeggiante. *Röhl. germ.* I *p.* 126. *Schult. aust.* II *p.* 244.

F. *panicula* secunda subrecta, spiculis ob tusiusculis: exterioribus teretibus. *Pers. Syn.* I *p.* 94. *Schreb. Gram. p.* 34. *t.* 2

Nasce intorno Malghera *nei luoghi umidi*; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

BROMUS. (Trespe) Bromo.

Cal. di due valve con molti fiori. *Spighetta* bis-

lunga distica. *Gluma* esterna restata sotto l'apice, la gluma interna pettinato-ciliata.

1. *B. sterilis*. (Unfruchtbare T.) B. sterile.
Pannochia patente quasi semplice pendente, spighette bislunghe-distiche, glume subulato-restate. *Pers. Syn.* I *p.* 96. *Röhl. germ.* II *p.* 130. *Schult. aust.* I *p.* 262.
B. *panicula* patula, spiculis oblongis distichis, glumis subulato aristatis. *L. Sp.*
Gramen avenaceum, panicula sparsa, locustis majoribus et aristatis. *Zann. Ven. p.* 128.
Nasce comunemente nei Prati *e nei* Muri antichi, *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* annuale.

2. *B. mollis*. (Weichhaarige T.) B. molle.
Pannochia dritta approssimata, peduncoli ramosi, spighette ovate pubescenti, glume elittiche, foglie e vagine villose. *Pers. Syn.* I *p.* 95. *Röhl. germ. p.* 128. *Schult. aust.* I *p.* 255. *Schreb. gram. p.* 60. *t.* 6. *f.* 1.
Festuca graminea, hirsutis brizae glumis compactior. *Barr. rar. ic. t.* 83. *f.* 1.
Nasce nei Prati, *e nei luoghi arenosi e secchi, fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* biennale.

3. *B. squarrosus*. (Sparrige T.) B. allargato.
Pannochia nutante, spighette ovate, reste nella spiga matura distese, peduncoli semplici. *Pers. Syn.*

I *p.* 95. *Röhl. germ.* II *p.* 128. *Schult. aust.* I *p.* 256.

Gramen phalaroides, acerosa, nutante spica. *Zann. Ven. ic. t.* 67. mala. *Barr. ic. t.* 24. *f.* 1.

Gramini murali Dalechampi simili, si non idem. *Bauh. Hist.* II *p.* 438. cum icone mala.

Nasce comunemente nei luoghi sterili, specialmente nei terreni di S. Marta; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* annuale.

4. *B. madritensis*. (Madriter T.) B. madritense. Pubescente, pannochia patente quasi unilaterale, spighette lineari scabre all'indietro, reste lunghissime scabre. *Pers. Syn.* I *p.* 96. *Röhl. germ.* II *p.* 130. *Schult. aust.* I *p.* 262.

B. panicula, rariore patulo-erecta, spiculis linearibus, intermediis geminis, pedicellis superne incrassatis. *L. Sp. pl.*

B. sterilis, erecta panicula, major. *Barr. ic. t.* 76. *f.* 1.

Nasce nei luoghi sterili, e Muri *antichi*; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno *ed è* annuale.

5. *B. pinnatus*. (Gefiederte T.) B. pennato.

Glabra, spiga semplice disticha, spighette alterne, quasi sessili, tereti, lunghe, quasi restate. *Pers. Syn.* I *p.* 96.

Festuca pinnata. *Röhl. germ. Schult. aust.* I *p.* 96.

Gramen spica brizae majus. *Bauh. Hist.* II *p.* 477. sine icone.

Gramen sparteum spicata brizae panicula et corniculata. *Barr. ic. t.* 25.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi montuosi e erbosi; fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

KOELERIA. (Koelerie) Coeleria.

Cal. di due valve, con molti fiori, compresso-carenato. *Cor.* di due valve brevemente restate, glume nervose. (Spiga composta da spighette compresse, spesso pubescenti, quasi sessili).

K. cristata. (Kammförmige K.) C. crestata.

Spiga pieghevole, spighette distese, con 3. 4. fiori quasi restati, rugolosi, carena quasi ciliata. *Pers. Syn.* I *p.* 97.

Aira cristata. *Röhl. germ. Schult. aust.* I *p.* 198.

Nasce in Campalto *nei* Prati *sterili, fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

TRISETUM. (Dreigranne) Triseto.

Cal. con due o tre fiori, acuminato, carenato. *Cor.* con due reste terminali ed una dorsale dritta.

T. pratense. (Wiesen D.) T. pratajolo.

Pannochia quasi unita, spighette nitide, guaine striate liscie, foglie di sopra setolose. *Pers. Syn.* I *p.* 97.

Avena flavescens. *L. Röhl. germ. Schult. aust. Schreb. gram. t.* 9. *bon.*

Nasce intorno Malghera *nei* Prati, *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

LAGURUS. (Hasenschwanz) Piumino.

Cal. di due valve con un solo fiore, con reste pelose: *Cor.* di due valve, colla gluma esterna 2-restata nella cima e munita di una terza nel dorso.

L. ovatus. (eiförmiger H.) P. ovato.

Spiga ovata villosa *L. Pers. Syn.* I *p.* 98. *Schreb. gram. p.* 143. *t.* 19. *f.* 3.

Gramen alopecuroides spica longiore. *Zann. Ven. p.* 122. *tab.* 66. *fig.* 2.

Gramen alopecuros altera Lobelii. *Bauh. Hist.* II *p.* 475. absque icone.

Gramen alopecuroides, molle spica incana. *Barr. ic. t.* 116. bona.

Nasce comunemente nel Lido *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* annuale.

STIPA. (Pfriemengras) Stipa.

Cal. di due valve con un solo fiore. *Cor.* di due valve, minore del calice, resta terminale, attorcigliata alla base, lunghissima.

S. pennata. (Fedriges P.) S. pennata.

Reste piumose. *Pers. Syn. Röhl. germ. Schul. aust.* I *p.* 191.

Gramen avenaceum, speciosissimis pennatis, aristis donatum. *Zannich. Ven. p.* 124. *t.* 48.

Gramen pennatum aliis spartum. *Bauh. Hist.* II *p.* 512. cum icone.

Gramen piunatum. *Dalech. Hist. p.* 431. cum icone.

Gramen sparteum pennatum majus. *Barr. ic. t.* 46.
Nasce nei luoghi arenosi *non lungi da* Cortelazzo; *fiorisce nei mesi di* Maggio e Giugno, *ed è* perenne.

AVENA. (Hafer) Avena.
Cal. di due valve, con molti fiori, resta dorsale attorcigliata. (*Glume* membranacee.)

A. strigosa. (Rauch H.) A. strigosa:
Pannocchia bislunga unilaterale, fioretti geminati con due reste nella cima e una dorsale ginochiata. *Pers. Syn.* I *p.* 100. *Röhl. germ.* II *p.* 131. *Schult. aust.* 1. *p.* 263.
Avena, panicula laxa, calicybus bifloris, flosculis laevibus, apice biaristatis, arista dorsali longissima. *Schreb. Gram.* II *p.* 123. *tab.* 46.
Nasce intorno Brondolo *nei luoghi* montuosi *ed* erbosi; *fiorisce il mese di* Aprile, *ed è* annuale.

ARUNDO. (Rohr) Canna.
Cal. di due valve 1 multifloro, glabro. *Cor.* lanata alla base, mutica.

1. *A. donax*. (Zahmes R.) C. domestica.
Calici con cinque fiori, pannochia diffusa, culmo fruticoso. *Pers. Syn.* I *p.* 102. *Röhl. germ.* II *p.* 111.
A. maxima et hortensis. *Bauh. Hist.* II *p.* 486 cum icone.
Canna. *Matth. p.* 164. cum icone.
Nasce nei luoghi poco lontani dall'acqua, appres-

so i Fossi, *intorno* Malamocco; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre.

2. *A. Phragmites* (gemeines R.) C. comune.
Calici con cinque fiori, pannochia pieghevole. *Persoon Syn.* I *p.* 102. *Röhl. l. c. Schult. aust.* I *p.* 190.
Nasce comunemente nei Fiumi *e* Fossi, *specialmente intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* perenne.

3. *A. arenaria*. (Sand R.) C. arenaria.
Calici con un solo fiore, più lunghi della corolla, pannochia spicata, fiori eretti mutici, foglie involute pungenti. *Pers. Syn l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*
Gramen secalinum spicatum maritimum maximum, spica longiore. *Zann. Ven. p.* 120.
Spartium spicatum pungens oceanicum. *Bauh. Hist.* II *p.* 511.
Nasce comunemente in tutte le spiagge arenose, *specialmente in quella del* Lido; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e di* Maggio, *ed è* perenne.

SACHARUM. (Zuckerrohr) Zucchero.
Fiori tutti ermafroditi. *Cal.* di due valve, circondato da lanugine lunga. *Cor.* di una o due valve mutica, ovvero restata.

S. *Ravennae*. (Ravenna Z.) Z. di Ravenna.
Pannochia pieghevole, rachi lanata, fiori restati. *Pers. Syn. p.* 103. *Röhl. germ.* II *p.* 107.

Gramen arundinaceum, ramosum, plumosum, album. *Zann. Ven. ic. t.* 52. *f.* 2. mala.

Nasce intorno i Treporti *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* perenne.

ROTTBOELLIA. (Rottboellie) Rottboellia:

Rachide articolata un poco terete, filiforme in più specie. *Cal.* ovato lanceolato piano di una ovvero di due valve. *Cor.* minore di due valve, *fioretti* alterni sopra il rachide flessuoso.

R. incurvata. (Eingebogene R.) R. incurvata.

Spiga terete lesiniforme incurvata, gluma bipartita lesiniforme appoggiata. *Pers. Syn. tom.* I *p.* 106; *Röhl. germ.*

R. Spica tereti subulata subarcuata, gluma calycina subulata adpressa. *Roth. neue Beytr. zur Bot. tom. I. p.* 120.

Nasce nel Lido *e nei* Treporti, *nei luoghi* arenosi *umidi; fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è pianta* perenne.

HORDEUM. (Gerste) Orzo.

Cal. di sei foglie in guisa d'involglio. *Fiori* terni, quello di mezzo sessile, i laterali stipitati, spesso sterili. *Cor.* stipitata di due valve acuta, colla valva esterna restata. (Fiorescenza in spiga).

1. *H. murinum*. (Mäuse G.) O. sorcino.

Fiori laterali maschi réstati, involgli di mezzo cilia-

ti, lanceolati. *Pers. Syn.* I *p.* 108. *Röhl. germ.* II *p.* 135.

Nasce comunemente nei muri *e nei* rovinazzi, *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* annuale.

2. *H. maritimum*. (Meer G.) O. marino.

Fiori laterali maschi, brevemente restati, glabri nel dorso, fogliola interna dei fiori laterali semiovata. *Pers. Syn.* I *p.* 108. *Röhl. l. c.*

Nasce nei luoghi erbosi *nei* terreni *di* S. Marta; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* annuale.

SECALE. (Roggen) Segala.

Cal. opposto di due valve 2. 3. floro, solitario. *Glume* lineari lanceolate liscie, ovvero scanalate dalle due parti.

S. *villosum*. (Borstiger) S. villoso.

Le cilia delle glume villose. *Röhl. germ. Schult. aust.* I *p.* 197.

Nasce comunemente intorno Chioggia *nei luoghi* arenosi; *fiorisce il mese di* Maggio, *ed è* annuale.

TRITICUM. (Weitzen) Frumento.

Cal. di due valve, solitario, multifloro. *Spighetta* appoggiata all'asse per il lato largo.

1. *T. junceum*. (Binsen W.) F. junceo.

Calici troncati con cinque fiori, mutici, foglie invo-

luto-mucronato-pungenti. *Persoon Syn.* I *p.* 109. *Röhl. germ.* II *p.* 138. *Schult. aust.* I. *p.* 254.

Nasce comunemente nel Lido; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

2. *T. repens*. (Kriechender W.) F. serpeggiante.

Calici lesiniformi con molti nervi, con cinque fiori, fioretti acuminati, foglie piane, radice serpeggiante nodosa. *Pers. Syn.* I *p.* 109. *Röhl. l.* c. *p.* 37. *Schreb. Gram. t.* 26.

Gramen loliaceum radice repente, sive gramen officinarum. *Zan. Ven. p.* 119. *t.* 197. *fig.* 1. mala.

Gramen repens officinarum, forte triticee spicae aliquatenus simile. *Bauh. Hist.* II *p.* 457. sine icone.

« *glaucum* totum amoene glaucum, foliis planis, spiculis majoribus aristatis aut muticis. *Pers. l. c.*

Nasce comunemente negli Orti, *nei* Prati *e nei luoghi* sassosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne..

LOLIUM. (Lolch) Loglio.

Cal. di una sola foglia, solitario, spighette appoggiate all'asse per il loro lato stretto.

1. *L. perenne*. (Ausdaurender L.) L. perenne.

Spiga mutica, spighette compresse multiflore *Pers. Syn.* I *p.* 110. *Röhl. p.* 136. *Schult. aust. p.* 213.

Phoenix lolio similis. *Bauh. Hist.* II *p.* 436. sine icone.

Phoenix. *Dalech. Hist. p.* 416 cum icone.

Nasce comunemente nei Prati *e negli* Orti; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

2. *L. temulentum*. (Betäubender L.) L. zucco (Savi).
Spiga restata, spighette quasi con sei fiori eguali al calice. *Pers. Syn.* I *p.* 110. *Röhl. l. c. Schult. l. c.*
L. spica aristata spiculis compressis multifloris. *Schreb. Gram.* II *p.* 74. *t.* 36,
L. gramineum spicatum caput tentans. *Bauh. Hist.* II *p.* 477. cum icone mala.
Lolium. *Dalech. Hist. p.* 417. cum icone.
Nasce comunemente fra le biade; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* annuale.

TETRANDRIA

MONOGYNIA.

GLOBULARIA. (Kugelblume) Globolaria.
Cal. comune imbricato, proprio tubuloso inferiore. *Cor.* il labro superiore bipartito, l'inferiore tripartito. *Ricett.* paleaceo.

G. vulgaris. (Gemeine K.) G. volgare.
Fusto erbaceo, foglie radicali tridentate lecauline lanceolate. *Pers. Syn.* I *p.* 118. *Schult. aust.* I *p.* 283.
Globularia. *Zann. Ven. ic. t.* 33. *f.* 1.

Aphyllantes anguillarae, sive globularia bellidi simili. *Bauh. Hist.* III *p.* 13. cum icone.

Nasce nei Treporti *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* perenne.

DIPSACUS. (Karten) Dissaco.

Cal. comune di molte foglie, il proprio superiore. *Ricett.* paleaceo.

D. sylvestris. (Wald K.) D. selvatico.

Foglie sessili seghettate, palee dritte, invoglio più lungo del capolino. *Pers. Syn. p.* 119. *Röhl. germ.*

D. sylvestris aut virga pastoris major. *Zann. Ven. ic. t.* 163.

D. silvestris s. labrum veneris. *Bauh. Hist.* III *p.* 74. cum icone.

Dissaco. *Matth. p.* 698. cum icone.

Nasce in Campalto *nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* biennale.

SCABIOSA. (Scabiose) Scabiosa.

Cal. comune, di molte foglie, il proprio doppio superiore. *Ricett.* paleaceo ovvero nudo.

1. S. *succisa*. (Sumpf S.) S. succisa.

Cor. quadrifide eguali, fusto semplice, rami approssimati, foglie lanceolato-ovate, le caulinari quasi dentate, fiori subglobosi. *Pers. Syn.* I *p.* 119. *Schult. aust.* I *p.* 287.

Succisa hirsuta. *Zann. Ven. ic. t.* 29.

Morsus diaboli. *Dalechamp. Hist. p.* 1067. *Matth. p.* 658. cum icone.

Nasce in Campalto *nei* Prati *umidi; fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* perenne.

2. S. *columbaria*. (Tauben S.) S. colombaria.

Corolette cinquefide raggianti, foglie radicali ovate e lirate, intaccate, le caulinari pennate lineari. *Pers. Syn.* I *p.* 120. *Röhl. germ.* I *p.* 143. *Schult. aust.* I *p.* 292.

S. minor vulgaris. *Bauh. Hist.* III *p.* 3. cum icone *p.* 4.

S. matthioli minor. *Dalech. Hist. p.* 1066. cum icone.

S. minore. *Matth. p.* 1021. cum icone.

Nasce nei Treporti *appresso i* Fossi *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

3. S. *stellata* γ (Sternförmige S.) S. stellata.

Corolette 5-fide raggianti, foglie intagliate. *Ricett.* dei fiori subrotondo. *L. Sp.*

S. stellata minima. *Zann. Ven. ic. t.* 11.

S. cum pulchro semine minor. *Bauh. Hist.* III *p.* 7. cum icone.

Nasce nei luoghi arenosi, *nei* Treporti *e nel* Lido; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* perenne.

SHERARDIA. (Serardie) Serardia.

Cor. monopetala infundibuliforme. *Sem.* 2, tridentati.

S. arvensis. (Acker) S. dei campi.
Foglie tutte verticillate, fiori terminali. *Pers. Syn.* I *p.* 124. *Röhl. germ. p.* 149. *Schult. aust.* I p. 313.
Rubia parva flore caeruleos, se pargens. *Bauh. Hist.* III *p.* 719. cum icone.
Asperula caerulea. *Dalech. Hist. p.* 870. cum icone.
Nasce nel Lido, *nei* Treporti *e nel* Cavallino; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* annuale.

ASPERULA. (Waldmeister) Asperola.
Cor. monopetala infundibuliforme. *Sem.* 2, globosi.

A. cynanchica. (Hügel W.) A. collina.
Foglie quaterne lineari, le superiori opposte, fusto dritto, fiori quadrifidi. *Pers. Syn.* I *p.* 124. *Röhl. germ.* II *p.* 149. *Schult. aust.* I *p.* 312.
Rubeola vulgaris quadrifolia, laevis, floribus purpurascentibus. *Zann. Ven. ic. t.* 81.
Rubia cynanchicha. *Bauh. Hist.* III *p.* 723. cum icone.
Nasce nel Lido *nei luoghi* arenosi *e* secchi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

GALIUM. (Labkraut) Gaglio (*Savi*).
Cor. monopetala piana. *Sem.* 2, subrotondi.
Frutto glabro.
1. *G. palustre*. (Sumpf. L.) G. paludoso.
Foglie quaterne, ovate a rovescio, ineguali, fusti giacenti. *Pers. Syn.* I *p.* 125. *Röhl. germ.* II *p.* 146. *Schult. aust.* I *p.* 301.
Nasce intorno Malghera *nei* Paludi e Fossi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *e* Agosto, *ed è* perenne.

2. *G. verum*. (Gelbes L.) G. giallo.

Foglie ottone, lineari solcate, fiori in pannocchia, rami fioriferi brevi. *Pers. Syn.* I *p.* 127. *Röhl. germ.* II *p.* 147. *Schult. aust.* I *p.* 303. *Savi. Mat. Med. t.* 35.

Galium luteum. *Zann. Ven. ic. t.* 110. *f.* 1.

Galium verum. *Bauh. Hist.* III *p.* 720 cum icone.

Galium luteum matthioli. *Dalechamp. Hist. p.* 1088. cum icone.

Gallio. *Matth.* 1190. cum icone.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi* erbosi *ed* umidi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

3. *G. mollugo*. (Weisses L.) G. bianco.

Nitido, foglie ottone ovato-lineari quasi seghettate, richinate, mucronate, fusto debole, rami patenti. *Pers. Syn.* I *p.* 127. *Röhl germ.* II *p.* 147. *Schult. aust.* I *p.* 304.

G. album vulgare. *Zann. Ven. p.* 107.

G. album. *Bauh. Hist.* III *p.* 721. cum icone.

Nasce nei luoghi umidi *intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

Frutto ispido.

4. *G. Aparine*. (Kletterndes L.) G. Appicamani.

Foglie ottone lanceolate, carene scabre, aculeate all' indietro, ginocchi villosi. *Pers. Syn.* I *p.* 128. *Röhl. germ.* II. *p.* 148. *Schult. aust.* I *p.* 308. *Savi. Mat. Med. t.* 35.

Aparine. *Bauh. Hist.* III *p.* 713. cum icone. *Dalechamp. Hist. p.* 1330. *Matth p.* 852. cum icone.

Nasce nei luoghi coltivati *e negli* Orti; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* annuale.

RUBIA. (Röthe) Robbia.

Cor. monopetala campanulata 4-5-fida. *Bache* 2. monosperne.

R. tinctorum. (Färber R.) R. dei Tintori.

Foglie lanceolate, quasi sene, annue, fusto aculeato rampicante. *Pers. Syn.* I p. 129. *Röhl. germ.* II *p.* 145. *Schult. aust.* I *p.* 300.

R. sylvestris monspessulana major. *Bauh. Hist.* III *p.* 715. *sine icone*.

β *R. sylvestris*. Foglie inferiori sene, le superiori quaterne ovvero bine aspre dalle due parti.

R. tinctorum sativa. *Zann. Ven. ic. tab.* 120.

R. sativa. *Bauh. Hist.* III *p.* 714.

Nasce intorno Malamocco *nei luoghi* erbosi, *e nei luoghi* montuosi *e* arenosi *nel* Cavallino; *fiorisce nel mese di* Giugno, *ed è* perenne.

PLANTAGO. (Wegerich) Piantagine.

Cal. 4-fida. *Cor.* 4-fida, lembo inchinato. *Stami* lunghissimi. *Cass.* di due cavità, coperchiata.

1. *P. maxima*. (Gröstes W.) P. massima.

Foglie ovate concavo cucollate con nove nervi glabre. Spiga cilindrica imbricata, scapo terete. *Pers. Syn.* sub P. cucullata? *Schult. aust. p.* 295?

P. maritima latifolia glabra, spica lougiori purpurascente. *Zann. Ven. ic. t.* 75.

Nasce nei luoghi inondati dall' acqua salsa *specialmente intorno* Malghera *e* Campalto; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* perenne.

Specie distinta dalla P. cucullata? *Pers. l. c.?*

2. *P. major*. (Grosser W.) P. grande.
Foglie ovate glabre, scapo terete spiga con fiori imbricati. *Pers. Syn. p.* 138. *Röhl. germ. p.* 143. *Schult. aust.* I *p.* 294.
P. latifolia sinuata. *Zann. Ven. ic. t.* 137.
P. major folio glabro non laciniato. *Bauh. Hist.* III *p.* 502. cum icone.
Piantaggine maggiore. *Matth. p.* 508.
Nasce comunemente negli Orti; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Ottobre, *ed è* perenne.

3. *P. media*. (Mittlerer W.) P. mezzana.
Foglie ovato-lanceolate pubescenti, spiga cilindrica, scapo terete. *Pers. l. c. Röhl. germ. p.* 143. *Schult. aust.* I *p.* 295.
P. major hirsuta media. *Bauh. Hist.* III *p.* 504. cum icone.
Piantaggine mezzana. *Matth. p.* 507. cum icone.
Nasce intorno Malghera *nei* Prati erbosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *sino* Settembre, *ed è* perenne.

4. *P. altissima*. (Höchster W.) P. altissima.
Foglie lanceolate con cinque nervi dentate glabre, spiga bislunga cylindrica, scapo angolato scabro. *Pers. l. c. Schult. aust.* I *p.* 296.

Nasce nel luogo detto Aca bianca; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

4. *P. lanceolata*. (Lanzenblättriger W.) P. lanceolata: Foglie lanceolate, spiga subovata nuda, scapo angolato. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p.* 144. *Schult. l. c. Savi. Mat. Med. t.* 39.
P. angustifolia major. *Zann. Ven. p.* 212. *t.* 111 et 191.
P. lanceolata. *Bauh. Hist.* III *p.* 505. cum icone.
Piantaggine lunga. *Matth. p.* 509. cum icone..
β *P. polistachia*. Spica composita. *Pers. l. c.*
ϰ *P.* spica apice foliosa. *Schult. l. c.*
Nasce nei luoghi erbosi, *nei* Prati *e negli* Orti; *fiorisce nei mesi di* Maggio *sino* Ottobre, *ed è* perenne.

5. *P. maritima*. (Meerstrands W.) P. marino.
Foglie semicilindriche, interissime, alla base lanate, scapo terete. *Pers. Syn.* I *p.* 139. *Röhl. loc. cit. Schult. l. c. p.* 197.
P. maritima major tennifolia. *Zann. Ven. ic. t.* 60.
Coronopus maritima nostras. *Bauh. Hist.* III *p.* 511. cum icone.
β con foglie dentate.
Nasce nei Treporti *nei luoghi* arenosi *ed* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *e* Agosto, *ed è* perenne.

6. P. *coronopus*. (Krähenfussartiger W.) P. coronopo.
Foglie lineari dentate, scapo terete. *L. Pers. Syn.* I *p.* 139. *Röhl. l. c. Schult. aust.* I *p.* 299.

Coronopus hortensis. *Zann. Ven. ic. t.* 207.

Coronopus s. cornu cervinum vulgo, spica plantaginis. *Bauh. Hist.* III *p.* 509. cum icone.

Coronopo. *Matth. p.* 522. cum icone.

Nasce nei luoghi arenosi *e* umidi *nel* Lido *e* Malamocco; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è pianta* annuale.

7. P. *Psyllium*. (Betäubender W.) P. psillio.

Fusto ramoso, foglie quasi dentate recurvate, capolini senza foglie. *Pers. Syn.* I *p.* 140. *Röhl. germ.* II *p.* 144.

Psyllium majus erectum. *Zannichel Ven. p.* 220. *t.* 77. *Bauh. Hist.* III *p.* 513.

Nasce nel Lido *e* Malamocco *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* annuale.

CORNUS. (Kornelbaum) Corgniolo.

Involglio spesso di quattro foglie, *petali* quattro superiori. *Drupa* con nocciolo di due cavità.

C. sanguinea. (Rother K.) C. sanguineo.

Arborea, cime senza involglio, rami dritti. *L. Sp. pl. Gmel. Syst. Nat.*

C. ramis rectis, foliis ovatis concoloribus, cymis depressis. *Pers. Syn.* I *p.* 143. *Röhl. germ.* II *p.* 150. *Schult. aust.* I *p.* 315.

C. foemina. *Zann. Ven. p.* 73.

C. foemina, putata, virga sanguinea. *I. Bauh. Hist.* I *p.* 214 sine icone.

C. foemina. *Dalech. Hist. p.* 197. cum icone.
Sanguina. *Matth. p.* 280 cum icone.
Nasce comunemente intorno Mestre *vicino i* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno.

TETRAGYNIA

POTAMOGETON. (Saamkraut) Potamogeto.
Cal. o. *Petali* 4. *Stilo* o. *Sem.* 4.

1. P. *lucens.* (Leuchtender) P. lucente.
Foglie lanceolate desinenti nel picciolo, opposte, piane, trinervate. *Pers. Syn.* I *p.* 152. *Röhl. germ.* II *p.* 154. *chult. aust.* I *p.* 326.
Fontinalis lucens major. *Bauh. Hist.* III *p.* 777. cum icone.
Nasce intorno Campalto *nei* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

2. P. *perfoliatum.* (Durchwachsenes S.) P. perfoliato.
Foglie cuoriformi abbraccianti il fusto. *Pers. l. c. Röhl. germ.* II *p.* 154. *Schult. aust.* I *p.* 325.
F. altera Dodonei. *Bauh. Hist.* III *p.* 778. cum icone.
Nasce nei Fossi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* perenne.

PENTANDRIA

MONOGYNIA.

MYOSOTIS. (Mauschr) Miosotide.

Cor. ipocrateriforme 5-fida, con lobi smarginati e fauce chiusa da squame. *Semi* lisci ovvero echinati.

Semi lisci.

1. *M. arvensis*. (Acker M.) M. dei campi.

Fusto ramosissimo alla base, peloso, foglie lingolate pelose, grappolo nudo, corolla connivente. *Pers. Syn.* I *p.* 256. *Röhl. germ.* II *p.* 160. *Schult. aust.* I *p.* 366.

Lythospermum arvense minus. *Zann. Ven. p.* 170.

Echium scorpioides, solisequum, flore minore. *Bauh. Hist.* III *p.* 589 cum icone.

Nasce nei Campi *e negli* Orti; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* annuale.

2. *M. palustris*. (Sumpf M.) M. dei paludi.

Fusto quasi semplice, foglie lanceolate ottuse. *Cal.* e *Cor.* patenti. *Pers. Syn. l. c. Röhl. l. c. p.* 160. *Schult. l. c. p.* 365.

Lythospermum palustre minus, flore caeruleo. *Zann. loc. cit.*

Lycopsis montana caerulea ec. ec. *Barr. ic. t.* 404.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi* acquosi *o* umidi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

LITHOSPERMUM. (Steinsame) Litospermo:
Cor. infundibuliforme; *fauce* nuda. *Cal.* 5-partito: *Sem.* ossei, nitidi.

L. arvense. (Acker S.) L. dei campi:
Semi rugosi neri, corolla appena più lunga del calice. *Pers. Syn.* I *p.* 158. *Röhl. germ.* II. *p.* 156. *Schult. aust.* I *p.* 357.
Buglossum arvense, annuum, lithospermi folio. *Zann. Ven. p.* 42. *t.* 169.
Lithospermum nigrum quibusdam, flore albo, semine Echii. *Bauh. l. c. p.* 592.
Nasce nel Lido *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta annuale.

CYNOGLOSSUM. (Hundszunge) Cinoglosso.
Cor. infundibuliforme con *fauce* chiusa da squame convesse conniventi. *Semi* depressi attaccati allo stilo.

C. officinale. (Gemeine H.) C. comune.
Stami più brevi della corolla, foglie lanceolate tomentose, sessili, un poco conferte, semi tubercolati. *Schult. aust.* I *p.* 361. *Röhl. germ.* II *p.* 158.
C. Staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis, sessilibus. *L. Pers. Syn.* I *p.* 159.
C. majus vulgare. *Zann. Ven., ic. t.* 219.
C. vulgare. *Bauh. Hist.* III *p.* 598 cum icone.
Cinoglossa volgare fiorita. *Matth.* 1250.
Nasce intorno il luogo detto Cavallino *e* Treporti

nei luoghi erbosi asciutti; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* biennale.

SYMPHITUM. (Beinwell) Sinfito.

Cor. col lembo tubuloso e ventricoso, chiusa da squame lesiniformi.

1. S. *officinale*. (Gemeine B.) S. officinale.

Foglie ovato-lanceolate scorrenti. *L. Pers. Syn.* I *p.* 161. *Röhl. germ.* II *p.* 157. *Schult. aust.* I *p.* 359.

S. magnum. *Bauh. Hist.* III *p.* 593. cum icone.

Consolida maggiore. *Matth. p.* 1012. cum icone.

Nasce nei luoghi erbosi umidi *intorno* Malghera *e* Mestre; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Agosto, *ed è* perenne.

2. S. *tuberosum*. (Knollige B.) S. tuberoso.

Foglie ovate semiscorrenti, le inferiori picciolate, le superiori opposte, lacinie della corolla brevissime ottuse. *Schult. aust.* I *p.* 359.

S. foliis ovatis semidecurrentibus, summis oppositis. *Pers. Syn. l. c. Röhl. l. c.*

S. majus tuberosa radice. *Zann. Ven. p.* 254. *t.* 218.

S. tuberosum. *Bauh. l. c. p.* 594. cum icone.

Nasce nei luoghi montuosi *e* ombrosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

BORRAGO. (Boretsche) Borragine.

Cal. 5-partito. *Cor.* rotata, *fauce* chiusa da squame ottuse e smarginate.

B. *officinalis*. (Gemeine B.) B. volgare.

Foglie alterne, calici patenti. *Pers. Syn.* I *p.* 162. *Röhl. germ.* II *p.* 158. *Schult. aust.* I *p.* 360.

B. floribus caeruleis et albis. *Bauh Hist.* III *p.* 574. cum icone mala.

B. buglossum verum. *Dalech. Hist. p.* 578. c. icone

Buglossa vera. *Matth p.* 1245. cum icone.

Nasce negli Orti *e nei luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

ASPERUGO. (Scharfkraut) Asperugine.

Cor. infundibuliforme, *fauce* chiusa da squame convesse. *Cal.* fruttifero compresso, foglie piano. paralelle sinuate.

A. procumbens. (Liegendes S.) A. giacente.

Pers. Syn. I *p.* 162. *Röhl. germ.* II *p.* 158. *Schult. aust.* I *p.* 361.

A. vulgaris. *Zann. Ven. ic. t.* 230.

Cynoglossa forte topiaria plinio sive echium lappulatum quibusdam. *Bauh. Hist.* III *p.* 590. cum icone.

Si trova benchè di raro intorno i terreni *di* S. Marta *nei luoghi* asciutti; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta annuale.

ECHIUM. (Natterwurz) Echio.

Cal. 5-partito. *Cor.* monopetala campaniforme, 5-fida, con lacinie spesso ineguali, fauce nuda.

E. *vulgare*. (Gemeine N.) E. volgare.

Fusto tubercolato-ispido, foglie del fusto lanceolate ispide, fiori spicati laterali. *L. Pers. Syn.* I. *p.* 164. *Röhl. germ.* II *p.* 156. *Schult. aust.* I *p.* 354.
Echium majus vulgare. *Zann. Ven. ic. t.* 128.
Echium vulgare. *Bauh. Hist.* III *p.* 586. cum icone.
Echio. *Matth. p.* 1049. cum icone.
Nasce intorno Cortelazzo *nei luoghi* asciutti; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta biennale.

HOTTONIA. (Hottonie) Ottonia.
Cal. 5-partito. *Cor.* ipocrateriforme 5-fida, con lacinie smarginate. *Stim.* globoso. *Cass.* globosa acuminata di una sola cavità.

H. *palustris*. (Sumpf H.) O. dei paludi.
Fiori in verticilli, peduncolati. *Pers. Syn.* I *p.* 171. *Röhl. germ.* I *p.* 164. *Schult. aust.* I *p.* 379.
Millefolium aquaticum dictum viola aquatica. *Bauh. Hist.* III *p.* 783 cum icone.
Viola palustris. *Dalech. Hist. p.* 1022. cum icone.
Un altro miriophillo. *Matth. p.* 1227. cum icone.
Nasce in Campalto *nei* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

SAMOLUS. (Pungen) Samolo.
Cal. 5 partito. *Cor.* ipocrateriforme 5-fida. *Stami* inserti nel tubo. *Cass.* di una sola cavità con cinque denti, e con molti semi.

S. *Valerandi*. (strand P.) S. di valerando.

Fusto dritto, foglie ottuse, grappolo con molti fiori. *Pers. Syn.* I *p.* 171. *Röhl. germ.* II *p.* 170. *Schult. aust.* I *p.* 396.

S. valerandi. *Zann. Ven. ic. tab.* 56. *f.* 2. *Bauh. Hist.* III *p.* 791. cum icone.

Anagallis aquatica, altera Lobelii. *Dalechamp. Hist. p.* 1099. cum icone.

Nasce nei luoghi inondati dall'acqua salsa *specialmente intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta biennale.

LYSIMACHIA. (Goldblume) Lisimachia.

Cal. 5-partito. *Cor.* rotata 5-partita. *Cass.* mucronata globosa di una sola cavità, e con dieci valve.

1. L. *vulgaris*. (Gemeine G.) L. volgare.

Foglie terne ovato-lanceolate, grappoli terminali. *Pers. Syn.* I *p.* 172. *Röhl. germ.* II *p.* 161. *Schult. aust.* I *p.* 370.

L. lutea quae dioscoridis. *Zann. Ven. ic. t.* 157. mal.

L. lutea. *Bauh. Hist.* II *p.* 901. cum icone mala.

L. matthioli. *Dalech. Hist. p.* 1059. cum icone.

Lisimachia. *Matth. p.* 999. cum icone.

Nasce nei Fossi, *specialmente intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* perenne.

2. L. *Nummularia*. (Pfennigkraut) Nummolaria.

Foglie cuoriformi, fiori solitarii ascellari, fusto serpeggiante. *Pers. Syn.* I *p.* 172. *Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 371.

Nummularia major lutea. *Zann. Ven. ic. t.* 297.

Nummularia sive centimorbia. *Bauh. Hist.* III *p.* 370. cum icone.

Nummularia. *Dalech. Hist. p.* 1062. cum icone.

Nummolaria. *Matth. p* 1067. cum icone.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

ANAGALLIS. (Gauchheil) Anagallide.

Cal. 5-partito. *Cor.* rotata 5-partita. *Filam.* irsuti. *Cass.* di una sola cavità coperchiata.

1. A. *phoenicea*. (Rothes G.) A. feniceo.

Fusto giacente, foglie ovato-lanceolate con tre nervi, lacinie del calice lanceolate. *Pers. Syn.* I *p.* 173. sub A. arvensis. *Röhl. germ.* II *p.* 160. *Schult. aust.* I *p.* 368.

A. phoeniceo flore. *Zann. Ven. ic. t.* 238.

A. phoenicea mas. *Bauh. Hist.* III *p.* 369.

Anagallide maschio. *Matth p.* 656. cum icone.

Nasce nei Campi *e negli* Orti, *e luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Maggio *sino* Agosto, *ed è* pianta annuale.

2. A. *caerulea*. (Blaues G.) A. celeste.

Fusto giacente, foglie ovato-lanceolate spesso con cinque nervi, lacinie del calice lesiniformi. *Röhl. germ.* II *p.* 161. *Schult. aust.* I *p.* 369.

A. Caule erectiusculo, subalato, petalis dentatis, demum reflexis. *Pers Syn.* I *p.* 173.

A. ceruleo flore. *Zann. Ven. p.* 15.

A. caerulea foemina. *Bauh. Hist.* III *p.* 369. cum ic.

Anagallide femmina. *Matth. p.* 657. cum icone.
Nasce come la precedente, ma si trova più di rado.

CONVOLVULUS. (Winde) Villuchio.
Cal. 5-partito. *Cor.* campaniforme pieghettata. *Stim.* due, semplici. *Cass.* di due o tre cavità, con *logge* disperme.

Fusto volubile:

1. C. *arvensis*. (Aker W.) V. dei campi.
Foglie saettiformi, acuminate da ambi le parti, peduncoli quasi con un solo fiore, brattee lontane dal fiore, lesiniformi *Pers. Syn.* I *p.* 177. *Röhl. germ.* II *p.* 165. *Schult. aust.* I *p.* 380.
C. minor arvensis flore roseo. *Zann. Ven. p.* 72.
Helxine cyssampelos multis sive convolvulus minor. *Bauh. Hist.* II *p.* 157 cum icone.
Helsine. *Matth. p.* 1065. cum icone.
Nasce nei Prati *intorno* Malghera, *e comunemente negli* Orti; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. *C. sepium*. (Zaun W.) V. delle siepi.
Foglie saettiformi, posteriormente troncate, peduncoli tetragoni, uniflori, brattee cuoriformi grandi. *Pers. Syn. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 381.
C. major albus. *Zann. Ven. p.* 72.
C. major. *Bauh. Hist.* II *p.* 154. cum icone.
Nasce lungo le Siepi *e negli* Orti; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

Fusto giacente, non volubile.

3. *C. soldanella*. (Meerstrands W.) V. marino.

Foglie reniformi, peduncoli uniflori. *Pers. Syn.* I *p.* 182. *Röhl. l. c.*

C. maritimus nostras rotundi folius. *Zann. Ven. ic. t.* 6.

Brassica marina sive soldanella. *Bauh. Hist.* II *p.* 166. cum icone.

Brassica marina. *Matth. p.* 497. cum icone.

Nasce nel Lido, Malamocco *e* Treporti, *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed* è pianta perenne.

CAMPANULA. (Glokenblume) Campanula.

Cal. 5-partito. *Cor.* campaniforme. *Filam.* allargati alla base. *Cass.* subrotonda con 3-5 cavità, e con molti semi. (*Stimm.* 2-fido).

1. *C. Rapunculus*. (Rapunzel G.) Raperonzolo.

Radice fusiforme, foglie ondate pelose, le radicali lanceolato-ovali, pannochia approssimata. *Pers. Syn.* I *p.* 189. *Röhl. germ.* II *p.* 173. *Schult. aust.* I *p.* 404.

C. Radice esculenta, flore caeruleo. *Zann. Ven. ic. t.* 102 mal.

Rapunculus vulgaris esculentus. *Bauh. Hist.* II *p.* 795. cum icone.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed* è biennale.

2. *C. pyramidalis*. (Piramidenartige) C. piramidale.

Foglie liscie cuoriformi seghettate, quelle del fusto lanceolate, ombrelle laterali sessili, fusto junciforme. *Pers. Syn.* I *p.* 189. *Röhl. germ. Schult. aust.* I *p.* 405.

Pyramidalis laevis. *Bauh. Hist.* II *p.* 808. cum icone.

Pyramidalis rapunculi genus. *Dalech. Hist. p.* 642. cum icone; *et* lactescens campanula major *p.* 827. cum icone.

Nasce nei Muri *antichi e luoghi* sassosi; *fiorisce nei mesi di* Settembre *ed* Ottobre, *ed è* pianta biennale.

PRISMATOCARPOS. L'HERIT. (Venuspiegel) Specolo.

Cor. quasi ipocrateriforme. *Cass.* lunghissima prismatico-cilindrica di due ovvero tre cavità, e con molti semi.

P. *arvensis*. (Acker V.) S. dei campi.

Fusto ramosissimo, foglie bislunghe quasi intaccate, fiori solitarii. Campanula speculum. *L. Pers. Syn.* I *p.* 193. *Röhl. germ.* II *p.* 176. *Schult. aust.* I *p.* 414.

Auricularia sylvii quibusdam. *Bauh. Hist.* II *p.* 800. cum icone.

Nasce fra le Biade, *specialmente in* Campalto; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

LONICERA. (Lonicere) Lonicera.

Cal. 5-dentato. *Cor.* tubulosa 5-fida irregolare. *Bacca* inferiore di 2-3 cavità.

L. Caprifolium. (Durchwarsene L.) L. caprifoglio.

Fiori ringenti terminali sessili, foglie superiori connato-perfogliate. *L. Pers. Syn.* I *p.* 213. *Schult. aust.* I *p.* 414.

Caprifolium perfoliatum. *Röhl. germ. p.* 175.

Caprifolium italicum. *Zann. Ven. ic. t.* 130.

Peryclimen. perfoliatum. *Bauh. Hist.* II *p.* 104. cum icone.

Nasce nel Cavallino; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta frutescente.

VERBASCUM. (Königskerze) Verbasco.

Cal. 5-partito. *Cor.* rotata quasi ineguale 5-partita. *Filam.* barbati. *Cass.* subrotonda di due cavità e con due valve.

1. V. *Thapsus*. (Gemeine K.) V. comune.

Foglie ovate a rovescio bislunghe acute tomentose, fiori disposti in spighe lunghe quasi sessili. *Pers. Syn.* I *p.* 214. *Schult. aust.* I *p.* 382.

V. mas latifolium luteum. *Zannichel. Ven. ic. t.* 286.

V. vulgare flore luteo magno. *Bauh. Hist.* III *p.* 871. cum icone.

Verbasco primo. *Matth. p.* 1202. cum icone.

Nasce negli Orti *e in* Fusina; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

2. V. *blattaria*. (Motten K.) V. blattaria.

Fusto ramoso, foglie abbraccianti il fusto bislunghe glabre, peduncoli solitarii. *L. Pers. Syn.* I *p.* 215. *Röhl. germ. p.* 167. *Schult. l. c. p.* 388.

Blattaria lutea folio longo laciniato. *Zannich. Ven. p.* 38.

Blattaria lutea. *Bauh. Hist.* III *p.* 874.

Blattaria. *Matth. p.* 1210. cum icone.

Nasce negli Orti; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Agosto, *ed è* pianta biennale.

3. *V. sinuatum*. (Buchtige K.) V. sinuato.

Foglie radicali pennatofesse, repande tomentose, quelle del fusto abbraccianti il fusto un poco nude, quelle dei rami, prime, opposte. *L. Pers. loc. cit.*

V. nigrum, foliis papaveris corniculati. *Zann. Ven. ic. t.* 205.

V. crispum et sinuatum. *Bauh. Hist.* III *p.* 872. cum icone.

Nasce nel Lido; *fiorisce nei mesi* di Giugno *sino* Agosto, *ed è* pianta bienne.

DATURA. (Stechapfel) Stramonio.

Cal. tuboloso angolato 5-dentato caduco. *Cor.* infundibuliforme, piegata. *Cass.* di due cavità, e con quattro valve liscie ovvero spinose.

D. Stramonium. (Gemeiner S.) S. comune.

Frutti spinosi, eretti, ovati, foglie ovate sinuate glabre. *L. Pers. Syn.* I *p.* 216. *Schult. aust. p.* 382.

Stramonium fructu spinoso, oblongo, flore albo. *Zann. Ven. ic. t.* 84.

Stramon altera major s. datura quibusdam. *Bauh. Hist.* III *p.* 624. cum icone.

Nasce nei luoghi coltivati, *specialmente in* Campalto; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Agosto, *ed è* pianta annuale.

HYOSCYAMUS. (Bilsenkraut) Giusquiamo.

Cal. tubuloso 5-fido. *Cor.* infundibuliforme ottusa irregolare. *Cass.* ottusa coperchiata, di due cavità, e con molti semi.

1. *H. niger*. (Schwarzes B.) G. nero.

Foglie abbraccianti il fusto, sinuate, fiori venosi, sessili. *L. Pers. Syn.* I *p.* 217. *Röhl. germ.* II *p.* 165. *Schult. l. c. Savi. Mat. Med. t.* 4.

H. vulgaris v. niger. *Zann. Ven. t.* 255. mal.

H. vulgaris. *Bauh. Hist.* III *p.* 627. cum icone.

Hioscyamo. *Matth. p.* 1119. cum icone.

Nasce negli Orti *e nei luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Agosto, *ed è* pianta annuale *e* biennale.

2. *H. albus*. (weisses B.) G. bianco.

Foglie picciolate, sinuate, ottuse, fiori sessili. *Lin. Pers. l. c. Röhl. l. c. p.* 166. *Schult. l. c. p.* 383. *Savi l. c. t.* 24.

H. albus. *Bauh. l. c. p.* 627. cum icone.

Hiosciamo bianco. *Matth. p.* 1220. cum icone.

Nasce nei luoghi sassosi *e* muri, *specialmente nei* terreni *intorno* S. Marta; *fiorisce nei mesi di* Aprile *sino* Luglio, *ed è* pianta annuale.

PHYSALIS. (Schlutte) Fisalide.

Cal. ventricoso semicinquefido, pentagono. *Cor.* ruotata. *Stam.* conniventi. *Bacca* chiusa nel calice gonfio, di due cavità.

P. Alkekengi. (Gemeine S.) F. comune.

Foglie gemelle intere, fusto erbaceo inferiormente quasi ramoso. *L. Pers. Syn.* I *p.* 220. *Röhl. germ.* II *p.* 169. *Schult. aust.* I *p.* 395. *Savi. Mat. Med. t.* 59.

Alkekengi officinarum. *Zannich. Ven. ic. t.* 235.

Solanum halicacabum vulgare. *Bauh. Hist.* III p. 609 cum icone.

Solatro halicacabo. *Matth. p.* 1126. cum icone.

Nasce intorno S. Niccolò di Lido *nei luoghi* sassosi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* perenne.

SOLANUM. (Nachtschatten) Solatro.

Cal. persistente. *Cor.* rotata, 5-loba piegata. *Antere* quasi attaccate insieme, aperte nella cima con due fiori. *Bacca* di due cavità con molti *semi*.

1. *S. Dulcamara*. (Kletternder N.) S. dolcamaro.

Fusto inerme, fruticoso, foglie superiori astate, grappoli cimiformi opposti alle foglie. *L. Röhl. germ.* II *p.* 169.

S. caule inermi fruticoso scandente, foliis cordatis glabris superioribus auriculatis, corymbis oppositifoliis. *Pers. Syn.* I *p.* 224. *Schult. aust.* I *p.* 392. *Savi. Mat. Med. t.* 14.

S. scandens seu dulcamara. *Zann. Ven. p.* 249.

Glycypicros s. amara dulcis. *Bauh. Hist.* II *p.* 109. cum icone.

Vite salvatica. *Matth. p.* 1345. cum icone.

Nasce comunemente nel Lido *e* Campalto *nelle* Siepi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Ottobre, *ed* è frutescente.

3. *S. nigrum*. (Schwarzer N.) S nero:

Fusto inerme erbaceo, foglie ovate dentato-angolate, ombrelle laterali nutanti. *Lin. Pers. Syn.* I *p.* 224. *Röhl. germ. l. c. Schult. l. c. p.* 393.

S. officinarum acinis nigricantibus. *Zann. Ven. p.* 248. *t.* 267.

S. hortense s. vulgare acinis nigris. *Bauh. Hist.* III *p.* 608.

β *S. villosum*. Fusto e foglie villose. *L. Pers. l. c. Röhl. l. c.*

S. officinarum acinis luteis. *Zann. Ven. p.* 249.

Nasce comunemente negli Orti *e luoghi* coltivati, *specialmente nei* Rovinazzi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *sino* Novembre, *ed è* pianta annuale.

RHAMNUS (Wegdorn) Ramno.

Cal. campaniforme 4-5 fido. *Cor.* regolare di cinque petali paleiformi. *Stim.* 1-2-4-fido. *Bacca* con 3-4 semi.

R. Frangula. (Glatter W.) R. glabro.

Inerme, fiori monogini ermafroditi, foglie interissime glabre. *Pers. Syn.* I *p.* 239. *Röhl. germ* II *p.* 177. *Schult. aust.* I *p.* 418.

Frangula. *Zann. Ven. ic. t.* 1.

Alnus nigra baccifera. *Bauh. Hist.* I *p.* 560. cum icone.

Nasce nei luoghi umidi, *specialmente intorno* Cortelazzo; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Agosto, *ed è* pianta frutescente.

EVONYMUS. (Spindelbaum) Fusano.

Cal. 5-partito con lacinie concave. *Cor.* di cinque petali. *Cass.* 5-gona di cinque cavità e con cinque valve colorata. *Semi* con arillo membranaceo.

E. europeus. (Gemeiner S.) F. comune.

Fiori, la maggior parte tetrandri 4-fidi, petali acuti, peduncoli compressi multiflori, stimma lesiniforme, foglie glabre: *Pers. Syn.* I *p.* 243. *Röhl. germ.* II *p.* 178. *Schult. aust.* I *p.* 419.

E. multis, aliis tetragonia. *Bauh. Hist.* I *p.* 201. cum icone.

Nasce in Campalto *nelle* Siepi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* fruticosa.

HEDERA. (Epheu) Edera.

Petali 5-bislunghi, *bacca* con cinque semi cinta dal calice.

H. helix. (Gemeiner E.) E. volgare.

Foglie 3-5-lobe, le florali ovate, ombrella dritta. *L. Pers. Syn.*

H. arborea. *Matth. p.* 659. cum icone.

Nasce in Campalto *nei* muri *e sugli* alberi; *fiori-*

sce nei mesi di Agosto e Settembre, *ed è* pianta fruticosa.

VITIS. (Wein) Vite.

Cal. piccolissimo 5 dentato. *Petali* quasi sempre aderenti fra loro per la cima e che si staccano dalla base. *Stimma* capitato. *Bacca* rotonda con cinque semi. (*Savi*).

V. vinifera. (Edler W.) V. comune.

Foglie lobate, sinuate, nude, ovvero tomentose *Pers. Syn.* I *p.* 252.

V. vinifera. *Bauh. Hist.* II *p.* 67.

Vite vinifera. *Matth. p.* 1376. cum icone.

Nasce comunemente nel Lido *nei luoghi* arenosi, *e viene coltivata negli* Orti; *fiorisce il mese di* Giugno, *ed è* fruticosa.

VIOLA. (Veilchen) Viola.

Cal. di cinque foglie. *Cor.* di cinque petali irregolari, uno dei quali posteriormente termina in un cornetto. *Antere* coerenti nella cima. *Cass.* superiore di una sola cavità, e con tre valve.

1. *V. odorata*. (Wohlriechendes V.) V. odorosa.

Senza fusto, foglie cuoriformi, stoloni serpeggianti. *L. Pers. Syn.* I *p.* 254. *Röhl. germ.* II *p.* 179. *Schult. aust.* I *p.* 422.

V. martia purpurea, flore simplici odoro. *Zannich. Ven. t.* 270.

V. martia purpurea. *Bauh. Hist.* III *p.* 542 cum icone.

Viole porporee. *Matth. p.* 1239.

β *V. alba*. Floribus albis. *Schult. l. c.*

Nasce comunemente in Campalto *appresso le* Siepi, *e nei luoghi* ombrosi; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta perenne.

2. *V. tricolor*. (Dreifarbiges V.) V. socera e Nora. (*Savi*)

Fusti angolati, glabri diffusi, foglie bislunghe intagliate, intaccate, stipole pennatofesse. *L. Pers. Syn.* I *p.* 255. *Röhl. germ.* II *p.* 180. *Schult. l. c. p.* 429. *Savi. Mat. Med. t.* 28.

Jacea bicolor, frugum et hortorum vitium trago. *Bauh. l. c. p.* 548.

Viola flammea minor. *Dalech. Hist. p.* 800 cum iconc.

Un' altra jacea. *Matth. p.* 1242.

Nasce intorno S. Marta, *e comunemente negli* Orti; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta annuale.

VINCETOXICUM. (Schwalbenwurtz) Vincetossico. *Cor.* ruotata dritta 5-partita. *Nettar.* Cinque squame o calli carnosi, retusi, *follicoli* 2, *semi* lanosi.

V. vulgare. (Gemeine S.) V. volgare.

Fusto eretto, foglie opposte cordato-ovate acute, un poco ciliate, ombrelle ascellari prolifere. *Schult. aust.* I *p.* 437.

Cynanchum (*Vincetoxicum*). Caule erecto, folis ovatis acuminatis tenuissime ciliatis. *Pers. Syn.*

Asclepias (*Vincetoxicum*). *Röhl. germ.* II *p.* 184.

Asclep. albo flore. *Zann. Ven. t.* 5.

Asc. s. vincetoxicum multis. *Bauh. Hist.* II *p.* 138 cum icone.

Vincetossico. *Matth. p.* 855. cum icone.

Nasce nei luoghi umidi, *e nelle* Siepi *in* Campalto; *fiorisce nei mesi di* Maggio *sino* Settembre, *ed è* pianta perenne.

APOCYNUM. (Hundswolle) Apocino.

Cor. campaniforme semi 5-fida, con lobi piegati in fuori colla cima. *Stil.* quasi o. *Stim.* largo. Due *follicoli* lunghi lineari.

A venetum. (Venetianische H) A. veneto.

Fusto dritto erbaceo, foglie elittico-lanceolate mucronate, dentellato-scabre nel margine. *Pers. Syn.* I *p.* 274.

A. maritimum venetum. *Zann. Ven. ic. t.* 76.

Alypum quibusdam s. esula rara flore purpureo. *Bauh. Hist.* I I *p.* 676. cum icone.

Nasce nei luoghi arenosi *e* secchi, *specialmente nel luogo detto* gli Alberoni; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

ERYTHREA. (Tausendguldenkraut) Centaurio.

Cal. stretto subpentagono 5 dentato. *Cor.* infundibuliforme col tubo lungo. *Antere* attorcigliate a spira dopo la fecondazione. *Stim.* 1-2. approssimati. *Cass.* sottile di una sola cavità.

E. centaurium. (Gemeines T.) C. comune.

Foglie ovali-bislunghe, fusto dicotomo, fiori fascicolato-paniculati con 1-2. squame alla base. *Pers. Syn.* I *p.* 283.

Gentiana centaurium. *L. Sp. pl.*

Chironia Centaurium. *Röhl. germ.* II *p.* 167.

Hippocentaurea centaurium. *Schult. aust.* I *p.* 388.

Centaurium minus. *Zann. Ven. p.* 55. *t.* 249.

Centaur. minus flore purpureo. *Bauh. Hist.* III *p.* 353. cum icone.

Centaurea minore. *Matth p.* 692. cum icone.

β floribus albis. *Pers. l. c.*

Nasce comunemente nei Prati umidi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Agosto, *ed è* pianta annuale.

DYGYNIA

GENTIANA. (Entzian) Gentiana.

Cor. 1-petala. *Cass.* di una sola cavità, e con due valve. *Ricett.* due longitudinali.

1. *G. Pneumonanthe*. (Gemeiner E.) G. volgare.

Fiori 5-fidi campaniformi, ascellari peduncolati, foglie lineari-lanceolate ottuse. *Pers. Syn.* I *p.* 284. *Röhl. germ.* II *p.* 186. *Schult. aust.* I *p.* 441.

G. angustifolia autumnalis major. *Zann. Ven. t.* 39. *f.* 1.

Gentiana species calathiana quibusdam radice perpetua. *Bauh. Hist.* III *p.* 524 cum icone.

Gentianella. *Barr. ic. t.* 52.

Calathiana viola et campanula pratensis. *Dalechamp. Hist. p.* 824 cum icone.

Gentiana minima. *Matth. p.* 682. cum icone.

Nasce comunemente nei Treporti *e nel* Cavallino *nei* Prati umidi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta perenne.

2. *G. amarella.* (Amarellen E.) G. amarella.

Cor. ipocrateriformi 5-fide, colla fauce barbata, lacinie del calice eguali, foglie ovato-lanceolate. *Pers. Syn.* I *p.* 286. *Röhl. germ. p.* 187. *Schult. aust.* I *p.* 446.

G. autumnalis ramosa. *Zann. Ven. p.* 109. *tab.* 58. *fig.* 1.

G. pratensis flore lanuginoso. *Zann. Ven. p.* 110. *t.* 46. *fig.* 1.

Gentianellae species quibusdam. *Bauh. Hist.* III *p.* 526. cum icone.

Nasce come la precedente.

CUSCUTA. (Flachseide) Cuscuta.

Cal. 4-5-fido. *Cor.* 4-5-fida. *Cass.* coperchiata di due cavità. *Stam.* 4 5.

C. vulgaris. (Gemeine F.) C. volgare.

Fiori quasi sessili, *stim.* acuti. *Pers. Syn.* I *p.* 289. *Röhl. germ. Schult. aust.*

C. major. *Zann. Ven. ic t.* 138. *fig.* 2.

Cassuta s. cuscuta. *Bauh. Hist.* III *p.* 265. cum icone.

Nasce in Malghera *e nel* Cavallino *sopra diverse* piante; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

ULMUS : (Rüster) Olmo.

Cal. campaniforme 5-fido. *Cor.* o. *Cass.* compressa membranaceo-alata.

U. campestris, (Gemeine R.) O. comune.

Foglie doppiamente seghettate, ineguali alla base, fiori quasi sessili conglomerati, con cinque stami, frutti glabri. *Pers. Syn.* I *p.* 291. *Röhl. germ.* II *p.* 196. *Schult. aust.* I *p.* 464.

U. campestris et Theophrasti. *Zannichel. Ven. p.* 279.

Ulmus. *Bauh. Hist.* I *p.* 139 cum icone.

Olmo. *Matth. p.* 161 cum icone.

Nasce intorno Fusina; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta arborea.

CHENOPODIUM. (Gänsefuss) Chenopodio.

Cal. di 5-foglie, 5-gono. *Sem.* 1 lenticolare superiore. *Cor.* o.

1. *C. urbicum*. (Stadt G.) C. cittadino.

Foglie triangolari, quasi dentate, grappoli conferti, drittissimi, approssimati al fusto, lunghissimi, quasi senza foglie. *Pers. Syn.* I *p.* 294. *Röhl. germ. p.* 189. *Schult. aust.* I *p.* 453.

Nasce nel luogo detto Aca bianca; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

2. *C. album*. (Weisser G.) C. bianco.

Foglie romboideo-ovate erose, posteriormente intere, le superiori bislunghe, grappoli dritti. *Pers. Syn.* I *p.* 294. *Röhl. l. c. p.* 190. *Schult. l. c. p.* 455.

Atriplex sylvestris. *Bauh. Hist.* III *p.* 972.

Nasce negli Orti; *fiorisce nei mesi di* Luglio *sino* Settembre, *ed è* pianta annuale.

3. *C. viride*. (Grüner G.) C. verde.

Foglie romboidali dentato-sinuate, grappoli ramosi quasi fogliosi. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

C. folio sinuato candicante. *Zann. Ven. p.* 62.

Atriplex sylvestris. *Bauh Hist.* II *p.* 972 cum ic.

Atriplice salvatico 2. *Matth. p.* 489.

Nasce comunemente negli Orti *e luoghi* coltivati *fiorisce nei mesi di* Luglio *sino* Settembre, *ed è* pianta annuale.

4. *C. olidum*. (Stinkender G.) C. puzzolente.

Foglie interissime rombeo-ovate, fiori conglomerati ascellari, fusti diffusi. *Pers. Syn. l. c. Röhl. l. cit. p.* 191. *Schult. l. c. p.* 457.

C. foetidum. *Zann. Ven. t.* 144. *fig.* 2.

Atriplex foetida. *Bauh. Hist.* III *p.* 974 cum icone.

Nasce negli Orti *appresso i* muri; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

Foglie *incane glauche*.

5. *C. polyspermum*. (Vielsamiger G.) C. polispermo.

Foglie ovate interissime ottuse, cime dicotome senza foglie, ascellari, semi quasi nudi. *Pers. Syn.* I *p.* 295. *Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 457.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi* erbosi *e* umidi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta annuale.

Fusto divergente, foglie rosse nel margine. *Schult. l. c. p.* 458.

6. *C. Scoparia*. (Besenartiger G.) C. Belvedere.
Foglie piane lineari-lanceolate, ciliate nel margine. *Pers. l. c. Röhl. l. c.*
Linaria Belvedere dicta. *Bauh. Hist.* III *p.* 462. cum icone.
Nasce intorno il luogo detto S. Marta; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

7. *C. maritimum*. (Strand G.) C. marino.
Foglie lesiniformi carnose semitereti, fiori glomerati ascellari. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 458.
C. sedi folio minimo, Kali facie, semine splendente annuum. *Zann. Ven. ic. t.* 14.
Nasce nei luoghi inondati dall'acqua salsa; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.
Fusto *eretto ramosissimo*.

SALSOLA. (Salzkraut) Soda.
Cal. di cinque foglie. *Cor.* o. *Stil.* 2-3-fido. *Cass.* con un solo seme. *Sem.* attorcigliato a spira coperto dal calice.

1. *S. Soda*. (Langblättriges S.) S. volgare.
Erbacea patula, foglie inermi succolente. *Pers. Syn.* I *p.* 295. *Röhl. germ.* II *p.* 189.
Kali majus cochleato semine. *Zann. Ven. p.* 153.
Cali vulgare. *Bauh. Hist.* III *p.* 704.
Nasce comunemente nei luoghi baguati dall'acqua

salsa; *fiorisce nei mesi di* Agosto e Settembre, *ed è* pianta annuale.

S. Kali. (Gemeines S.) S. Cali.

Fusto giacente, foglie lesiniformi, spinose nella cima, calici marginati ascellari. *Pers. Syn.* I *p.* 295. *Röhl. l. c. p.* 188. *Schult. aust.* I *p.* 450.

Kali spinosum foliis crassioribus et brevioribus: *Zann. Ven. p.* 153.

Nasce nei Treporti *nei luoghi* arenosi *appresso il* mare; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

Fusto *ramosissimo ispido*, foglie *scanalate patentissime scabre*. Stil. *3-fido*.

UMBELLATAE

ERYNGIUM. (Mannstreu) Eringio.

Fiori capitati. *Invoglio* di molte foglie. *Cal.* parziale di cinque foglie, superiore. *Cor.* di cinque petali. *Ricett.* paleaceo. *Frutt.* ovato, e coronato dal calice.

E. maritimum. (Meerstrands M.) E. marino.

Foglie radicali subrotonde, pieghettate, spinose, capolini peduncolati, palei tricuspidati. *Pers. Syn.* I *p.* 299. *Röhl. germ.* II *p.* 195.

E. maritimum. *Zann. Ven. t.* 94.

E. marinum. *Bauh. Hist.* III *p.* 86 cum icone.

Eryngio marino. *Matth. p.* 717 cum icone.

Nasce abbondevolmente in tutte le spiagge arenose, *specialmente in quella del* Lido; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

ECHINOPHORA. (Stacheldolde) Echinofora.

Fiori del raggio *maschi*, *fiore del* disco *ermafrodito*, *petali inegùali*. *Sem.* ovato-bislungo inviluppato in una guaina fungosa ch' è la base dell'*invologlio* parziale.

E. spinosa. (Dornige S.) E. spinosa.

Foglioline lesiniformi spinose interissime e trifide. *Pers. Syn.* I *p.* 301. *Röhl. germ.* II *p.* 216.

E. maritima spinosa. *Zann. Ven. p.* 90. *t.* 15 mala.

Pastinaca marina quibusdam. *Bauh. Hist.* III *p.* 196 cum icone.

Crithamo 2.do *Matth. p.* 519 cum icone.

Nasce abbondevolmente nel Lido *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta perenne.

BUPLEURUM. (Durchwachs). Perfoliata.

Invologlio delle ombrellette maggiori di cinque foglie. *Petali* involuti. *Frutto* subrotondo compresso striato.

B. rotundifolium. (Rundblättriger D.) P. rotondifoglia.

Erbacea, invologli universali mancano, foglie perfogliate. *Pers. Syn.* I *p.* 304. *Röhl. germ.* II *p.* 208. *Schult. aust.* I *p.* 490.

Perfoliata simpliciter dicta vulgaris annua. *Bauh. Hist.* III *p.* 198.

Perfoliata. *Matth. p.* 1215 cum icone.

Nasce fra le Biade, *ed anche intorno* S. Marta; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

Fusto *eretto*. Foglie *rotondo-ovate acute un poco glauche*. Involucretti *di* 3 5 *foglie ellittiche, qualche volta bifide*. Fiori *gialli*.

CAUCALIS. (Haftdolde) Caucalide.

Petali del disco eguali, quelli della circonferenza ineguali. *Frutto* ovato-bislungo costato, coperto di punte. *Involucro* di molte foglie intere, e in qualche specie o.

1. *C. grandiflora*. (Grossblüthige H.) C. grandiflora. *Involucri* di cinque foglie, delle quali una o due molto più grandi delle altre; *Petali* esteriori grandissimi. *L. Pers. Syn.* I *p.* 306. *Röhl. germ.* II *p.* 214. *Schult. l. c. p* 475.

C. arvensis echinata, magno flore. *Zann. Ven. p.* 54. *t.* 209.

Lappula canaria flore pulchro. *Bauh. Hist.* III *p.* 79 cum icone.

Caucalis Dodonaei. *Dalech. Hist. p.* 715 cum icone.

Nasce benchè di rado intorno Campalto *nei luoghi* sterili; *fiorisce nei mesi di* Maggio, Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

Rami *divergenti*. Foglie *arcicomposte*. Foglioline *piccole lanceolate, confluenti*. Involucretti *per lo*

più di 3-6 *foglie*. Fiori *del disco per lo più sterili*.

2. *C. Anthriscus*. (Wald H.) C. Antrisco.

Fusto prolungato, rami dritti, foglioline ovato-lanceolate pennatofesse, invoglio universale quasi nessuno. *Pers. Syn.* I *p.* 306. *Röhl. germ.* II *p.* 214. *Schult. aust. p.* 478.

Tordylium Anthriscus. *L. Sp. pl.*

Anthriscus quorundam semine aspero. *Bauh. Hist.* III *p.* 83 cum icone.

Nasce nei luoghi sassosi, *specialmente intorno i* terreni *di* S. Marta; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta biennale.

Fusto *solcato*. Foglioline *intagliato-seghettate*. Antere *violacee*. *Schult. l. c.*

DAUCUS. (Mohrrübe) Carota.

Cor. subradiate. *Fioretti* del disco abortivi. *Frutto* striato, coperto di peli rigidi.

D. Carota. (Gemeine M.) C. comune.

Semi ispidi, piccioli nervosi alla base, lacinie delle foglie lineari acute. *Pers. Syn.* I *p.* 307. *Röhl. germ.* II *p.* 413. *Schult. aust.* I *p* 479.

D. vulgaris. *Zann. Ven. p* 85. *t.* 190.

Pastinaca sylvestris s. Staphylinus graecorum. *Bauh. Hist.* III *p.* 62 cum icone.

Pastin. sylvestris Matthioli. *Dalechamp. Hist. p.* 720 cum icone.

Pastinaca salvatica. *Matth. p.* 789.

Nasce comunemente nei luoghi erbosi *intorno* Malghera *e* Campalto; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta biennale.

CONIUM. (Schierling) Conio.

Involglio parziale di tre foglie. *Frutto* subrotondo con cinque costole, tubercolate su ciascuna delle due superficie.

C. maculatum. (Gefleckter S.) C. macchiato.

Fusto ramosissimo macchiato, semi striati. *Persoon Syn.* I *p.* 308. *Röhl. germ. p.* 202. *Schult. aust.* I *p.* 202.

Cicuta major. *Zann. Ven. p.* 66. *t.* 284.

Cicuta. *Bauh. Hist.* III *p.* 175 cum icone.

Cicuta. *Dalech. Hist. p.* 788 cum icone. *Matth. p.* 1155 cum icone.

Nasce intorno Malghera *e* Mestre *nei* Fossi *e luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta biennale.

Il fusto *arriva all'altezza di* 2-6 *piedi, ed è leggermente striato, per lo più macchiato, superiormente ramosissimo, fistuloso.* Foglioline *patenti, nitide, ovate, acute, pennatofesse.* Petali *involuti cuoriformi.*

CRITHMUM. (Meerfenchel) Critamo.

Involglio di molte foglie. *Frutto* ovale compresso. *Fioretti* eguali.

C. maritimum. (Schmalblättriger M.) C. marino.

Foglioline lanceolate carnose. *Pers. Syn.* I *p.* 311. *Röhl. germ.* II *p.* 311.

C. seu foeniculum marinum minus. *Zann. Ven. p.* 74. *t.* 9.

C. multis, s. foeniculum marinum. *Bauh. Hist.* III *p.* 194 cum icone.

C. Matthioli. *Dalech. Hist. p.* 768 cum icone.

Crithamo 1^mo *Matth. p.* 518 cum icone.

Nasce comunemente nei Muri antichi, *e fra'* sassi, *specialmente al* Porto *di* Malamocco; *fiorisce nei mesi di* Settembre *ed* Ottobre, *ed è* pianta perenne.

Pianta *glabra glauca*. Fusto *giacente ramoso*. Foglie *bipennate*. Foglioline *lanceolate carnose intere, ovvero lobate*.

ANGELICA. (Engelwurtz) Angelica.

Frutto sùbrotondo, alato nel margine, con tre scanellature elevate nel mezzo. *Petali* eguali incurvi.

A. sylvestris. (Wilde E.) A. selvatica.

Foglioline eguali, ovato-lanceolate seghettate. *Pers. Syn.* I *p.* 315.

Imperatoria sylvestris. *Röhl. germ.* II *p.* 198. *Schult. aust.* I *p.* 509.

A. sylvestris major. *Zann. Ven. p.* 16. *t.* 278.

A. sylvestris magna vulgatior. *Bauh. Hist.* III *p.* 144 cum icone.

A. sylvestris Matthioli. *Dalech. Hist. p.* 725 cum icone.

A. salvatica. *Matth. p.* 1230 cum icone.

Nasce nei luoghi umidi *in* Malghera, Campalto *e* Fusina; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

Pianta *glabra*. Fusto *superiormente un poco solcato*. Guaine *ovato-ventricose*. Involucretti *di* 6-7 *foglie*. *Schult. l. c.*

SIUM. (Merk) Sio.

Frutto quasi ovato, compresso, striato. *Involucro* di molte foglie. *Petali* cordati.

S. sulcatum. (Gefurchter M.) S. solcato.

Fusto prolungato solcato angolato, foglie pennate, foglioline lanceolate, egualmente seghettate, ombrella terminale. *Pers. Syn.* I *p.* 316.

S. latifolium. *L. Schult. aust.*

Cicuta latifolia. *Röhl. germ.* II *p.* 204.

Sium medium. *Bauh. Hist.* III *p.* 174.

S. maximum latifolium. *Ejusd. p.* 175.

Nasce comunemente intorno Malghera *nei* Fossi *e luoghi* acquosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

OENANTHE. (Rebendolde) Enante.

Pet. del disco cordati quasi eguali. *Pet.* del raggio maggiori ed irregolari. *Frutto* striato retuso, coronato dal calice e dal pistillo.

1. *O. fistulosa*. (Röhrige R.) E. fistolosa.

Stolonifera, foglie del fusto pennate con foglioline filiformi fistulose, involucro universale quasi nes-

suno. *Pers. Syn.* I *p.* 318. *Schult. aust.* I *p.* 474.
Nasce intorno Malghera *nei* Prati umidi *e* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. *O. pimpinelloides*. (Bibernellartige R.) E. pimpinelloide.
Foglioline radicali cuneiformi, fesse, quelle del fusto, interissime, lineari, lunghissime, semplici. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p.* 208. *Schult. l. c. p.* 475.
O. seu Filipendula monspessulana, folio Apii. *Bauh. Hist.* III *p.* 190 cum icone.
Nasce come la precedente.

PHELLANDRIUM. (Wasserfenchel) Fellandrio.
Fioretti del disco minori. *Frutto* liscio ovato, coronato dal calice e dal pistillo.

P. aquaticum. (Gemeiner W.) F. acquatico.
Rami delle foglie divaricati. *Pers. Syn.* I *p.* 318. *Röhl. germ.* II *p.* 203. *Schult. aust.* I *p.* 508.
Nasce intorno Campalto *e* Malghera *nei* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta biennale.

CORIANDRUM. (Koriander) Coriandro.
Petali eguali nel centro, ineguali nella circonferenza, plicato-cordati. *Invoglio* universale di una sola foglia, parziali smezzati. *Frutto* sferico.

C. sativum. (Gemeiner K.) C. comune.

Frutti globosi. *L. Pers. Syn.* I *p.* 319. *Röhl. germ.* II p. 196. *Schult. aust.* I *p.* 502.

Nasce nei luoghi sassosi e Rovinazzi, *specialmente intorno i* terreni *di* S. Marta; *fiorisce nel mese di* Giugno, *ed è* pianta annuale.

SCANDIX. (Körbel) Scandice.

Ombrella semplice. *Fiori* raggianti. *Involglio* di molte foglie smarginate, ovvero pennato-intagliate. *Frutto* terminato da un rostro lunghissimo, quasi peloso.

S. Pecten. (Langschnabeliger K.) S. pettine di Venere.

Foglie molto fesse, semi maggiori, quasi glabri. *Pers. Syn.* I *p.* 319. *Röhl. germ.* II *p.* 214. *Schult. aust.* I *p.* 503.

Pecten Veneris. *Bauh. Hist.* III *p.* 71.

Nasce fra le Biade, *ed anche intorno i terreni di* S. Marta; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

PASTINACA. (Pastinak) Pastinaca.

Frutto elittico compresso-piano. *Petali* involuti interi.

P. sativa. (Gemeiner P.) P. comune.

Foglie semplicemente pennate. *L. Pers. Syn.* I *p.* 322. *Röhl. germ.* II *p.* 196. *Schult. aust. p.* 516.

P. sylvestris latifolia. *Zann. Ven. p.* 205. *t.* 298.

P. germanica. *Bauh. Hist.* III *p.* 149.

Nasce comunemente in Campalto *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta biennale.

PIMPINELLA. (Bibernell) Pimpinella.

Frutto ovato-bislungo. *Petali* incurvi. *Stim.* subglobuso. *Ombrelle* nutanti prima della fioritura.

P. magna. (Grosse B.) P. grande.

Foglie uniformi pennate, foglioline tutte lobate l'impare trilobo. *Pers. Syn.* I *p.* 323. *Röhl. germ.* II *p.* 204. *Schult. aust.* I *p.* 518.

Tragoselinum majus, umbella candida. *Zann. Ven. p.* 262. *t.* 306.

Saxifraga hircina major. *Bauh. Hist.* III *p.* 109 cum icone.

Nasce in Campalto *e* Malghera *nei* Prati *e nei luoghi* ombrosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

APIUM. (Eppich) Apio.

Frutto ovato striato. *Invoglio* monofillo. *Petali* eguali.

A. graveolens. (Sellerie E.) A. Sedano.

Fusto solcato, foglie del fusto cuneiformi trilobe. *Pers. Syn.* I *p.* 324. *Röhl. germ.* II *p.* 205. *Schult. aust.* I *p.* 517.

Nasce nei luoghi bagnati dall'acqua salsa, *specialmente nel luogo detto* Aca bianca; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta biennale.

TRIGYNIA

VIBURNUM. (Schneeball) Viburno.
Cal. 5-partito superiore. *Cor.* 5-fida. *Bacca* con un solo seme.

V. Lantana. (Wolliger S.) V. Lantana.
Foglie cuoriformi seghettate, inferiormente tomentose. *Lin. Pers. Syn.* I *p.* 327. *Röhl. germ.* II *p.* 216. *Schult. aust.* I *p.* 520.
Viburnum. *Zann. Ven. p.* 275. *t.* 310.
Lantana vulgo aliis Viburnum. *Bauh. Hist.* I *p.* 557.
Viburno. *Matth. p.* 235 cum icone.
Nasce in Campalto *nei luoghi* ombrosi *ed* umidi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta fruticosa.

SAMBUCUS. (Hollander) Sambuco.
Cal. 5-partito. *Cor.* 5 fida. *Bacca* con tre semi.

1. *S. Ebulus*. (Zwerg II.) S Ebolo.
Cime tripartite, stipole fogliacee ovate, fusto erbaceo. *Pers. Syn.* I *p.* 238. *Röhl. germ.* II *p.* 217. *Schult. aust.* I *p.* 520.
Ebulus. *Zann. Ven. p.* 89. *t.* 286.
Ebul. s. Sambucus herbacea. *Bauh. Hist.* I *p.* 546 cum icone.
Ebulo. *Matth. p.* 1333 cum icone.
Nasce comunemente intorno Campalto *e* Malghera,

e specialmente intorno Fusina; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

2. *S. nigra*. (Gemeiner H.) S. comune.
Cime 5-partite, foglioline ovate seghettate, fusto arboreo. *Pers. l. c Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 521.
S. vulgaris. *Bauh. Hist.* I *p.* 544.
Nasce intorno Fusina *e fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno.

TAMARIX. (Tamariske) Tamarisco.
Cal. 5-partito. *Petali* 5 *Cass.* di una sola cavità, e con tre valve. *Semi* comosi.

T. gallica. (Französische T.) T. di Francia.
Fiori pentandri, spighe laterali. *Pers. Syn.* I *p.* 328. *Röhl. germ.* II *p.* 220.
Tamariscus narbonensis. *Zann. Ven. p.* 256. *t.* 186.
Tamarix major arborea narbonensis. *I. Bauh. Hist.* I *p.* 350 cum icone.
Nasce nel Lido, *e vicino a* Malamocco *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta fruticosa.

ALSINE. (Vogelmiere) Alsine.
Cal. di cinque foglie. *Petali* cinque eguali bifidi. *Cass.* superiore di una sola cavità, e di tre valve con molti semi. *Stami* 1-10.

A. media. (Gemeine V.) A. mezzana.
Foglie inferiori cordato-ovate, le superiori ovate,

petali bipartiti, stami 3-10. *Pers. Syn.* I *p.* 330. *Röhl. germ.* II *p.* 218. *Schult. aust.* I *p.* 523.

A. media . *Zann. Ven. p.* 9.

A. vulgaris, seu morsus gallinae. *Bauh. Hist.* III *p.* 363 cum icone.

Nasce comunemente negli Orti *e luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Febbrajo *sino* Decembre, *ed* è pianta annuale.

TETRAGYNIA

PARNASSIA. (Parnassie) Parnassia.

Cal. 5-partito. *Petali* cinque. *Nettari* cuoriformi muniti di cigli glandolosi. *Cass.* di due cavità, e con quattro valve.

P. europaea. (Europäische P.) P. europea.

Foglie radicali cuoriformi, fusto semplice con un solo fiore. *Pers. Syn.* I *p.* 331.

P. palustris. *L. Sp. Röhl. germ.* II p. 218. *Schult. aust.* I *p.* 523.

P. palustris et vulgaris. *Zann. Ven. p.* 204. *t.* 51.

Gramen Parnassi Dodoneo. *Bauh. Hist.* III *p.* 537 cum icone.

Gram. Parnassi. *Dalech. Hist. p.* 1005.

Nasce comunemente nei luoghi arenosi *ed* umidi *nei* Treporti, *e nel* Cavallino; *fiorisce nei mesi di* Luglio *sino* Settembre, *ed* è pianta perenne.

PENTAGYNIA

STATICE. (Grasnelke) Limonio.

Cal. di due foglie intere, pieghettato, scarioso. *Petali* cinque. *Seme* uno superiore.

1. *S. Limonium*. (Meerstrands G.) L. comune.

Scapo panicolato terete, foglie liscie, enervi, ondate, mucronate sotto la cima. *Pers. Syn.* I *p.* 333. *Rhöl. germ.* II *p.* 221.

Limonium maritimum majus. *Zannichel. Ven. p.* 164. *tab.* 31.

Lim. majus multis, aliis Behen rubrum. *Bauh. Hist.* III *p.* 876 cum icone.

Nasce comunemente nei luoghi bagnati dall'acqua salsa *detti volgarmente* Barene; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

2. *S. auriculaefolia*. (Aurikelblättrige G.) S. a foglie d'auricola.

Scapo panicolato terete, foglie spatolate acute, mucronate sotto la cima, piane, cartilagineo marginate, trinervi. *Nob.*

S. auriculaefolia. *Pers. Syn.?*

Nasce benchè di rado *intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* perenne.

3. *S. reticulata*. (Netzartige G.) L. retiforme.

Scapo panicolato disteso, rami sterili, piegati, nudi, foglie cuneiformi mutiche. *Pers. l. c.*

Limonium minus angustifolium geniculatum ec. ec. *Zannich. Ven. p.* 165. *t.* 232.

Nasce nei luoghi bagnati dall'acqua salsa; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

LINUM. (Lein) Lino.

Cal. di cinque foglie. *Petali* 5. *Cass.* di cinque valve e di dieci cavità. *Semi* solitarii.

1. *L. tenuifolium*. (Feinblättriger L.) L. a foglie sottili.

Foglie calicine acuminate, foglie sparse lineari setacee, scabre all'indietro. *Persoon Syn.* I *p.* 335. *Röhl. germ.* II *p.* 219. *Schult. aust.* I *p.* 526.

L. sylvestre angustifolium. *Zannicheli. Ven. p.* 168.

L. sylvestre angustifolium album. *Bauhin. Hist.* III *p.* 453 cum icone.

Nasce comunemente nei Treporti; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* perenne.

2. *L. maritimum*. (Meerstrands L.) L. marino.

Foglie del calice ovate, acute, mutiche. Foglie lanceolate, le inferiori opposte. *Pers. Syn.* I *p.* 335. *Röhl. l. c. p* 220. *Schult. aust.* I *p.* 527.

L. maritimum luteum. *Zann. Ven. p.* 168. *t.* 78.

L. luteum narbonense. *Bauh. Hist.* III *p.* 454 cum icone.

Nasce nei Treporti, Cavallino, Chioggia *e* Campalto *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

3. *L. catharcticum*. (Purgierender L.) L. purgante.
Foglie opposte ovato-lanceolate, fusto superiormente dicotomo, corolle acute. *Pers. l. c. p.* 336. *Röhl. l. c. Schult. aust.* I *p.* 528.
L. pratense floribus exiguis. *Zannichel. Ven. p.* 169. *t.* 258.
Alsine herba glabra flosculis albis, vel potius Linum. *Bauh. Hist.* III *p.* 455 cum icone.
Nasce comunemente nei Prati erbosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

LEUCOJUM. (Knottenblume) Leucojo.
Cor. campaniforme 6-partita, con le divisioni ingrossate nella cima. *Stimma* semplice.

L. aestivum. (Sommer K.) L. d'estate.
Spata con molti fiori, stilo clavato. *Pers. Syn.* I *p.* 349. *Röhl. germ.* II *p.* 223. *Schult. aust.* I *p.* 540.
Narcisso-leucojum pratense. *Zannichel. Ven. p.* 191. *t.* 301.
Leucoj. bulbosum polyanthemum. *Bauh. Hist.* III *p.* 592 cum icone.
Nasce intorno Campalto *nei* luoghi umidi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

NARCISSUS. (Narcisse) Narciso.

Petali 6 eguali. *Nettario* infundibuliforme monofillo. *Stami* dentro nel nettario.

N. biflorus. (Zweiblumige N.) N. bifloro.

Spata con due fiori, nettario brevissimo scarioso. *Pers. Syn.* I *p.* 350.

Nasce nel Lido *nei luoghi* umidi, *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

ALLIUM. (Lauch) Aglio.

Cor. 6-partita patente. *Spata* con molti fiori. *Ombrella* ammucchiata. *Cass.* superiore.

1. *A. suaveolens*. (Wohlriechender L.) A. odoroso.

Scapo nudo un poco terete, foglie lineari carenate, ombrella subrotonda, stami lesiniformi. *Persoon Syn.* I *p.* 355. *Röhl. germ.* II *p.* 223. *Schult. aust.* I *p.* 542.

A. maritimum venetum autumnale angustioribus foliis. *Zann. Ven. p.* 6. *t.* 191.

Nasce nei Treporti *e nel* Cavallino *nei* Prati umidi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta perenne.

2. *A. carinatum*. (Kielblättriger L.) A. carenato.

Fusto con foglie piane ombrellifero, stami lesiniformi, spata acuta lunghissima. *Pers. Syn.* I *p.* 456. *Röhl. germ. l. c. p.* 224. *Schult. l. c. p.* 544.

A. sylvestre bicorne purpureum proliferum. *Bauh. Hist.* II *p.* 561 cum icone.

Nasce negli Orti *nei luoghi* sassosi *e* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

3. *A. sphaerocephalon*. (Rundköpfiger L.) A. sferocefalo.

Fusto con foglie tereti, ombrellifero, foglie semitereti, stami tricuspidati più lunghi della corolla. *Pers. Syn.* I *p.* 356. *Röhl. l. c. Schult. loc. cit. p.* 545.

Alii genus, forte Scorodoprasum alterum Lobelio. *Bauh. Hist.* II *p.* 564 cum icone.

Nasce comunemente nel Lido *nei luoghi* arenosi; *fiorisce il mese di* Agosto, *ed è* pianta perenne.

4. *A. angulosum*. (Eckiger L.) A. angoloso.

Scapo nudo a due tagli, foglie lineari scanalate inferiormente quasi angolate, ombrella fastigiata. *Pers. Syn.* I *p.* 357. *Röhl. germ. loc. cit. Schult. aust.* I *p.* 548.

A. petraeum umbelliferum. *Bauh. Hist.* II *p.* 564 cum icone.

A. saxatile, acori radice, flore purpureo. *Barr. ic. t.* 1022

Nasce in Campalto *e* Malghera *nei* Prati umidi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

ORNITHOGALUM. (Vogelmilch) Ornitogalo.

Cor. di sei petali, eretta, connivente alla base, aperta in cima. *Filamenti* alternamente allargati.

Cass. subrotonda, angolata, di tre cavità. *Pers. Syn.*

O. umbellatum. (Doldenförmige V.) O. ombrellato. Fiori disposti in corimbo, peduncoli esterni più lunghi dello scapo. *Pers. Syn.* I *p.* 363. *Röhl. germ.* II *p.* 229. *Schult. aust.* I *p.* 559.

O. umbellatum medium. *Zannich. Ven, p* 201.

O. vulgare. *Bauh. Hist.* II *p.* 630 cum icone.

Ornitogalo 2.do *Matth. p.* 572 cum icone.

Nasce comunemente negli Orti *e luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta perenne.

ANTHERICUM. (Zaunblume) Anterico.

Cor. di sei petali patenti. *Stami* glabri. *Stim.* ottuso triangolare. *Cass.* ovata. *Semi* angolosi.

A. ramosum. (Aestige Z.) A. ramoso.

Foglie piane, scapo ramoso, petali piani, stilo clavato. *Röhl. germ.* II *p.* 227. *Schult. aust.* I *p.* 556.

Phalangium ramosum. *Pers. Syn.*

Phal. parvo flore. *Zann. Ven. p.* 209. *t.* 20. *f.* 2.

Phal. quibusdam parvo flore. *Bauh. Hist.* II *p.* 635 cum icone.

Nasce nel Cavallino *e* Cortelazzo *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

ASPARAGUS. (Spargel) Sparago.

Cor. sei partita, colle tre divisioni interne piegate

nella cima. *Bacca* superiore di tre cavità e con molti semi.

1. *A. officinalis*. (Gemeiner S.) A. comune.
Fusto erbaceo eretto panicolato glauco, foglie setacee glauche, peduncoli articolati nel mezzo. *Pers. Syn.* I *p.* 370. *Röhl. germ.* II *p.* 231. *Schult. aust.* I *p.* 566.
A. maritimus crassiore folio *Zann. Ven. p.* 24. *t.* 74.
A. marinus. *Bauh. Hist.* III *p.* 726.
Nasce nei luoghi bagnati dall'acqua salsa, *specialmente intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Maggio e Giugno, *ed è* pianta perenne.

2. *A. acutifolius*. (Spitzblättriger S.) S. acuto.
Fusto inerme angolato fruticoso, foglie aciformi rigide, sempreverdi, mucronate, eguali. *Pers. Syn.* I *p.* 371. *Röhl. germ.* II *p.* 230.
A. foliis acutis. *Zann. Ven. p.* 24. *t.* 179.
Corruda. *Bauh. Hist.* III *p.* 726 cum icone.
Nasce nel Cavallino e Cortelazzo *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Agosto e Settembre, *ed è* fruticosa.

CONVALLARIA. (Maililie) Poligonato.
Cor. 6-fida. *Bacca* macchiata, superiore, di tre cavità.

C. Polygonatum. (Gemeine M.) P. volgare.
Cor infundibuliforme, foglie alterne abbraccianti il fusto, fusto a due tagli, peduncoli ascellari, 1-3

flori. *Pers. Syn.* I *p.* 373. *Röhl. germ.* II *p.* 226. *Schult. aust.* I *p.* 552.

Polygonat. latifolium vulgare. *Zannichel. Ven. p.* 215. *t.* 34.

Polyg. vulgo Sigillum Salomonis. *Bauhin. Hist.* III *p.* 529 cum icone.

Polyg. latifolium, flore albo major. *Barr. ic. t.* 711. *fig.* 1.

Poligonato. *Matth. p.* 1005 cum icone.

Nasce in Campalto *nei luoghi* ombrosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

HYACINTHUS. (Hyacinthe) Giacinto.

Cor. campaniforme ovvero subrotonda 6-fida ovvero 6-partita, con lacinie eguali. *Germe* con tre pori sulla sommità.

1. *H. comosus*. (Schopfblüthige H.) G. comoso.

Fiori angolato-cilindrici, quelli della sommità sterili, lungamente peduncolati, dritti. *Pers. Syn.* I *p.* 375. *Röhl. germ.* II *p.* 226.

Muscari comosum. *Schult. aust.* I *p.* 553.

Musc. arvense latifolium. *Zann. Ven. p.* 187. *t.* 100.

Hyacinth. maximus botryoides coma caerulea. *Bauh. Hist.* II *p.* 574.

Nasce a S. Niccolò *di* Lido *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi* di Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

2. *H. racemosus*. (Trauben H.) G. racemoso.

Fiori ovati uniformi conferti, quelli della sommità

sessili sterili, foglie deboli pendenti lineari. *Persoon. Syn.* I *p.* 375. *Röhl. l. c. p.* 227.
Muscari racemosum. *Schult. l. c. p.* 554.
Musc. arvense juncifolium. *Zann. Ven. p.* 188. *t.* 93.
Hyacinth. vernus botryoides minor caeruleus. *Bauh. Hist.* II *p.* 571. cum icone.
Nasce come la precedente.

HEMEROCALLIS. (Tagblume) Emerocallide.
Cor. campaniforme, tubo cilindrico. *Stam.* declinati. *Stim.* piccolo, semplice, un poco villoso.

H. fulva. (Rothgelbe T.) E. rossastra.
Foglie lineari carenate, i tre petali interni ottusi undulati, i nervi dei petali esterni ramosi. *Pers. Syn.* I *p.* 382.
Lilium radice Asphodeli phoeniceum sive Lirioasphodelus quibusdam. *Bauhin. Hist.* II *p.* 701 cum icone.
Nasce in alcuni Fossi *intorno* Mestre; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

ACORUS. (Kalmus) Calamo..
Spadice cilindrico coperto da fioretti. *Corol.* di sei petali nuda. *Stilo* o. *Cass.* di tre cavità.

A. Calamus. (Gemeiner K.) C. comune.
Scapo con un mucrone lunghissimo foliaceo. *Pers. Syn.* I *p.* 382. *Röhl. germ.* II *p.* 252. *Schultes aust.* I *p.* 565.
Calamus aromaticus. *Bauh. Hist.* II *p.* 734 cum icone.

Nasce in Campalto *e intorno* Mestre; *fiorisce nel mese di* Giugno, *ed è* pianta perenne (nei Fossi).

JUNCUS. (Simse) Giunco.

Cal. di sei foglie persistenti. *Cor.* o. *Stimmi* 3. *Cass.* di una sola cavità e di tre valve. *Semi* molti.

1. *J. acutus*. (Spitze) G. acuto.

Culmo nudo terete mucronato, pannochia terminale, invoglio di due foglie pungenti, casselle subrotonde mucronate. *Persoon. Syn.* I *p.* 373. *Röhl. germ.* II *p.* 233.

J. acutus capitulis sorghi. *Zann. Ven. p.* 150.

J. pungens seu Juncus acutus capitulis Sorghi. *Bauh. Hist.* II *p.* 520.

J. maritimus sorghi panicula utriculata. *Barr. ic. tab.* 203. *fig.* 2.

Nasce comunemente nei luoghi arenosi, umidi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. *J. maritimus*. (Meerstrands S.) G. marino.

Culmo nudo terete, pannochia terminale prolifera invoglio di due foglie, spinoso eretto, casselle bislunghe. *Pers. l. c.*

Nasce comunemente nei luoghi umidi *intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

3. *J. effusus*. (Flatter S.) G. effuso.

Culmo nudo drittissimo, pannochia laterale, fiori bislunghi, cassella ottusa. *L. Pers. Syn. loc. cit. Röhl. l. c. p.* 232. *Schult. aust.* I *p.* 365.

J. panicula arundinacea. *Bauhin. Histor.* II *p.* 520 cum icone.

Nasce abbondevolmente in Campalto *e* Malghera *nei* Fossi *e nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

Fusto foglioso.

4. *J. bulbosus*. (Knollige S.) G. bulboso.

Culmo quasi compresso indiviso, foglie lineari, scanalate, corimbo terminale, petali ottusi più corti della cassella subrotonda ottusa. *Pers. Synops.* I *p.* 385. *Röhl. germ. p* 234. *Schult. l c. p.* 569.

J. parvus cum pericarpiis rotundis. *Bauh. Hist.* III *p.* 520 cum icone.

J. repens apocarpos minor botrioides. *Barr. ic. t.* 114. *fig.* 1.

Nasce intorno Malghera *nei* Prati umidi *ed* acquosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

5. *J. pilosus*. (Haarige S.) G. peloso.

Foglie piane pelose, corimbo quasi semplice, peduncoli con un solo fiore nutanti, petali ovati acuti più corti della cassella. *Pers. Syn.* I *p.* 385. *Röhl. l. c. p.* 234.

Luzula pilosa. *Schult. l. c. p.* 570.

Gramen rore lucidum nemorense s. Luzulae. *Bauh. Hist.* II *p.* 492.

Nasce nel Lido *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nella* Primavera, *ed è* perenne.

BERBERIS. (Sauerdorn) Berbero.

Cal. di sei foglie. *Petali* sei, dei quali ciascuno con due *glandole* alla base dell'unghia. *Stilo* o. *Bacca* di una sola cavità e con due semi.

B. vulgaris. (Gemeine S.) B. comune.

Grappoli semplici pendenti, foglie ovate a rovescio ciliate .. *Lin. Pers. Syn.* I *p.* 387. *Röhl. germ.* I *p.* 222. *Schult. aust.* I *p.* 539.

B. dumetorum. *Zann. Ven. p.* 35. *t.* 18.

B. vulgo quae et. Oxiacantha putata. *Bauh. Hist.* I *p.* 52.

Crespino. *Matth. p.* 183 cum icone.

Nasce nel Cavallino *e* Cortelazzo *nei luoghi* arenosi *e nelle* Siepi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* fruticoso.

TRIGYNIA

RUMEX. (Ampfer) Romice.

Cal. di tre foglie. *Petali* tre ovati conniventi. *Seme* uno triangolare.

1. *R. crispus*. (Krauser A.) R. crespo.

Valve intere tutte con grano, foglie lanceolate ondate acute. *Pers. Syn.* I *p.* 394. *Röhl. germ.* II *p.* 239. *Schult. aust.* I *p.* 577. *Savi Mat. med. t.* 59.

Lapathum acutum crispum. *Bauh. Hist.* II *p.* 988 sine icone.

Nasce nei luoghi umidi *e negli* Orti; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

2. *R. acutus*. (Spitzblättriger A.) R. acuto.

Valve dentate tutte con grano, foglie cordato-bislunghe acuminate, grappoli foliosi. *Pers. l. c. p.* 395. *Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 578. *Savi l. c. t.* 44.

Lapathum folio acuto plano. *Zannichel. Ven. p.* 159.

Lapath. acutum sive Oxilapathum. *Bauh. Hist.* II *p.* 988 cum icone.

Nasce comunemente negli Orti; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

TRIGLOCHIN. (Dreizack) Triglochide.

Cal. di tre foglie. *Petali* tre caliciformi. *Stilo* o. *Cass.* che si apre alla base.

T. palustre. (Sumpf D) T. paludoso.

Casselle di tre cavità liscie assottigliate alla base. *Pers. Syn.* I *p.* 397. *Röhl. germ.* I. *p.* 238. *Schult. aust.* I *p.* 575.

Juncago palustris. *Zann. Ven. p.* 149. *t.* 273. *f.* 2.

Nasce abbondevolmente nei luoghi umidi *non lungi da* Cortelazzo; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

POLYGYNIA

ALISMA. (Froschlöffel) Alismo.
Cal. di tre foglie. *Petali* tre. *Cass.* molte, delle quali ciascuna con un seme.

A. Plantago. (Gemeiner F.) A. comune.
Foglie ovate acute, frutti ottusamente trigoni. *Pers. Syn.* I *p.* 400. *Röhl. german.* II *p.* 240. *Schult. aust.* I *p.* 585.
Plantago aquatica. *Bauch. Hist.* III *p.* 787 cum icone. *Dalech. Hist. p.* 1057 cum icone.
Piantaggine acquatica. *Matth. p.* 510.
Nasce comunemente intorno Malghera *nei luoghi* acquosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* perenne.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

OENOTHERA. (Nachtkerze) Enotera.
Cal. tubuloso 4-do con lacinie richinate e caduche *Petali* 4 inserti nel calice. *Stim.* 4-fido. *Cass.* di 4 cavità e con 4 valve.

O. biennis. (Gemeine N.) E. comune.
Foglie ovato-lanceolate piane, fusto muricato peloso, casselle prolungate sessili. *Persoon. Synops.* I

p. 407. *Röhl. german.* II *p.* 244. *Schult. aust.* I *p.* 597.

Onagra latifolia. *Zann. Ven. p.* 194. *t.* 112.

Nasce comunemente nel Cavallino *e* Cortelazzo *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta bienne.

EPILOBIUM. (Weidenrösslein) Epilobio.

Cal. 4-fido tubuloso. *Petali* 4. *Cass.* inferiore bislunga. *Semi* comosi.

1. *E. rosmarinifolium*. Haenk. (Rosmarinblättriges W.) E. a foglie di Ramerino.

Fusto ramosissimo, foglie sparse sottili lineari senza vene, peduncoli unibratteati. *Pers. Syn.* I *p.* 409 *sub* E. angustifolium.

E. angustissimum. *Röhl. germ.* II *p.* 245. *Schult. aust.* I *p.* 593.

Nasce nel luogo detto Forte degli Alberoni *appresso* l' acqua; *fiorisce nei mesi di* Luglio *sino* Settembre, *ed è* perenne.

2. *E. pubescens*. (Weichhaariger W.) E. pubescente.

Foglie (di mezzo) opposte lanceolate quasi picciolate pubescenti, fusto villoso semplicissimo. *Pers. Syn.* I *p.* 410. *Röhl. germ.* II *p.* 245. *Schult. l. c. p.* 594.

Chamaenerion villosum. *Zann. Ven. p.* 60.

Lysimachia siliquosa hirsuta flore minor. *Bauhin. Hist.* II *p.* 906 cum icone.

Nasce intorno gli Alberoni *nei luoghi* umidi *ed*

acquosi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* perenne.

3. *E. tetragonum*. (Vierekiges W.) E. tetragono.
Foglie lanceolate dentellate, le inferiori opposte, fusto ramoso, stimma semplice. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p.* 246. *Schult. aust. p.* 595.
Nasce nei terreni *di* S. Marta; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

CHLORA. (Bitterling) Clora.
Cal. di 8-10 foglie. *Cor.* monopetala 8-fida. *Cass.* di una sola cavità con due valve e molti semi.

C. perfoliata, (Durchwachsenes B.) C. perfogliata.
Foglie perfogliate. *Pers. Syn.* I *p.* 418. *Röhl. germ.* II *p.* 244. *Schult. aust.* I *p.* 597.
Centaurium luteum perfoliatum. *Zann. Ven. p.* 56. *t.* 20. *f.* 1.
Perfoliata Centaurium luteum. *Bauh. Hist.* III *p.* 355 cum icone.
β Centaur. pusillum luteum. *Bauh. Pin.*
Nasce intorno Malghera *nei luoghi* montuosi *ed* erbosi: β *nei* Treporti *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

ERICA. (Heide) Erica.
Cal. di quattro foglie persistenti. *Cor.* 4-fida persistente. *Antere* bifide. *Cass.* di 4-8 cavità.

E. herbacea. (Krautartige H.) E. erbacea.

Antere senza resta scoprite, fiori bislunghi, stilo scoperto, foglie quaterne, fiori laterali. *Persoon. Syn.* I *p.* 423. *Schult. aust.* I *p.* 600.

E. procumbens herbacea. *Zann. Ven. p.* 94. *t.* 64.

E. parva foliis corios quaternis. *Bauhin. Histor.* I *p.* 358.

E. procumbens herbacea ternis foliis carnea. *Zann. Ven. p.* 94. *t.* 132.

E. parva pannonica foliis corios ternis. *Bauh. Hist.* I *p.* 358.

Nasce abbondevolmente nei Treporti *e nel* Cavallino; *fiorisce nella* Primavera *e nell'*Autunno, *ed è* fruticosa.

TRIGYNIA

POLYGONUM. (Knöterich) Poligono.

Calice o. Cor. 5-partita. *Sem.* 1 angolato, e coperto dalla corolla.

1. *P. aviculare.* (Vogel K.) P. avicolare:

Fusto giacente erbaceo. *Fiori* ottandri trigini ascellari. *Foglie* lanceolate scabre nel margine. *Nervi* delle stipole remoti. *Persoon. Syn.* I *p.* 439. *Röhl. germ.* II *p.* 249. *Schult. aust.* I *p.* 612.

P. latifolium. *Zann. Ven. p.* 216. *t.* 201.

P. sive centinodia. *Bauh. Hist.* III *p.* 374.

Nasce comunemente fra' Sassi *e negli* Orti; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

2. *P. Persicaria*. (Gemeiner K.) P. comune.
Fiori essandri digini, spighe ovato-bislunghe, foglie lanceolate, peduncoli lisci, stipole ciliate. *Pers. Syn.* I *p.* 440. *Röhl. loc. cit. p.* 249 *Schult. loc. cit. p.* 610.
P. mitis maculosa. *Zann. Ven. p.* 208. *t.* 133.
Pers. mitis. *Bauh. Hist. p.* 779 cum icone.
β floribus albis. *Röhl. l. c.*
Nasce comunemente intorno Malghera *nelle* Strade *e nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

3. *P. amphibium*. β (Wechsel K.) P. amfibio.
Fusto irsuto, foglie irsute quasi sessili, spiga bislunga, stami più lunghi della corolla. *Pers. Syn.* I *p.* 440. *Röhl. l. c. p.* 248. *Schult. l. c. p.* 609.
Nasce in Campalto *e* Malghera *nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.
Fiori *pentandri semidigini*.

4. *P. Hidropiper*. (Wasserpfeffer K.) P. acquatico.
Fiori essandri semidigini, foglie lanceolate ondate, spighe filiformi nutanti, fusto dritto, stipole quasi mutiche. *Pers. Syn.* I *p.* 440. *Röhl. loc. cit. Schult. aust. p.* 611.
Persicaria urens sive Hydropiper. *Zann. Ven. p.* 209.
Pers. acris. *Bauh. Hist.* III *p.* 780 cum icone.
Nasce nei Fossi *intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

5. *P. Convolvulus.* (Windenartiger K.) P. in forma di villuchio.

Foglie cordato-astate, fusto volubile angolato, fiori ottusati. *Pers. Syn.* I *p.* 441. *Röhl. l. c. p.* 249. *Schult. l. c. p.* 613.

Fagopyrum vulgare scandens. *Zann. Ven. p.* 99. *t.* 146.

Helxine semine triangulo. *Bauh. Histor.* II *p.* 157 cum icone.

Nasce comunemente negli Orti *e nei* Rovinazzi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *sino* Settembre, *ed è* pianta annuale.

ENNEANDRIA

HEXAGYNIA.

BUTOMUS. (Wasserviole) Butomo.

Cal. o. *Petali* 6. *Cass.* 6 polisperme.

B. umbellatus. (Doldenblüthige W.) B. ombrellato.

Pers. Syn. I *p.* 451. *Röhl. germ.* II *p.* 251. *Schult. aust.* I *p.* 622.

B. flore roseo. *Zann. Ven. p.* 283. *t.* 309.

Juncus floridus. *Bauh. Hist.* II *p.* 524. *Dalechamp. Hist. p.* 989 cum icone.

Giunco florido. *Matth. p.* 1091 icone.

Nasce comunemente intorno Malghera *nei* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

TRIBULUS. (Burzeldorn) Tribolo.
Calice 5-partito. *Petali* 5 patenti. *Stilo* 0. *Cass.* 5, gobbe, spinose, e con molti semi.

T. terrestris. (Gemeiner B.) T. comune.
Foglie 6-gioghe quasi eguali, semi con 4 corna. *Pers. Syn.* I *p.* 462. *Röhl. germ.* II *p.* 252. *Schult. aust.* 1 *p.* 629.
T. terrestris. *Zann. Ven. p.* 263. *t.* 222. *Bauhin: Hist.* II *p.* 352 cum icone. *Barr. ic. t.* 558.
Tribolo terrestre. *Matth. p.* 1026 cum icone.
Nasce non lungi da Malamocco *nei luoghi* asciutti; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* annuale.

DIGYNIA

SAXIFRAGA. (Steinbrech) Sassifragia.
Cal. 5-partito. *Cor.* di cinque petali. *Cass.* 2-rostrata di una sola cavità, e con molti semi.

S. tridactylites. (Dreitheliger S.) S. tripartito.
Foglie del fusto trifide, alterne, fusto dritto ramoso. *Pers. Syn.* I *p.* 490. *Röhl. germ.* II *p.* 257. *Schult. aust.* I *p.* 648.

S. verna annua. *Zann. Ven. p.* 235. *t.* 226.
Tridactylites tectorum flore albo. *Bauh. Histor.* III *p.* 762.
Nasce comunemente nei luoghi arenosi, secchi *e fra* Sassi; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta annuale.

GYPSOPHILA. (Gypskraut) Gipsofila.
Calice monofillo campaniforme, angolato. *Petali* cinque ovati sessili. *Cass.* globosa, di una sola cavità e con molti semi.

G. Saxifraga. (Steinbrechartiges G.) G. sassifragia.
Foglie lineari, calici angolati con quattro squame alla base, petali smarginati. *Pers. Syn.* I *p.* 493. *Röhl. germ.* II *p.* 259. *Schult. aust.* I *p.* 652.
Caryophyllus minimus muralis. *Zann. Ven. p.* 53. *t.* 70.
Betonica coronaria s. Tunica minima. *Bauh. Hist.* III p. 337 cum icone.
Lychnis pumila caryophillata flore rubello, italis haemoroidalis aldrovando. *Barr. ic. t.* 998.
Nasce comunemente nel Lido *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

SAPONARIA. (Seifenkraut) Saponaria.
Calice tubuloso monofillo nudo. *Petali* cinque unguiculati. *Cass.* bislunga di una sola cavità.

S. officinalis. (Gemeines S.) S. comune.

Calici cilindrici, foglie ovato-lanceolate. *Pers. Syn.* I *p.* 492. *Röhl. german.* II *p.* 259. *Schult. aust. p.* 652.

Lychnis sylvestris quae Saponaria vulgo. *Zannichel. Ven. p.* 172. *t.* 285.

Saponaria vulgaris. *Bauh. Hist. p.* 346 cum icone.

Sapon. major. *Dalech. Hist.* I *p.* 822.

Nasce intorno S. Erasmo *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *sino* Settembre, *ed è* pianta perenne.

TRIGYNIA

CUCUBALUS. (Taubenkropf) Cucubalo.

Cal. gonfio, ovvero campaniforme. *Petali* cinque nudi o coronati alla fauce. *Cass.* di tre cavità.

C. Behen. (Aufgeblasener T. C.) gonfio.

Fusto dicotomo, foglie ovate, calici quasi globosi reticolato-venosi, corolle quasi nude. *Pers. Syn.* I *p.* 495. *Röhl. german.* II *p.* 262. *Schult. aust.* I *p.* 674.

Lychnis sylvestris quae Behen album vulgo. *Zann. Ven. p.* 173. *t.* 117.

Behen album officinarum. *Bauh. Hist.* III *p.* 356 cum icone.

Nasce comunemente nel Lido *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

SILENE. (Leimkraut) Silene.

Calice bislungo terete, cilindrico, ovvero conico. *Petali* cinque unguiculati nudi, o coronati alla fauce. *Cassella* di tre cavità.

1. *S. Otites.* (Ohrlöffel L.) S. dioica.

Petali lineari indivisi ondati, glabri, fiori verticillato-capitati dioici, peduncoli glabri, fusto nudo. *Pers. l. c. p.* 497.

Cucubalus otites. *Röhl. germ. Schult. aust.* I *p.* 677.

Lychnis viscosa, flore muscoso. *Zann. Ven. p.* 174. *t.* 145.

Muscipula muscoso flore. *Bauh. Hist.* III *p.* 350. cum icone.

Muscip. altera, flore muscoso Penae. *Dalech. Hist. p.* 674 cum icone.

Nasce nel Cavallino *nei* Colli arenosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. *S. sericea.* (Seidenartiges L.) S. sericea.

Fiori terminali quasi solitarii peduncolati, fusto ramoso alla base, foglie lineari-lanceolate sericee. *Pers. Syn.* I *p.* 500.

Lychnis marina hirsuta purpurea, leucosi folio. *Zann. Ven. p.* 164. *t.* 65. *Barr. rar. ic. t.* 1010.*?*

Nasce comunemente nel Lido *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

STELLARIA. (Sternmiere) Stellaria.

Calice di cinque foglie patenti. *Petali* cinque bi-

partiti. *Cassella* ovata, di una sola cavità e con molti semi, 6-dentata nella cima.

1. *S. aquatica*. (Wasser S.) S. acquatica.
Fusto giacente, foglie cuoriformi, fiori solitarii 4-5-gini, frutti pendenti. *Pers. Syn.* I *p.* 500.
Cerastium aquaticum. *L. Röhl. german.* II *p.* 274. *Schult. aust.* I *p.* 695.
Nasce in Campalto e Chioggia *nei luoghi* ombrosi, *ed* umidi; *fiorisce nei mesi di* Giugno e Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. *S. nemorum*. (Walde S.) S. selvatica.
Foglie cuoriformi picciolate, pannochia dicotoma. *Linn. p. Spl. Gmel. Syst. nat. tom.* II *p.* 717. *Persoon. Syn.* I *p.* 500. *Röhl. germ.* II *p.* 265. *Schult. aust. Flora Lithuan.*
Alsine altissima nemorum. *Zann. Ven.*
Alsine major repens perennis. *Bauh. Hist. tom.* III *p.* 362 cum icone.
Nasce in Campalto *ed intorno* Malghera *nei luoghi* ombrosi *ed* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio e Giugno, *ed è* pianta perenne.
Fusto *fistuloso un poco terete ed un poco peloso*. Foglie *succose fragili, un poco pelose*. Pannochia *allargata*. Petali *patentissimi, bipartiti sino alla base*. Peduncoli *finalmente recurvati*. Cassella *ovale*.

ARENARIA. (Sandkraut) Arenaria.
Calice di cinque foglie patenti. *Petali* cinque in-

tieri. *Cass.* di una sola cavità, e con molti semi.

1. *A. serpyllifolia*. (Quendelblättriges S.) a foglie di serpillo.

Foglie quasi ovate acute, sessili, liscie, corolla più corta del calice. *Pers. Syn.* I *p.* 502. *Röhl. germ.* II *p.* 267. *Schult. aust.* I *p.* 664.

Alsine minor multicaulis. *Zann. Ven. p.* 10.

Alsine minima. *Bauh. Hist.* III *p.* 364 cum icone. *Saponar. officinal.*

Nasce comunemente nei luoghi asciutti; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

2. *A. media*. (Mittleres S.) A. mezzana.

Fusti giacenti, foglie semicilindriche carnose eguali agl' internodj, semi compressi alati nel margine. *Pers. Syn.* I *p.* 504. *Röhl. l. c. p.* 268.

Nasce comunemente nel luogo detto Monte dell' Oro *nei luoghi* bagnati dall' acqua salsa; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

3. *A. rubra*. (Rothes S.) A. rossa.

Fusti prostrati, foglie lineari acute, stipole scariose abbraccianti il fusto, semi compressi angolati. *Pers. Syn.* I *p.* 504. *Röhl. l. c. Schult. aust. p.* 665.

Alsine maritima flore rubente. *Zann. Ven p.* 9.

Nasce nei luoghi arenosi *ed* asciutti; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

4. *A. marina*. (Strand S.) A. marina.

Foglie semitereti carnose ottuse, stipole scariose abbraccianti il fusto, semi compressi, alati nel margine. *Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 665.

Nasce comunemente nei luoghi umidi *e* salsi, *specialmente intorno* Malghera *e* Malamocco; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* annuale.

PENTAGYNIA

SEDUM. (Hauslaub) Sedo.

Calice 5-fido. *Cor.* di cinque petali, cinque squame nettarifere alla base del Germe. *Cass.* 5.

S. acre. (Scharfes H.) S. dei campi.

Foglie alterne quasi ovate accresciuto-sessili, gobbe erette, cima trifida. *Pers. Syn.* I *p.* 412. *Röhl. germ.* II *p.* 271. *Schult. aust.* I *p.* 688.

S. parvum acre flore luteo. *Zann. Ven. p.* 244. *I. Bauh. Hist.* III *p.* 694 cum icone.

Nasce comunemente non lungi da Campalto *nei luoghi* montuosi sterili; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

OXALIS. (Sauerklee) Ossalide.

Calice di cinque foglie. *Petali* connessi per le unghie. *Stami* alternamente più corti. *Cass.* 5-gona che apresi con elasticità negli angoli. *Semi* quasi arillati.

O. corniculata. (Gehörnter S.) O. cornicolata.

Fusto ramoso, cadente, radicante, peduncolo quasi ombrellato, foglioline cordate a rovescio, petali smarginati erosi. *Pers. Syn. p.* 518. *Röhl. germ.* II *p.* 275. *Schult. aust. p.* 700.

Oxis lutea. *Bauh. Hist.* II *p.* 388.

Nasce comunemente negli Orti *nei luoghi* ombrosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *sino* Settembre, *ed è* perenne.

2. *O. stricta*. (Steifer S.) O. drittissima.

Fusto dritto ramoso, peduncolo quasi ombrellato, foglioline cordate a rovescio, corolle ottuse. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 699.

Nasce come la precedente.

GITHAGO. (Kornrade) Gitagine.

Calice coriaceo, di cinque foglie nella cima. *Corolla* con fauce nuda, di cinque petali unguiculati. *Lembo* ottuso indiviso. *Cassella* di una sola cavità.

G. segetum. Desf. (Gemeine K.) G. comune.

Irsuta, calici quasi eguali alla corolla. Agrostemma Githago. *L. Pers. Syn.* I *p.* 519. *Röhl. germ.* II *p.* 274. *Schult. aust.* I *p.* 697.

Lychnis segetum major. *Zann. Ven. p.* 176. *t.* 281.

Pseudo-melanthium. *Bauhin. Hist.* III *p.* 341 cum icone. *Dalech. Hist. p.* 438.

Pseudo-melanthio. *Matth. p.* 843 cum icone.

Nasce fra le Biade *in* Campalto *e* S. Marta; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

LYCHNIS. (Lichtnelke) Licnide.

Calice monofillo bislungo, liscio. *Petali* cinque unguiculati, col lembo bifido. *Cassella* 1-5 loculare.

1. *L. Flos cuculi*. (Gukuks L.) L. dei cucoli.

Petali laciniati, cassella di una sola cavità, subrotonda. *Pers. Syn.* I *p.* 520. *Schult. aust.* I *p.* 697.

Melandrium. *Röhl. germ.* I *p.* 275.

Flos cuculi odontis quibusdam. *Bauh. Hist.* III *p.* 347.

Nasce comunemente intorno Malghera *nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

2. *L. vespertina*. (Nacht L.) L. notturna.

Dioica, fusto e foglie villose glauche, molli, stilo un poco villoso, cassella ovata a rovescio, 10-valve nell'apice, denti dritti. *Schult. aust.* I *p.* 699.

Lychnis dioica. *L. Pers. l. c.*

Melandrium pratense. *Röhl. l. c. p.* 274.

Lychn. sylvestris alba simplex. *Zann. Ven. p.* 173. *t.* 282.

Ocymoides album multis. *Bauh. Hist.* III *p.* 342 cum icone.

Ocym. majus Matthioli. *Dalech. Hist. p.* 682 icon.

Ocimoide. *Matth. p.* 1051 icon.

Nasce comunemente negli Orti *e nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *sino* Settembre, *ed è* perenne.

CERASTIUM. (Hornkraut) Cerastio.

Calice di cinque foglie. *Petali* bifidi o smarginati,

interi. *Cassella* di una sola cavità, che apresi nella cima.

C. ovale. (Gemeinstes H.) C. ovale.
Quasi viscoso-irsuto, fusto ramosissimo alla base, foglie elitiche, fiori glomerati. *Pers. Syn.* I *p.* 521.
C. vulgatum. *Röhl. germ.* II *p.* 272.
C. viscosum. *Schult. aust.* I *p.* 692.
Auricula muris quorumdam. *Bauh. Hist.* III *p.* 359 cum icone.
Nasce comunemente negli Orti; *fiorisce nei mesi di* Maggio e Giugno, *ed è* pianta annuale.

DECAGYNIA

PHYTOLACCA. (Kermesbeere) Fitolachia.
Calice o. *Petali* cinque. *Bacca* superiore di dieci cavità, e con dieci semi.

P. decandra. (Gemeine K.) F. comune.
Fiori decandri decagini. *Pers. Syn.* I *p.* 523. *Schult. aust.* I *p.* 700.
Nasce intorno Fusina e S. Marta; *fiorisce nei mesi di* Giugno e Luglio, *ed è* pianta perenne.

DODECANDRIA

MONOGYNIA.

PORTULACA. (Portulack) Procachia.
Calice 2-fido. *Corolla* di cinque petali. *Cassella* di una sola cavità coperchiata. *Ricett.* 5 filiformi.

P. *oleracea*. (Gemeiner P.) P. volgare.
Foglie cuneiformi, fiori sessili. *Pers. Syn.* II *p.* 6. *Röhl. germ.* II *p.* 276. *Schult. aust.* I. p. 4.
P. augustifolia sive sylvestris. *Zann. Ven. p.* 218. *t.* 252.
P. sylvestris minor. *Bauh. Hist. p.* 678.
Nasce comunemente negli Orti *e luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

LYTHRUM. (Weiderich) Litro.
Calice 6-12-dentato. *Petali* 5-6 attaccati al calice. *Cassella* coperta dal calice di due cavità, e con molti semi.

1. *L. Salicaria*. (Gemeiner W.) L. comune.
Foglie opposte cordato-lanceolate, fiori in spiga, dodecandri. *Pers. Syn.* II *p.* 7. *Röhl. germ.* II *p.* 276. *Schult. aust.* II *p.* 5. *Savi mat. med. t.* 29.
Salicaria vulgaris. *Zann. Ven. p.* 231. *t.* 58.
Lysimachia purpurea, quibusdam spicata. *Bauhin. Hist.* II *p.* 904 icone mala.

Lysim altera Matthioli. *Dalech. Hist. p.* 1059 icon.
Un altra Lisimachia. *Matth. p.* 1026 cum icone.
Nasce comunemente intorno Malghera *nei* Fossi *e luoghi* acquosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

2. *L. Hyssopifolium*. (Isopblättriger W.) L. a foglie d'issopo.
Foglie alterne lineari-lanceolate, fiori essandri. *Pers. l. c. p.* 8. *Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 6.
Nasce intorno Malghera *nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* annuale.

DIGYNIA

AGRIMONIA. (Odermennig) Agrimonio.
Calice 5-dentato, e calicolato da due piccole brattee. *Petali* cinque. *Semi* 1-2 chiusi nel calice.

A. Eupatoria. (Gemeiner O.) A. Eupatoria.
Foglie del fusto interrottamente pennate, frutti spinosi. *Pers. Syn.* II *p.* 9 *Röhl. germ.* II p. 277. *Schult. aust.* II *p.* 7.
A. officinarum. *Zann. Ven. p.* 5. *t.* 234.
A. s. Eupatorium. *Bauh. Hist.* III *p.* 398 icon.
Nasce non lungi da Malamocco *nei luoghi* ombrosi *ed* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

TRIGYNIA

RESEDA. (Wau) Amorino.
Calice monofillo 4-6 partito. *Petali* laciniati. *Cassella* di una sola cavità, che apresi nella cima. *Semi* reniformi.

1. *R. alba*. (Weisser W.) A. bianco.
Foglie pennate, fiori 4-gini, calice 6-partito. *Pers. Syn.* II *p.* 10. *Röhl. germ.* II *p.* 277.
Nasce intorno S. Marta *nei* Rovinazzi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

2. *R. luta*. (Gelber W.) A. giallo.
Foglie inferiori pennate, le superiori pennatofesse e trifide, lacinie lineari ondate, calice 6-fido. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. aust.* II *p.* 9.
R. lutea. *Bauh. Hist.* III *p.* 467 icon.
Nasce come la precedente.

EUPHORBIA. (Wolfsmilch) Euforbia
Calice monofillo ventricoso. *Corolla* di 4-5 petali, attaccata sul calice. *Cassella* tricocca.

1. *E. Chamaesice*. (Nidrige W.) E. bassa.
Dicotoma, foglie subrotonde un poco intaccate, glabre, fiori solitarii ascellari, fusti giacenti. *Pers. Syn.* II *p.* 14. *Röhl. germ.* II *p.* 278. *Schultes aust.* II *p.* 10.
Tithymalus exiguus. *Zann. Ven. p.* 261.

Chamaesice. *Bauh. Hist.* III *p.* 667.

Nasce negli Orti *nei luoghi* asciutti; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

2. *E. Peplis.* (Strands W.) E. Peplide.

Dicotoma, foglie interissime semicuoriformi, fiori solitarii ascellari, fusti giacenti. *Pers. l. c. Röhl. l. c.*

Tithymalus maritimus. *Zann. Ven. p.* 260. *t.* 68.

Peplis. *Bauh. Hist.* III *p.* 668 sine icone.

Peplio. *Matth. p.* 1322 icone.

Nasce nel Lido, Malamocco *e* Chioggia *nei luoghi* arenosi *appresso il* mare; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

3. *E. Peplus.* (Garten W.) S. degli Orti.

Ombrella trifida, dicotoma, invoglietti ovati, foglie interissime, ovate a rovescio, picciolate. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. aust.* II *p.* 10.

Peplos sive Esula rotunda. *Bauh. Hist.* III *p.* 669 cum icone.

Nasce comunemente negli Orti, *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

4. *E. Paralias.* (Dickblättrige W.) E. marina.

Ombrella quasi 5-fida, 2-fida, invoglietti cordato-reniformi, foglie lineari imbricate verso l'alto. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Savi Bot. Etrusc. p.* 144.

Tithymalus paralias maritimus. *Zann. Ven. p.* 259. *t.* 40.

Tithym. Paralius. *Bauh. Hist.* III *p.* 674.

Tithimalo Paralio. *Matth. p.* 1313 icone.

Nasce comunemente nel Lido *e* Malamocco *appresso il* mare; *fiorisce nei mesi* di Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

5. *E. Helioscopia*. (Sonnenwendige W.) E. elioscopia.
Ombrella 5-fida, bifida dicotoma, involgietti ovati a rovescio, foglie cuneiformi, seghettate, glabre, casselle liscie. *Pers. l. c. p.* 17. *Röhl. l. c. p.* 279. *Schult. aust.* II *p.* 16.
Tithymalus Helioscopius. *Bauhin. Histor.* III *p.* 669 icone.
Tithimalo helioscopio. *Matth. p.* 1314.
Nasce in Campalto *e* Sant'Erasmo *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *sino* Agosto, *ed è* pianta annuale.

6. *E. platyphyllos*. (Flachblättrige W.) E. a foglie piane.
Ombrella 5-fida, 3-fida dicotoma, involgli pelosi nella carena, foglie seghettate lanceolate, casselle verrucose. *Pers. Syn.* II *p.* 18. *Röhl. l. c. p.* 280. *Schult, aust. l. c. p.* 18.
Tithymalus platyphyllos. *Bauhin. Hist.* III *p.* 670 cum icone.
Nasce nei Treporti *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *sino* Settembre, *ed è* pianta annuale.

7. *E. Cyparissias*. (Cypressen W.) E. cipressiforme.
Ombrelle moltifide, dicotome, involgietti quasi cordati, rami sterili, foglie setacee, quelle del fusto

lanceolate. *Pers. Syn.* II *p.* 18. *Röhl. germ. l. c. p.* 281. *Schult. l. c. p.* 20.

Tithymalus cyparissias. *Bauh. Hist.* III *p.* 663 icon.

Tithimalo ciparissio. *Matth. p.* 1315 icon.

Nasce comunemente intorno Campalto *e* Malghera *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

8. *E. palustris.* (Sumpf W.) E. dei paludi.

Ombrella multifida, ombrellette quasi trifide, bifide, invoglietti ovati, foglie lanceolate, rami sterili, casselle verrucose. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 21.

Tithymalus palustris fruticosus. *Zann. Ven. p.* 259 *t.* 217.

Tithym. magnus multicaulis. *Bauh. Hist.* III *p.* 671 absque icone.

Nasce abbondevolmente nei Fossi *e appresso gli stessi in* Campalto; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

PUNICA. (Granatbaum) Granato.

Calice superiore 5-fido. *Petali* cinque. *Bacca* [Pomo L] di molte cavità, e con molti semi baccati.

P. Granatum. (Gemeiner G.) G. comune.

Fusto arboreo, foglie lanceolate. *Pers. Syn.* II *p.* 33. *Röhl. germ.* II *p.* 283.
Malus Punica. *Bauh. Hist.* I *p.* 76.
Melagrano. *Matth. p.* 246 icone.
Nasce comunemente intorno Sant'Erasmo *appresso il* mare; *fiorisce il mese di* Luglio.

PRUNUS. (Pflaume) Pruno.
Calice inferiore 5-fido. *Petali* cinque. *Drupa* glabra, di cui il nocciuolo ha le suture prominenti.

1. *P. Mahaleb*. (Dintenkische) P. nero.
Fiori corimbosi terminali, foglie cordato-ovate. *Pers. Syn.* II *p.* 34. *Röhl. germ.* II *p.* 285. *Schult. aust.* II *p.* 36.
Cerasus sylvestris amara. *Bauh. Hist.* I *p.* 227 icon.
Mahaleb Matthioli. *Dalech. Hist. p.* 154.
Mahaleb. *Matth. p.* 190 icon.
Nasce comunemente in Campalto; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* frutescente.

2. *P. spinosa*. (Dornige P.) P. spinoso.
Fruticosa, peduncoli solitarii, foglie elittico-lanceolate, pagina inferiore pubescente, rami spinosi. *Pers. Syn.* II *p.* 35. *Röhl. germ. Schult. aust.*
P. Peduncolis solitariis, foliis lanceolatis glabris, ramis spinosis. *Lin. Sp. pl. Gmel. Syst. Nat. Gilib. Flora Lithuan.*
P. sylvestris. *Zann. Ven. p.* 219. *Bauh. Histor.* I *p.* 193. *Fuchs Hist. p.* 404.
Pruno salvatico. *Matth. p.* 286 cum icone.

Nasce in Campalto *e intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta fruticosa.

DIGYNIA

CRATAEGUS. (Hagedorn) Ossiacanta.

Calice 5-fido. *Petali* cinque. *Drupa* inferiore con 2-5 semi. *Semi* ossei. *Stili* 1-5.

C. Oxiacantha. (Gemeiner H.) O. comune.

Foglie ottuse quasi trifide, seghettate, glabre, fiori digini, peduncoli e calici quasi glabri, segmenti del calice lanceolate acute. *Pers. Syn.* II *p.* 38.

Mespilus. *Rühl. german.* II *p.* 286. *Schult. aust.* II *p.* 59.

Oxiacantha vulgaris. *Bauhin. Hist.* I *p.* 44.

Oxiac. acuta spina Matthioli. *Dalech. Hist. p.* 136 icone.

Oxiacantha. *Matth. p.* 181 icone.

Nasce comunemente in Campalto; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta fruticosa.

PENTAGYNIA

MESPILUS. (Mispel) Nespolo.

Calice 5-fido con le lacinie per lo più foliacee e seghettate. *Petali* cinque. *Drupa* inferiore con cinque semi ossei.

M. germanica. (Gemeine M.) N. comune.

Inerme, foglie lanceolato-ovate inferiormente tomentose, fiori sessili solitarii. *Pers. Syn.* II *p.* 39. *Schult. aust.* II *p.* 56. *Röhl. german.* II *p.* 286.

M. vulgaris. *Bauh. Hist.* I *p.* 59.

Nespolo secondo. *Matth. p.* 274 icone.

Nasce in Campalto *nei luoghi* ombrosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta fruticosa.

POLYGYNIA

ROSA. (Rose) Rosa.

Calice urceolato 5-fido, carnoso, ristretto al collo. *Petali* cinque. *Semi* ispidi contenuti nel calice bacciforme.

R. canina. (Kund R.) R. canina.

Germi ovati glabri come i peduncoli, fusto e piccioli aculeati, foglie ovate glabre. *Pers. Syn.* II *p.* 50. *Schult. aust.* II *p.* 73. *Savi Mat. med. t.* 27.

R. sylvestris vulgaris. *Zann. Ven. p.* 226. *t.* 300.

R. sylvestris alba cum rubore, folio glabro. *Bauhin. Hist.* II *p.* 43.

Nasce comunemente in Campalto *nelle* Siepi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *sino* Luglio, *ed è* fruticosa.

RUBUS. (Brombeer) Rovo.

Calice 5-fido. *Petali* cinque. *Bacca* composta da acini monospermi

R. fruticosus. (Gemeine R.) R. comune.

Fusto fruticoso, foglie ternate o quinate, inferiormente bianco-tomentose, foglioline quasi picciolate, alcune quasi intagliate, fusto angolato, calice recurvato. *Pers. Syn.* II *p.* 51. *Röhl. germ.* II *p.* 297.

R. vulgaris. *Zann. Ven. p.* 128. *t.* 264.

R. major fructu nigro. *Bauh. Hist.* II *p.* 57 icone.

Rovo. *Matth. p.* 1063 icone.

Nasce comunemente in Campalto; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta frutescente.

FRAGARIA. (Erdbeere) Fragola.

Calice 10-fido. *Petali* cinque. *Ricett.* dei semi, ovato, baccato, caduco.

F. vesca. (Geniesbare E.) F. domestica.

Flagelli serpeggianti, calice del frutto richinato, pubescenza dei piccioli patentissima, quella dei peduncoli appoggiata. *Pers. Syn.* II *p.* 53. *Röhl. germ.* II *p.* 297. *Schult. aust.* II *p.* 82.

F. ferens fraga rubra. *Bauh. Hist.* II *p.* 394 icone.

Fragaria. *Matth. p.* 1075 icone.

Nasce nei luoghi montuosi *in* San Niccolò *di* Lido; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

POTENTILLA. (Fingerkraut) Potentilla.

Calice 10-fido. *Petali* cinque. *Semi* subrotondi nudi sopra un ricettacolo piccolo e secco.

1. *P. verna*. (Frühlings F.) P. di primavera.

Foglie quinate, ovate a rovescio, dentate, pubescenti, petali cordati a rovescio maggiori del calice. *Pers. Syn.* II *p.* 55. *Röhl. germ.* II *p.* 299. *Schult. aust.* II *p.* 88.

Quinquefolium minus repens luteum. *Zannich. Ven. p.* 221. *t.* 263.

Pentaphyllon parvum hirsutum. *Bauh. Histor.* II *p.* 398 icone.

Nasce in Campalto *nei luoghi* erbosi, asciutti; *fiorisce nei mesi di* Aprile *sino* Giugno, *ed è* pianta perenne.

2. *P. sylvestris*. (Wald F.) P. selvatica.

Calice 8-fido, petali quattro, fusto ramoso, foglie sessili. *Neck. gallob.*

P. Tormentilla. *Savi Mat. med. t.* 29.

Tormentilla erecta. *L. Pers. l. c. p.* 56. *Röhl. germ.* II *p.* 297. *Schult. aust.* II *p.* 81.

Torment. sylvestris. *Zann. Ven. p.* 261. *t.* 87.

Tormentilla. *Bauh. Hist.* II *p.* 398 icone. *Matth. p.* 998 icone.

Nasce intorno Campalto *e* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

POLYANDRIA

MONOGYNIA.

CHELIDONIUM. (Schöllkraut) Chelidonia.
Calice di due foglie. *Corolla* di quattro petali. *Siliqua* lineare di una sola cavità. *Tramezzo* o. *Semi* crestati.

C. majus. (Grosses S.) C. maggiore.
Pedunculi disposti in ombrella. *Pers. Syn.* II *p.* 61. *Röhl. germ.* II *p.* 302. *Schult. aust.* II *p.* 41.
C. majus vulgare. *Zann. Ven. p.* 61. *t.* 212.
Chelidonia. *Bauh. Hist.* III *p.* 482.
Chelidonia maggiore. *Matth. p.* 664.
Nasce comunemente nei Rovinazzi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *sino* Agosto, *ed è* pianta perenne.

GLAUCIUM. (Hornmohn) Glaucio.
Calice di due foglie. *Corolla* di quattro petali. *Siliqua* lineare di due cavità, e con due o tre valve. *Semi* puntati.

G. luteum. (Gelber H.) G. giallo.
Fusto glabro, foglie caulinari repande, siliqua tubercolata e un poco scabra. *Pers. Syn.* II *p.* 61. *Röhl. germ.* II *p.* 302. *Schult. aust.* II *p.* 41.
G. flore luteo. *Zann. Ven. p.* 114. *t.* 166.
Papaver corniculatum luteum. *Bauh. Hist.* III *p.* 398. icone.

Papavero cornuto. *Matth. p.* 1116 icon.

Nasce intorno il Forte *di* Malamocco *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta annuale *e* biennale.

PAPAVER. (Mohn) Papavero.

Calice di due foglie caduche. *Corolla* di quattro petali. *Stimma* persistente. *Cassella* di una sola cavità, che si apre per molti pori sotto la stimma.

1. *P. Rhoeas*. (Wilder M.) P. selvatico.

Casselle glabre quasi globose, fusto multifloro peloso, con peli patenti, foglie pennatofesse, intagliate. *Pers. Syn.* II *p.* 62. *Röhl. germ.* II *p.* 302. *Schult. aust.* II *p.* 39.

P. erraticum. *Zann. Ven. p.* 302. *t.* 261.

P. erraticum rubrum campestre. *Bauhin. Hist.* III *p.* 395 icon.

Papavero selvatico. *Matth. p.* 1112 icon.

Nasce negli Orti *e intorno* S. Marta; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

2. *P. somniferum*. (Garten M.) P. sonnifero.

Calice fusto e casselle glabre, foglie abbraccianti il fusto, incise glauche. *Pers. Syn. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 40.

P. sativum. *Bauh. Hist.* III *p.* 390 icon.

Papavero domestico. *Matth. p.* 1113 icon.

Nasce nei Rovinazzi *nei* terreni *di* Santa Marta; *il rimanente come nella* precedente.

NYMPHAEA. (Seerose) Nimfea.

Calice di quattro o cinque foglie. *Corolla* di molti petali. *Stimma* raggiante sessile. *Bacca* di molte cavità e con molti semi.

1. *N. lutea*. (Gelbe S.) N. gialla.

Foglie cordato-ovate interissime, calice di cinque foglie maggiori dei petali. *Pers. Syn.* I *p.* 62. *Röhl. germ.* II *p.* 305. *Schult. aust.* II *p.* 45.

N. lutea. *Bauh. Hist.* III *p.* 771. *Dalechamp. Hist. p.* 1009 icon. *Matth. p.* 945 icon.

Nasce nei Fossi *intorno* Mestre; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. *N. alba*. (Weïsse S.) N. bianca.

Foglie cordato-orbicolate interissime, calice di quattro foglie. *Pers. Syn.* II *p.* 63. *Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 46.

N. alba. *Bauh. Hist.* III *p.* 770. *Dalechamp. Hist. p.* 1008.

N. alba. *Matth. p.* 944 icon.

Nasce comunemente in Campalto, Malghera *e* Mestre *nei* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

HELIANTHEMUM. (Sonnenröschen) Eliantemo.

Calice di cinque foglie, con le due foglie esterne minori. *Cassella* di una sola cavità, con tre valve.

1. *H. fumana*. (Heideblättriges S.) E. fumana.

Suffruticoso giacente, senza stipole, foglie alterne

lineari, scabre nel margine, peduncoli uniflori. *Pers. Syn.* II *p.* 76. *Röhling german.* II *p.* 303. *Schult. aust.* II *p.* 43.

H. tenuifolium glabro, luteo flore, per humum sparsum. *Zann. Ven. p.* 136. *t.* 116. *Bauh. Hist.* II *p.* 18.

Nasce nel Lido, Chioggia e Treporti *nei luoghi* arenosi e montuosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno e Luglio.

2. *H. vulgare*. (Gemeines S.) E. volgare.

Suffruticosa giacente, stipole lanceolate, foglie bislunghe revolute quasi pelose, incane nella pagina inferiore. *Pers. l. c. p.* 79. *Röhl. l. c. p.* 304. *Schult. l. c. p.* 44.

Cistus Helianthemum. *L. Sp. pl.*

Helianth. vulgare flore luteo. *Zann. Ven. p.* 135. *t.* 21. *Bauh. Hist.* II *p.* 15.

Nasce comunemente nel Lido, Chioggia e Treporti *ec. ec. nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *sino* Settembre.

TRIGYNIA

DELPHINIUM. (Rittesporn) Delfinio.

Calice o. *Petali* cinque. *Nettario* bifido che termina posteriormente in un corno. *Silique* 1-3.

D. Consolida. (Feld R.) D. campestre.

Una sola cassella, nettario di un solo pezzo, fusto

quasi diviso. *Pers. Syn.* II *p.* 82. *Röhl. germ.* II *p.* 307. *Schult. aust.* II *p.* 50.

Consolida regalis flore minore. *Bauhin. Histor.* III *p.* 210 icone.

Nasce in Campalto *fra le* Biade; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

PENTAGYNIIA

HYPERICUM. (Hartheu) Iperico.

Calice 5-partito. *Lacinie* quasi ovate eguali. *Petali* cinque. *Stami* molti riuniti in 3-5 fascetti. *Cassella* di 3-5 cavità.

1. *H. perforatum*. (Gemeines H.) I. perforato.

Calice con foglie interissime lanceolate, fusto a due tagli, foglie ottuse con punti trasparenti. *Pers. Syn.* II *p.* 89. *Röhl. germ.* II *p.* 415.

H. vulgare. *Bauh. Hist.* III *p.* 381.

Nasce comunemente in San Niccolò *di* Lido *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. *H. quadrangulare*. (Vierkantiges H.) I. quadrangolare.

Fusto erbaceo quadrangolare, foglie con punti trasparenti, foglioline del calice interissime lanceolate. *Pers. l.c. Röhl. l.c. p.* 414. *Schult. aust.* II *p.* 386.

H. asciron dictum caule quadrangulo. *Bauh. Hist.* III *p.* 382. icone.

Nasce nei luoghi acquosi *in* Cortelazzo ; *fiorisce nei mesi di* Giugno e Luglio, *ed è* pianta perenne.

POLYGYNIA

CLEMATIS. (Waldrebe) Clematide.

Calice o. *Petali* 4-5. *Semi* compressi terminati dal stilo persistente peloso.

1. *C. Viticella*. (Blaue W.) C. turchina.

Foglie composte e ricomposte, foglioline ovali, quasi lobate, interissime, petali ovati a rovescio patenti. *Pers. Syn. p.* 99. *Röhl. germ.* II *p.* 308.

C. caerulea. *Zann. Ven. p.* 69. *t.* 80.

C. sive flammula flore caeruleo. *Bauhin. Histor.* II *p.* 128 icone.

Clematide seconda. *Matth. p.* 1007.

Nasce intorno Malghera *e specialmente in* Campalto *appresso le* Siepi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta frutescente.

2. *C. Vitalba*. (Gemeine W.) C. comune.

Foglie pennate, foglioline cuoriformi, con piccioli rampicanti. *Pers. Syn.* II *p.* 100. *Röhl. loc. cit. Schult. aust.* II *p.* 95.

C. sylvestris latifolia. *Zann. Ven. p.* 69.

C. latifolia integra. *Bauh. Hist.* II *p.* 125 icone.

Clematide terza. *Matth. p.* 1008 icone.

Nasce in Campalto *nelle* Siepi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta fruticosa.

3. *C. maritima*. (Strand W.) C. marina.
Fusto dritto, semplice, essagono, foglie pennate con foglioline lineari. *Pers. Syn.* II *p.* 100.
C. maritima. *Zann. Ven. p.* 68. *t.* 129.
Nasce comunemente nel Lido, Malamocco *e* Cavallino *nei luoghi* arenosi *e nelle* Siepi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

4. *C. erecta*. (Aufrechte W.) C. eretta.
Foglie pennate, con foglioline ovato-lanceolate, fusto dritto, corolla di 4-5 petali. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p.* 309. *Schult. aust.* II *p.* 95.
C. *s.* flammula surrecta alba. *Zannich. Ven. p.* 69. *t.* 159. *Bauh. Hist.* II *p.* 127.
Flammola. *Matth. p.* 1009 icone.
Nasce nel luogo detto Aca bianca *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

THALICTRUM. (Wiesenraute) Talittro.
Calice o. *Petali* 4-5. *Filamenti* lunghissimi. *Semi* striati, senza coda.

1. *T. angustifolium*. (Schmalblättrige W.) T. angustifoglio.
Fusto solcato, foglie quasi bipennate lineari interissime, stipole aride, pannocchia ramosa. *Pers. Syn.* II *p.* 101. *Röhl. german.* II *p.* 309. *Schult. aust.* II *p.* 98.
T. pratense angustissimo folio. *Zann. Ven. p.* 258.
Nasce nei Prati *e luoghi* erbosi *in* Campalto *e* Mal-

ghera; *fiorisce nei mesi di* Luglio ed Agosto, *ed* è pianta perenne.

2. *T. flavum.* (Gelbe W.) T. giallo.

Fusto solcato, foglie bipennate, con foglione trilobe, pannocchia ramosissima conferta, fiori eretti. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

T. majus siliqua angulosa seu striata. *Zann. Venet. p.* 257. *t.* 311.

T. nigrius caule et semine striato. *Bauh. Hist.* III *p.* 486 icone.

Nasce nei Prati umidi *in* Malghera *e* Cortelazzo; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

RANUNCULUS. (Hahnenfuss) Ranuncolo.

Calice di cinque foglie. *Petali* cinque con unghie munite di una fossetta. *Semi* nudi.

1. *R. sceleratus.* (Giftiger H.) R. scellerato.

Foglie inferiori palmate, quelle della sommità ditate, frutti bislunghi. *Pers. Syn.* II *p.* 103. *Röhl. germ.* II *p.* 315. *Schult. aust.* II *p.* 114.

Nasce intorno Malghera *nei* Fossi *e nei luoghi* acquosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

2. *R. bulbosus.* (Knolliger H.) R. bulboso.

Calice volto indietro, peduncoli solcati, fusto dritto multifloro, foglie ternate trifide, radice bulbosa. *Pers. Syn.* II *p.* 104. *Röhl. l. c. p.* 315. *Schult. l. c. p.* 118.

R. pratensis, radice verticilli modo rotunda. *Zann. Ven. p.* 224.

R. tuberosus major. *Bauh. Hist.* III *p.* 417 icon.

Nasce intorno Malghera *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

3. *R. repens.* (Kriechender H.) R. serpeggiante.

Radice fascicolata, calici patenti pelosi, peduncoli solcati, polloni serpeggianti, foglie composte. *Pers. l. c. p.* 105. *Röhl. l. c. p.* 316. *Schult. l. c. p.* 119.

R. pratensis repens hirsutus. *Zann. Ven. p.* 224.

R. repens flore luteo simplici. *Bauh. Hist.* III *p.* 419 icon.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

4. *R. acris.* (Scharfer H.) R. aspro.

Calici patenti, peduncoli tereti, peli appoggiati, foglie tripartite moltofesse, quelle della sommità lineari. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

R. pratensis erectus acris. *Zann. Ven. p.* 223, *t.* 108 mal. ob. coroll. tetrapet.

R. rectus non repens, flore simplici luteo. *Bauhin. Hist.* III *p.* 416 icone.

Nasce comunemente in Campalto *e* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

5. *R. heterophyllus*. (Verschiedenblättriger H.) R. acquatico.

Foglie sotto l'acqua capillari; quelle sopra l'acqua peltate. *Pers. l. c. p.* 106.

R. aquatilis. *Röhl. l. c. p.* 318. *Schult. l.c. p.* 121.

R. aquatilis albus tenuifolius. *Bauh. Hist.* III *p.* 781 icon.

R. aquaticus albus, lato et foeniculis folio. *Barr. ic.* 565 bona.

Nasce comunemente intorno Malghera *nei* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

CALTHA. (Dotterblume) Calta.

Calice o. *Corolla* di cinque petali. *Nettario* o. Molte *casselle* con molti *semi*.

C. palustris. (Sumpf D.) C. paludosa.

Fusto dritto, foglie cordato-reniformi. *Pers. Syn.* II *p.* 107. *Röhl. german.* II *p.* 310. *Schult. aust.* II *p.* 103.

C. palustris. *Bauh. Hist.* III *p.* 470 icon. *Dalech. Hist. p.* 1049 icon.

Farfarugio. *Matth. p.* 895 icone.

Nasce comunemente intorno Malghera *e* Campalto *nei* Fossi *e* nei Prati acquosi; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta perenne.

DIDYNAMIA

GYMNOSPERMIA.

AJUGA. (Ginsel) Bugola.
Corolla col labbro superiore piccolissimo, bidentato.
Stami più lunghi del labbro superiore.

A. reptans. (Kriechender G.) B. serpeggiante.
Stolloni serpeggianti. *Pers. Syn.* II *p.* 109. *Röhl. germ.* II *p.* 319. *Schult. aust.* II *p.* 143.
Bugula. *Zann. Ven. p.* 43. *t.* 241.
Consolida media, quibusdam Bugula. *Bauh. Hist.* III *p.* 430 icon.
Nasce comunemente in Campalto; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta perenne.

TEUCRIUM. (Gamander) Teucrio.
Corolla, il di cui tubo è senza labbro superiore ed aperto nel principio, per dove escono fuori li stami-

1. *T. Chamaedrys*. (Gemeiner G.) T. Querciola.
Foglie cuneiformi-ovate, intagliate, intaccate, picciolate, fiori ternati, fusti giacenti pelosi. *Pers. Syn.* II *p.* 111. *Röhl. germ.* II *p.* 320. *Schult. aust.* II *p.* 141. *Savi mat. med. t.* 8.
Chamaedrys major repens. *Zann. Ven. p.* 58. *t.* 97.
Chamaed. vulgo vera existimata. *Bauh. Histor.* III *p.* 288.
Nasce abbondevolmente nei luoghi arenosi, *nei* Tre-

porti *e nel* Cavallino; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

2. *T. Polium*. (Poley G.) T. Polio.

Capolini subrotondi, peduncolati, foglie lanceolate ottuse, intaccate, rivolte in dietro nel margine, tomentose, fusto cadente. *Pers. l. c. p.* 112. *Röhl. l. c. Savi l. c. t.* 5.

T. montanum album. *Zann. Ven. p.* 213. *t.* 35.

T. montanum album serratum latifolium. *Barrell. ic.* 1074.

Nasce abbondevolmente nei luoghi arenosi, *nei* Treporti *e nel* Cavallino; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

3. *T. montanum*. (Berg G.) T. montano.

Corimbi terminali, denti del calice acuti, mutici, foglie lanceolate interissime, inferiormente tomentose. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. aust.* II *p.* 141.

Polium Lavandulae folio. *Zannichel. Ven. p.* 214. *t.* 150. *f.* 1.

Nasce come la precedente, *ed è* pianta fruticosa.

SATUREJA. (Pfefferkraut) Santoreggia.

Calice tubuloso striato. *Corolla* con lacinie quasi eguali. *Stami* distanti.

S. hortensis. (Garten P.) S. degli Orti.

Peduncoli ascellari quasi cimosi, foglie lanceolate interissime, fusto incrociato. *Pers. Syn.* II *p.* 113. *Röhl. germ.* II *p.* 327.

S. hortensis s. Cunila sativa Plinii. *Zannich. Ven. p.* 235. *t.* 290.
S. sativa. *Bauh. Hist.* III *p.* 272 icon.
Nasce negli Orti *nei luoghi* asciutti; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta annuale.

MENTHA. (Münze) Menta.
Corolla quasi eguale 4-fida. *Lacinia* maggiore smarginata. *Stami* eretti distanti.

1. *M. sylvestris*. (Wald M.) M. selvatica.
Spighe bislunghe; foglie bislunghe, tomentose, sessili, inegualmente seghettate, con denti acuti, stami più lunghi della corolla. *Pers. Syn.* II *p.* 119. *Röhl. germ.* II *p.* 327. *Schult. aust.* II *p.* 134.
M. sylvestris longiore folio. *Zann. Ven. p.* 185. *t.* 95.
Menthastrum spicatum folio longiore candicante. *Bauh. Hist.* III *p.* 221.
Nasce intorno Mestre *e* Fusina; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

2. *M. aquatica*. (Wasser M.) M. acquatica.
Fiori in capolini, foglie ovate picciolate seghettate glabre, stami più lunghi della corolla. *L. Sp. pl.*
M. acquatica. *Bauh. Hist.* III *p.* 223.
Sisymbrium sylvestre. *Dalech. Hist. p.* 677 icon.
Nasce intorno Malghera *nei luoghi* acquosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* perenne.

3. *M. gentilis*. (Edel M.) M. gentile.
Fiori verticillati, foglie ovate picciolate, un poco

ottuse, fusto ramosissimo, patente, il calice alla base, ed i pedicelli glabri. *Pers. Syn.* II *p.* 119. *Röhl. germ.* II *p.* 328. *Schult. aust.* II *p.* 137.

M. verticillata minor, acuta, non crispa odore ocymi. *Bauh. Hist.* III *p.* 216 icon.

M. sativa quarta Dodonaei. *Dalechamp. Hist. p.* 673 icon.

Nasce in Malghera *nei luoghi* acquosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

4. *M. Pulegium*. (Poley M.) M. Pulegio.

Fiori verticillati, foglie ovate, fusto giacente, calice e pedicelli tomentosi, denti del calice ciliati. *Persoon l. c. p.* 120. *Röhl. germ. p.* 329. *Schult. l. c. p.* 139.

Pulegium. *Bauhin. Hist.* III *p.* 256 icon. *Dalech. Hist. p.* 891 icon.

Nasce nei luoghi inondati *intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta perenne.

GLECHOMA. (Gundelrebe) Glecoma.

Calice 5-fido. Ciascuna coppia delle *Antere* disposte in croce.

G. hederacea. (Gemeine G.) G. ederacea.

Foglie reniformi intaccate. *Pers. Syn.* II *p.* 121. *Röhl. germ.* II *p.* 324. *Schult. aust.* II *p.* 133. *Savi mat. med. t.* 20.

Hedera terrestris vulgaris. *Zannich. Venet. p.* 135. *t.* 253.

Hedera terrestris major. *Bauh. Hist.* III *p.* 855 icon.
Hedera terrestre. *Matth. p.* 662 icon.
Nasce comunemente in Campalto, *dove si trova ancora la varietà, a* fiori bianchi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

LAMIUM. (Taubnessel) Lamia.
Corolla col labbro superiore intero, l'inferiore 2-lobo. *Fauce* con un dente per parte.

1. *L. Orvala*. (Grossblumige T.) L. grandifloro.
Foglie cuoriformi, inegualmente seghettate, con denti acuti, corolla gonfia alla fauce, calice colorato. *Pers. Syn.* II *p.* 121. *Röhl. germ. p.* 321. *Schult. aust.* II *p.* 147.
Galeopsis maxima flore magno rubro. *Bauh. Hist.* III *p.* 853 icon.
Nasce intorno Mestre, *non lungi dal luogo detto*: Quattro Cantoni, *appresso* i Fossi *e luoghi* ombrosi; *fiorisce il mese di* Giugno, *ed è* pianta perenne.

2. *L. album*. (Weisse T.) L. bianco.
Foglie cuoriformi acuminate seghettate picciolate, verticilli ventiflori. *Pers. Syn.* II *p.* 122. *Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 149.
Galeopsis s. Urtica iners floribus albis. *Bauh. Hist.* III *p.* 322.
Nasce comunemente in Campalto; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

3. *L. purpureum*. (Rothe T.) L. purpureo.
Foglie cuoriformi ottuse, dentate, picciolate, quelle della sommità ammucchiate, fusto, di sotto, quasi senza foglie. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p.* 322. *Schult. aust. l. c.*
L. purpureum foetidum, folio subrotundo. *Zann. Ven. p.* 158.
Galeopsis sive Urtica iners, folio et flore minore. *Bauh. Hist.* III *p.* 323.
Nasce nei luoghi coltivati *e negli* Orti; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta annuale.

4. *L. amplexicaule*. (Stängelumfassender T.) L. abbracciafusto.
Foglie florali sessili, abbraccianti il fusto, intagliate, le radicali picciolate. *Pers. Synops.* II *p.* 122. *Röhl. l. c. Schult. l. c.*
L. folio caulem ambiente minus. *Zann. Ven. p.* 158.
Galeopsis s. Urtica iners minor, folio caulem ambiente. *Bauh. Hist.* III *p.* 853.
Nasce come la precedente; *fiorisce nella* Primavera, *ed è* pianta annuale.

GALEOPSIS. (Hohlzahn) Galeosside.
Corolla col labbro superiore concavo, intaccato, l'inferiore con due denti alla *fauce*.

G. grandiflora. (Grossblumiger H.) G. a fiori grandi.
Foglie ovato-lanceolate seghettate, fusto ispido, internodii superiormente un poco ingrassati, corol-

la tre volte maggiore del calice, labbro superiore intaccato-intagliato. *Schult. aust.* II *p.* 152. *Röhl. germ.* II *p.* 322.

G. ochroleuca. *Pers. Syn.*

Nasce in Campalto *ed in* Cortelazzo *nei luoghi* umidi *ed* ombrosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

BETONICA. (Betonien) Betonica.

Calice restato. *Corolla* il labbro superiore ascendente, un poco piano. *Tubo* cilindrico.

B. officinalis. (Gemeine B.) B. officinale.

Spiga interrotta, corolla col labbro superiore intero, l'inferiore smarginato. *Pers. Synops. p.* 122. *Röhl. germ.* II *p.* 326. *Schult. aust.* II *p.* 145.

B. purpurea spica longiori. *Zannichel. Ven. p.* 37. *t.* 240.

B. vulgaris purpurea. *Bauh. Hist.* III *p.* 301 cum icone.

Nasce nei Treporti *e nel luogo detto* Aca Bianca *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

STACHYS. (Ziest) Stachide.

Corolla col labbro superiore concavo, labbro inferiore, con le lacinie laterali richinate, trifido, con la lacinia di mezzo maggiore smarginata.

1. *S. sylvatica*. (Wald Z.) S. selvatica.

Verticilli di sei fiori, foglie cuoriformi picciolate. *Pers.*

Syn. II *p.* 123. *Röhl. germ.* II *p.* 323. *Schult. aust.* II *p.* 155.

Galeopsis s. Urtica iners magna foetidissima. *Bauh. Hist.* III *p.* 853.

Nasce appresso i muri *non lungi dal luogo detto:* Quattro Cantoni; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. *St. palustris*. (Sumpf Z.) S. paludoso.

Verticilli di sei fiori, foglie lineari-lanceolate semiabbracciafusto sessili. *Pers. loc. cit. Röhl. loc. cit. Schult. loc. cit.*

Galeopsis palustris betonicae folio, flore variegato. *Zann. Ven. p.* 283.

Galeop. augustifolia foetida. *Bauh. Hist.* III *p.* 854.

Nasce in Malghera *nei* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

3. *St. germanica*. (Deutscher) S. di Germania.

Canescente, foglie ovato-lanceolate ottusamente seghettate, verticilli con molti fiori, fusto lanato. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p.* 324. *Schult. l. c. p.* 156.

St. Fuchsi. *Bauh. Hist.* III *p.* 319.

Nasce in Campalto *nei luoghi* asciutti; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

4. *St. recta*. (Weisser Z.) S. dritta.

Verticilli con 6-15 fiori, calici pungenti, foglie ovato-lanceolate seghettate, fusti ascendenti. *Persoon loc. cit. Rohling. loc. cit. p.* 224. *Schult. loc. cit. p.* 156.

Sideritis hirsuta procumbens. *Zann. Venet. p.* 247. *t.* 200 mala.

Sid. vulgaris hirsuta. *Bauh. Hist.* III *p.* 425 icon.

Nasce comunemente nel Lido *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

BALLOTA. (Ballote) Ballota.

Calice ipocrateriforme 5-dentato, 10-striato. *Corolla* col labbro superiore concavo, intaccato. *Semi* ovati triquetri.

B. nigra. (Schwarze B.) B. nera.

Foglie indivise, cuoriformi, seghettate, calici acuminati. *Pers. Syn.* I *p.* 125. *Röhl. germ.* II *p.* 323. *Schult. aust.* I. *p.* 160.

Ballote. *Zann. Ven. p.* 34. *t.* 182. *Matth. p.* 872 icon.

Marrubium nigrum s. Ballote. *Bauhin. Histor.* III *p.* 318 icon.

Nasce comunemente nel Lido *e* Fusina; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

LEONURUS. (Löweschwanz) Leonuro.

Calice 5-gono, 5-dentato. *Corolla* col labbro superiore villoso, piano, intero, l'inferiore tripartito, con la lacinia di mezzo indivisa.

L. Cardiaca. (Gemeine L.) L. Cardiaca.

Foglie cuneiformi-ovate trilobe, le superiori lanceolate interissime, corolla maggiore dei calici pungenti. *Pers. Syn.* II *p.* 126. *Röhl. germ.* II *p.* 321. *Schult. aust.* I. *p.* 145.

Cardiaca. *Zann. Ven. p.* 49. *t.* 109. *Bauh. Hist.* III *p.* 320 sine icone. *Matth. p.* 1186.

Nasce nel Lido *appresso le* Siepi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Settembre, *ed è* pianta perenne.

CLINOPODIUM. (Wirbelborste) Clinopodio.

Involglio di molte brattee setacee. *Calice* bilabbrato. *Corolla* col labbro superiore piano, cordato a rovescio, dritto.

C. vulgare. (Gemeine W.) C. volgare.

Capolini verticillati, brattee setacee ispide, foglie nella pagina superiore pelose, distantemente dentate, fusto semplice. *Persoon Synops.* II *p.* 129. *Röhl. germ.* II *p.* 331. *Schult. aust.* II *p.* 173.

C. origano simile. *Zann. Ven. p.* 70. *t.* 176.

C. quorumdam origani facie. *Bauh. Hist.* III *p.* 250 sine icon.

Nasce in Campalto *nei luoghi* montuosi, *ed appresso le* Siepi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

ORIGANUM. (Dosten) Origano.

Strobilo tetragono spicato. *Calice* ineguale quasi bilabbrato cilindrico, internamente setoloso. *Corolla* col labbro superiore eretto, il labbro inferiore tripartito, con lacinie eguali.

O. vulgare. (Gemeiner D.) O. volgare.

Spighe subrotonde panicolate conglomerate, brattee ovate colorite più lunghe del calice. *Lin. Sp. pl.*

Pers. Syn. II *p.* 129. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 912. *Röhl. german.* II *p.* 331. *Schult. aust.* II *p.* 173. *Gilib. Lithuan.*

O. sylvestre. *Zann. Ven. p.* 200. *t.* 149.

O. vulgare spontaneum. *I. Bauhin. Hist.* III *p.* 236 cum icone.

O. sylvestre s. vulgare. *Fuchs Hist. p.* 522.

Origano volgare. *Matth. p.* 739 cum icone.

Nasce non lungi da Cortelazzo *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

THYMUS. (Thymian) Timo.

Calice bilabbrato con la fauce chiusa da peli. *Corolla* col labbro superiore piano, smarginato.

T. Serpyllum. (Feld T.) T. serpillo.

Fiori in capolini, fusti serpeggianti, foglie piane, ottuse, ciliate alla base. *Pers. Synops.* II *p.* 130. *Röhl. germ.* II *p.* 330. *Schult. aust.* II *p.* 164.

Serpyllum vulgare minus. *Zannichel. Venet. p.* 246. *t.* 172.

Serpyllum vulgare. *Bauh. Hist.* III *p.* 268 icon.

Serpillo. *Matth. p.* 763 icon.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi* montuosi, asciutti; *fiorisce nei mesi di* Aprile *sino* Agosto, *ed è* pianta perenne.

MELISSA. (Melissa) Melissa.

Calice arido, un poco piano nel margine. *Labbro* superiore fastigiato. *Corolla* col labbro superiore

concavo bifido. *Lobo* di mezzo del labbro inferiore cordato a rovescio.

1. *M. officinalis*. (Citronen M.) M. Cedroncella.
Verticilli smezzati quasi sessili, brattee bislunghe pedicellate, foglie ovate acute seghettate. *Pers. Syn.* II *p.* 132. *Röhl. german.* II *p.* 335. *Schult. aust.* II *p.* 174. *Savi mat. med. t.* 30.
M. vulgaris odore citri. *Bauh. Hist.* III *p.* 232 icon.
Melissa. *Matth. p.* 874 icon.
Nasce in Campalto *appresso le* Siepi; *fiorisce nei mesi di* Giugno e Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. *M. Calamintha*. (Kalaminthen M.) M. Calaminta.
Peduncoli ascellari, con molti fiori, dicotomi, foglie ovate, ottuse, seghettate, macchiate, fusto irto. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p.* 330 sub Thymo. *Schult. l. c. p.* 167.
Calamintha officinalis. *Savi l. c. t.* 42.
Calam. flore magno vulgaris. *Bauh. Hist.* III *p.* 218 icon.
Nasce in Brondolo *e nell'*Aca Bianca *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

3. *M. Nepeta*. (Katzen M.) M. Nepetella.
Peduncoli ascellari, multiflori, dicotomo-corimbosi, foglie ovate ottuse quasi seghettate, fusto irsuto, denti calicini glabri, quasi eguali. *Pers. loc. cit. Röhl. germ. l. c. p.* 331 sub Thym. *Schult. l. c.*
Calamintha pulegii odore. *Zann. Ven. p.* 46. *t.* 187.

Calamintha flore minore, odore Pulegii. *Bauh. Hist.* III *p.* 229.

Nasce comunemente nei luoghi montuosi *e* sassosi, *specialmente in* San Niccolò *di* Lido; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

SCUTELLARIA. (Helmkraut) Scodellaria.

Calice bilabbiato con labbri interi, chiuso dopo la fiorescenza da un coperchio elmiforme. *Corolla* con tubo prolungato.

S. galericulata. (Gemeines H.) S. volgare.

Foglie cordato-lanceolate intaccate, fiori ascellari. *Pers. Synops.* II *p.* 136. *Röhl. germ.* II *p.* 329. *Schult. aust.* II *p.* 162.

Tertionaria, aliis Lysimachia galericulata. *Bauhin. Hist.* III *p.* 435 icon.

Lysimachia galericulata. *Dalechamp. Hist. p.* 1060 icon.

Nasce in Campalto, *e intorno* Malghera *nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

PRUNELLA. (Braunheil) Brunella.

Corolla col labbro superiore dilatato. *Filamenti* forcati, in una punta delle quali è attaccata l'antera. *Stimma* bifido.

1. *P. vulgaris*. (Gemeines B.) B. volgare.

Foglie picciolate, bislungo-ovate, calice col labbro superiore troncato, tirestato, fusto ascendente,

spiga terete. *Pers. Syn.* II *p.* 137. *Röhl. germ.* II *p.* 333. *Schult. aust.* II *p.* 171.

Brunella major, folio non dissecto. *Zannich. Ven. p.* 40. *t.* 242.

Prun. flore minore, vulgaris. *Bauh. Hist.* III *p.* 418 icon.

Nasce comunemente in Campalto *e* Malghera *nei luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. *P. laciniata*. (Gerissenes B.) B. laciniata.

Fusto quasi semplice, foglie pennato-fesse, le inferiori bislunghe. *Pers. l. c. p.* 137. *Schult. l. c.*

Brunella minor alba laciniata. *Zann. Venet. p.* 40. *t.* 136.

Prun. flore magno albo, folio laciniato. *Bauh. Hist.* III *p.* 429 sine icon.

Nasce in Campalto *e* Malghera *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

ANGIOSPERMIA

VERBENA. (Eisenhart) Verbena.

Calice 5-fido. *Corolla* imbutiforme. *Tubo* curvo. *Lembo* ineguale 5-fido. Quattro *stami* fertili. *Frutto*, quattro semi riuniti da un tessuto cellulare.

V. officinalis. (Gemeiner E.) V. comune.

Spighe filiformi ramose, foglie molto-fesse intagliate, fusto ramoso. *Pers. Synops.* II *p.* 138. *Röhl. german.* II *p.* 329. *Schult. aust.* II *p.* 162. *Savi mat. med. t.* 52.

V. comunis. *Zann. Ven. p.* 173. *t.* 169.

V. vulgaris. *Bauh. Hist.* III *p.* 443.

Verbenaca. *Matth. p.* 1107 icon.

Nasce negli Orti *e luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

EUPHRASIA. (Augentrost) Eufragia.

Calice 4-fido. *Corolla* bilabbiata, col labbro superiore bifido, l'inferiore trilobo, con le lacinie bifide. *Antere* delli stami minori spinose alla base di uno dei loro lobi.

1. *E. officinalis*. (Gemeiner A.) E. officinale.

Foglie ovate ottusamente dentate, corolla, il labbro inferiore, con le lacinie smarginate. *Pers. Syn.* II *p.* 149. *Röhl. germ.* II *p.* 334. *Schult. aust.*

E. officinarum. *Zann. Ven. p.* 97. *t.* 246.

Euphrasia. *Bauh. Hist.* III *p.* 432.

Eufragia. *Matth. p.* 1076 icon.

Nasce comunemente intorno Malghera *e nei* Treporti *nei* Prati *e luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Agosto, *ed è* pianta annuale.

2. *E. Odontites*. (Brauner A.) E. Odontide.

Fusto ramosissimo peloso-scabro, foglie lineari-lanceolate seghettate. *Pers. l. c. p.* 150. *Röhl. germ.* II *p.* 335. *Schult. l. c. p.* 179 sub Bartsia.

Pedicularis serotina purpurascente flore. *Zann. Ven. p.* 206. *t.* 99.

Euphrasia parva purpurea. *Bauh. Hist.* III *p.* 433.

Nasce nei Treporti *nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

RHINANTHUS. (Hahnenkamm) Rinanto.

Calice ventricoso 4-fido. *Corolla* ringhiosa col labbro superiore compresso. *Cassella* ottusa, compressa, di due cavità.

R. Crista Galli. (Gemeiner H.) R. comune.

Calice glabbro, corolla col labbro superiore compresso 2-dentato, lacinia media del labbro inferiore brevissima, fusto macchiato. *Pers. Syn.* II *p.* 151. *Röhl. german.* II *p.* 335. *Schult. aust.* II *p.* 180.

Pedicularis pratensis lutea. *Zann. Ven. p.* 207.

Crista galli foemina. *Bauh. Hist.* III *p.* 436 icon.

Nasce comunemente intorno Malghera *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

MELAMPHYRUM. (Kuhweizen) Melampiro.

Calice 4-fido. *Corolla* col labbro superiore compresso, piegato nel margine. *Cassella* di due cavità, e con due semi gobbi.

M. arvense. (Acker K.) M. dei campi.

Spighe coniche allargate, brattee dentato-setacee, colorite, denti del calice scabri, corolle chiuse.

Pers. Syn. II *p.* 151. *Röhl. germ.* II *p.* 335. *Schult. aust.* II *p.* 181.

Nasce intorno Malghera *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

LINARIA. (Leinkraut) Linaria.

Calice 5-partito. *Corolla* mascherata, con sprone. *Cassella* ovata di due cavità, che si apre nella cima, in 3-5 lacinie richinate.

1. *L. Elatine*. (Spiesförmiges L.) L. Elatine.

Foglie astiformi alterne, fusti giacenti. *Pers. Syn.* II *p.* 155. [sub Antirrhin. uti sequent.) *Schult. aust. p.* 191.

Cymbalaria Elatine: *Röhl. germ.* II *p.* 343.

Lin. segetum nummulariae folio, villoso, aurito, flore luteo. *Zann. Ven. p.* 167.

Elatine foemina, folio anguloso. *Bauh. Histor.* III *p.* 372 icone.

Nasce in Campalto *e* Malghera *nei luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

2. *L. muralis*. (Mauer L.) L. murale.

Foglie cuoriformi, alterne, liscie, 5-lobe, fusti giacenti. *Pers. l. c. Schult. l. c.* Cymbalaria muralis. *Röhl. l. c.*

Cymbalaria flosculis purpurascentibus. *Zann. Ven. p.* 77. *tab.* 252. *Bauhin. Histor.* III *p.* 685 cum icone.

Nasce nei muri antichi *e nei luoghi* sterili *in* San-

ta Marta; *fiorisce nel mesi di* Marzo *sino* Agosto, *ed è* pianta perenne.

3. *L. minor*. (Kleines L.) L. minore.
Foglie per lo più alterne, lanceolate ottuse, fusto ramosissimo patente. *Pers. l. c. p.* 157. *Schultes l. c. p.* 193. *Röhl. l. c. p.* 342.
Antirrhinum minimum. *Bauh. Hist.* III *p.* 465 icon.
Antirrhino III. *Matth. p.* 1257 icone.
Nasce negli Orti *e luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Maggio *sino* Settembre, *ed è* pianta annuale.

4. *L. vulgaris*. (Gemeines L.) L. volgare.
Foglie lanceolato-lineari conferte, fusto eretto, spighe terminali sessili, fiori imbricati. *Pers. l. c. p.* 158. *Röhl. germ.* II *p.* 342. *Schult. l. c.*
L. vulgaris lutea, flore majore. *Zann. Ven.* p. 167. *t.* 174.
L. lutea vulgaris. *Bauh. Hist.* III *p.* 456 icon.
Osiride. *Matth. p.* 1268 icon.
Nasce in Malghera, *nei* terreni *di* Santa Marta *e su'* Rovinazzi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

ANTIRRHINUM. (Löwenmaul) Antirrino.
Calice di cinque foglie. *Corolla* senza sprone, gobba alla base. *Labbro* superiore bifido richinato, l'inferiore trifido. *Fauce* chiusa dal palato. *Cassella* di due cavità, obliqua alla base che si apre nella cima con tre fori.

A. majus. (Grosses L.) A. maggiore.

Foglie lanceolate, opposte, fiori spicati, calice con lacinie rotondate glanduloso-pelose. *Pers. Syn.* II *p.* 158. [sub Orontium] *Röhl. germ.* II *p.* 341. *Schult. aust.* II *p.* 194.

A. vulgare. *Zann. Ven. p.* 18. *Bauhin. Histor.* III *p.* 462.

Antirrhino I. *Matth. p.* 1255 icon.

Nasce nei muri antichi *e luoghi* ombrosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Settembre, *ed è* pianta bienne.

SCROPHULARIA. (Braunwurz) Scrofolaria.

Calice 5-fido. *Corolla* arrovesciata globosa. *Cassella* di due cavità.

1. *S. nodosa*. (Knotige B.) S. nodosa.

Fusto con angoli ottusi, foglie cuoriformi, seghettate, glabre, trinervate. *Pers. Syn.* II *p.* 160. *Röhl. germ.* II *p.* 337. *Schult. aust.* II *p.* 185.

S. nodosa foetida. *Zann. Ven. p.* 242. *t.* 303.

S. vulgaris et major. *Bauh. Hist.* III *p.* 421 cum icone.

Nasce in Malghera *e* Santa Marta *nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. *S. canina*. (Hunds B.) S. canina.

Foglie pennate, grappoli terminali nudi, peduncoli bifidi. *Pers. Syn. l. c. Röhl. germ. l. c. Schult. l. c. p.* 187.

S. Ruta canina dicta, vulgaris. *Zann. Ven. p.* 242. *t.* 221.

S. tertia Dodoneo ec. ec. *Bauhin. Hist.* III *p.* 423 cum icone.

Nasce in Chioggia *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

OROBANCHE. (Sommerwurz) Orobanche.

Calice di due foglie bipartite. *Corolla* ringhiosa. *Cassella* di una sola cavità, con due valve e con molti semi. *Glandola* alla base del germe.

O. caryphyllacea. (Nelkenduftende S.) O. a odore di garofano.

Fusto semplice, corolla gonfia fimbriato-crespa, labbro inferiore con lacinie ottuse, eguali, stami dentro alla base pelosi. *Pers. Syn.* II *p.* 180. *Röhl. germ.* II *p.* 333. *Schult. aust.* II *p.* 176.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi* montuosi *ed erbosi*; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

TETRADYNAMIA

SILICULOSAE.

MYAGRUM. (Dotter) Miagro.

Siliquetta sugherosa, senza valve, con le cavità inferiori con un solo seme, e le superiori sterili.

M. rugosum. (Runzeliges D.) M. rugoso.
Siliquette solcate, pelose, rugose ed aspre, foglie bislunghe, ottuse, dentate. *Pers. Syn.* II *p.* 183. *Röhl. germ.* II *p.* 355. *Schult. aust.* II *p.* 210.
Nasce nei terreni *di* Santa Marta; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

BUNIAS. (Zackenschote) Erucagine.
Siliquetta quasi tetragona, senza valve, di due o quattro cavità, rugosa.

B. Erucago. (Stachelsenf Z.) E. volgare.
Siliquette tetragone dentate, foglie radicali runcinate, quelle del fusto lanceolate. *Pers. Syn.* II *p.* 183. *Schult. aust.* II *p.* 211.
Erucago glandulosa, *Röhl. germ.* II *p.* 335.
Sinapi echinatum. *Bauh. Hist.* II *p.* 858 cum icone.
Nasce nei luoghi umidi *a* Santa Marta; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta annuale.

CAKILE. (Meersenf) Cachile.
Siliquetta lanceolata, quasi tetragona 2-articolata. *Articoli* evalvi monospermi.

C. maritima. (Gemeiner M.) C. marino.
Foglie pennate carnose. *Pers. Syn.* II *p.* 184. *Röhl. germ.* II *p.* 334.
Bunias [Cakile] Siliculis ovatis laevibus ancipitibus. *L. Spec. Plant.*
C. maritima, angustiore folio. *Zann. Venet. p.* 45. *t.* 13. 177. 189 193.

E. quibusdam, aliis Eruca maritima, et Raphanus marinus. *Bauh. Hist.* II *p.* 867.

Nasce in tutte le Spiaggie arenose, *specialmente in quella del* Lido; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

COCHLEARIA. (Löffelkraut) Coclearia.

Siliquetta gonfia, rugosa con due valve e con molti semi. *Valve* gobbe ottuse. *Tramezzo* quasi paralello.

C. Draba. (Doldentragendes L.) C. Draba.

Foglie lanceolate, abbraccianti il fusto, dentate. *Pers. Syn.* II *p.* 186. *Schult. aust.* II *p.* 214.

Lepidium Draba. *Röhl. germ.* II *p.* 350.

Lepid. humile incanum, arvense. *Zann. Ven. p.* 151. *t.* 148. *f.* 2.

Draba multis, flore albo. *Bauh. Hist.* II *p.* 939.

Nasce nel luogo detto: Lazzaretto-Nuovo *appresso i* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

LEPIDIUM. (Kresse) Lepidio.

Corolla regolare. *Siliquetta* cuoriforme, smarginata, con molti semi. *Valve* carenate. *Tramezzo* contrario.

L. graminifolium. (Grasblättrige K.) L. graminifoglio.

Foglie radicali lirato-pennatofesse, le inferiori del fusto lanceolate, seghettate, le superiori lineari

interissime, fiori con sei stami, siliquette ovate, acuminate. *Pers. Syn.* II *p.* 188. *Röhl. germ.* II *p.* 351 sub L. Iber. *Schult. aust.* II *p.* 216.

Iberis latiore folio. *Zann. Ven. p.* 147. *t.* 43.

Iberis. *Bauh. Hist.* II *p.* 918 icon bona.

Nasce abbondevolmente in Fusina, *a* Santa Marta *e nel* Lido *nei* Rovinazzi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

THLASPI. (Täschelkraut) Tlaspide.

Siliquetta smarginata, cordata a rovescio, con molti semi. *Valve* navicolari marginato-carenate.

1. *T. campestre*: (Feld T.) T. dei campi.

Siliquette subrotonde glandoloso-puntate, foglie radicali ovate a rovescio, quelle del fusto saettiformi sessili dentate incane. *Pers. Syn.* II *p.* 189. *Röhl. germ.* II *p.* 349. *Schult. aust.* II *p.* 219.

T. vulgatius. *Bauh. Hist.* II *p.* 921.

T. I. *Matth. p.* 597 icon.

Nasce comunemente in Santa Marta; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta biennale.

Fusto *dritto*. Foglie *glauche, le radicali picciolate, ovate a rovescio, sinuato-lirate, ovvero interissime, quelle del fusto conferte sessili saettiformi, un poco dentate, col margine volto indietro*. Fiori *terminali*. Petali *interi spatolati, bianchi*.

2. *T. Bursa pastoris*. (Hirtentasche T.) T. degli Orti.

Siliquette cordate a rovescio, foglie radicali penna-

to-fesse. *Pers. Syn. l. c. Röhl. l. c. p.* 350 sub Nasturt. *Schult. aust.* II *p.* 217 sub Capsella.

Bursa pastoris major folio sinuato. *Zannich. Ven. p.* 43. *t.* 244.

Bursa pastoria. *Bauh. Hist.* II *p.* 936.

Nasce comunemente negli Orti *e luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Settembre, *ed è* pianta annuale.

DRABA. (Hungerblümchen) Draba.

Siliquetta intera ovali-bislunga, con valve un poco piane. *Tramezzo* paralello. *Stilo* quasi nessuno.

D. verna. (Frühlings H.) D. di primavera.

Fusto nudo, foglie bislunghe un poco acute, quasi seghettate irte, petali bifidi, stimmi sessili. *Pers. Syn.* II *p.* 190. *Röhling. germ.* II *p.* 343. *Schult. aust.* II *p.* 224.

Alysson vulgare, Polygoni folio, caule nudo. *Zann. Ven. p.* 12.

Bursa pastoris minima. *Bauh. Hist.* II *p.* 937 cum icone.

Nasce nei luoghi arenosi *ed* asciutti *nel* Lido; *fiorisce nei mesi di* Febbrajo *e* Marzo, *ed è* pianta annuale.

CAMELINA. (Leindotter) Camellina.

Stami edentati. *Stilo* bislungo. *Siliquetta* membranacea ovata, ovvero rotonda, con due *valve*, e con molti *semi* bislunghi un poco striati, non marginati.

C. sativa. (Gemeiner L.) C. domestica.
Siliquette ovate a rovescio peduncolate, foglie abbraccianti il fusto, interissime. *Pers. Synops.* II *p.* 191. *Röhl. german.* II *p.* 345. *Schult. aust.* II *p.* 231.
Myagrum sativum. *L. Spec. Plant.*
Alysson segetum, foliis auriculatis acutis. *Zannich. Ven. p.* 12.
Myagrum dictum Camellina. *Bauh. Hist.* II *p.* 892 cum icone.
Nasce fra le Biade *e fra il* Lino; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta annuale.

SILIQUOSA

CARDAMINE. (Schaumkraut) Cardamine.
Siliqua che si apre con elasticità in due *valve* che si avvoltano. *Stimma* intero.

1. *C. hirsuta*. (Beharrtes S.) C. hirsuta.
Foglie pennate senza stipole, foglioline rotondate repando-dentate picciolate, fiori con quattro stami. *Pers. Syn.* II *p.* 196. *Röhl. germ.* II *p.* 365. *Schult. aust.* II *p.* 261.
C. quarta Dalechampii. *Zann. Ven. p.* 49. *t.* 225. *Dalechamp. Hist. p.* 659 icon.
Sysimbrium cardamine hirsutum. *Bauh. Histor.* III *p.* 888 cum icone.
Cardam. sylvestris minor. *Barr. ic. t.* 455.

Nasce comunemente nei luoghi ombrosi *e fra'* Sassi; *fiorisce nei mesi di* Febbraro *e* Marzo, *ed è* pianta annuale.

2. *C. pratensis* .(Wiesen S.) C. dei prati.

Foglie pennate con foglioline radicali subrotonde, quelle del fusto lineari-lanceolate. *Pers. loc. cit. Röhl. l. c. p.* 366. *Schult. l. c. p.* 263.

Nasce in Malghera *e* Campalto *nei* Prati umidi; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta perenne.

Fusto *semplice angolato*. Foglioline *inferiori subrotonde, quelle del fusto lanceolate*. Fiori *terminali in grappoli, grandi*.

SISIMBRIUM. (Raucke) Sisembro.

Siliqua che si apre con valve dritte. *Calice* patente. *Corolla* patente.

1. *S. amphibium*. (Wasser R.) S. amfibio.

Silique declinate bislungo-ovate, foglie pennatofesse seghettate, petali più lunghi del calice. *Pers. Syn.* II *p.* 196. *Röhl. germ.* II *p.* 361. *Schult. aust.* II *p.* 267.

β *S. aquaticum* foglie pennatofesse. *Röhl. l. c.*

Nasce intorno Malghera *e in* Campalto *nei luoghi* acquosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

2. *S. tenuifolium*. (Dünblättrige R.) S. a foglie tenui.

Glabra, silique dritte, foglie inferiori tripennatofes-

se, le superiori intere. *Persoon. Synops.* II *p.* 197. *Röhl. loc. cit. p.* 362. *Schult. loc. cit. p.* 268.
Eruca tenuifolia perennis. *Bauhin. Hist.* II *p.* 861 cum icone.
Ruchetta selvatica. *Matth. p.* 560 icon.
Nasce nei luoghi asciutti, *specialmente intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

3. *S. Sophia*. (Feinblättrige R.) S. Sofia.
Petali minori del calice, foglie arcicomposte con foglioline lineari. *Pers. l. c. p.* 198. *Schultes l. c. p.* 270. *Röhl. l. c.*
Sophia chirurgorum. *Zann. Ven. p.* 252. *t.* 305.
Seriphium germanicum s. Sophia quibusdam. *Bauh. Hist.* II *p.* 886.
Nasce nel luogo detto Aca Bianca *nei luoghi* asciutti; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

ERYSIMUM. (Hederich) Erisimo.
Calice chiuso. *Siliqua* tetragona.

E. officinale. (Gemeiner H.) E. officinale:
Foglie runcinate, silique appoggiate alla spiga. *Pers. Syn.* II *p.* 199. *Röhl. germ.* II *p.* 362 sub Sisimbr. *Schult. aust.* II *p.* 236.
E. vulgare. *Zann. Ven. p.* 96. *t.* 287.
E. Tragi, floscnlis luteis ec. ec. *Bauh. Hist.* II *p.* 863.
Nasce nei Rovinazzi, *e fra'* Sassi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

Fusto *terete ramoso, con rami patenti*. Foglie *pelose*. Fiori *in spighe lunghe, piccoli*. Petali *ottusi*. Silique *lesiniformi pelose*.

CHEIRANTHUS. (Levkoje) Cheiranto.

Calice chiuso, con due foglioline gobbe alla base. *Petali* dilatati. *Germe* con un dente glandoloso per parte. *Siliqua* compressa, ovvero terete. *Stimma* bilobo. *Semi* piani, in qualche speoie marginati.

C. Cheiri. (Gelbe L.) C. giallo.

Foglie lanceolate acute, glabre, rami angolati, fusto fruticoso. *Lin. Sp. pl. Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1193. *Pers. Syn.* II *p.* 200. *Röhl. germ.*

Leucojum luteum. *Bauh. Hist.* II *p.* 872.

Viola lutea. *Fuchs Hist. p.* 458.

Leucojo giallo. *Matth. p.* 925.

Nasce nella città *sopra i* muri *e sopra i* tetti; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta fruticosa.

ARABIS. (Gänsekraut) Arabide.

Glandole quattro, ognuna fra una fogliolina del calice eguale ad una squamma richinata. *Silique* compresse.

A. Thaliana. (Gemeines G.) A. comune.

Foglie irsute, le radicali bislunghe picciolate, quelle del fusto lanceolate sessili, interissime. *Pers. Syn.* II *p.* 204. *Röhl. germ.* II *p.* 366. *Schultes aust.* II *p.* 245.

Turritis vulgaris ramosa. *Zann. Ven. p.* 267.
Bursa Pastoria sive Pilosella siliquosa. *Bauh. Hist. p.* 870 cum icone mediocri.
Nasce negli Orti *e luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta annuale.

SINAPIS. (Senf) Senape.
Siliqua con rostro lungo. *Calice* patente, orizzontale. *Glandole* alla base degli stami.

S. Erucastrum. (Rauckenartiger S.) S. Erucastro.
Foglie runcinate, fusto ispido, silique liscie, stilo spadiforme. *Röhl. germ.* II *p.* 360.
Brassica Erucastrum. *L. Pers. Synops.* II *p.* 207. *Schult. aust.* II *p.* 255.
Eruca inodora. *Bauh. Hist.* II *p.* 862.
Nasce abbondevolmente a Santa Marta *nei* Rovinazzi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta annuale.

TURRITIS. (Thurmkraut) Turritide.
Siliqua lunghissima angolata, striata. *Calice* connivente dritto. *Corolla* dritta.

T. hirsuta. (Haariges T.) T. irsuta.
Foglie tutte ispide, le cauline abbraccianti il fusto, siliqua quadrangolare. *Pers. Syn.* II *p.* 205. *Röhl. germ.* II *p.* 358. *Schult. aust.* II *p.* 250.
T. minor. *Zann. Ven. p.* 266. *t.* 170.
Barbarea muralis. *Bauh. Hist.* II *p.* 869.

Nasce nel Lido *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta annuale.

MONADELPHIA

PENTANDRIA.

ERODIUM. (Reiherschnabel) Erodio.

Calice di cinque foglie. *Corolla* di cinque petali. *Nettario* cinque squamme alterne con i filamenti. *Germe* con cinque *glandole* mellifere alla base. *Arilli* cinque, monospermi, alla base del ricettacolo rostrato. *Reste* spirali, barbate nel lato interno.

1. *E. Cicutarium*. (Schierlingsblättriger R.) E. à foglie di cicuta.

Peduncoli con molti fiori, foglie pennate con foglioline sessili, pennatofesse, incise, corolla maggiore del calice, fusto giacente irto. *Pers. Synops.* II *p.* 224. *Röhl. germ.* II *p.* 370. *Schult. aust.* II *p.* 279.

Geranium cicutae folio, minus et supinum. *Zann. Ven. p.* 110. *t.* 215.

Geran. moschatum minus. *Bauh. Hist.* III *p.* 479 cum icone.

Nasce nel Lido *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta annuale.

2. *E. malacoides*. (Pappelartiger R.) E. a foglie di Altea.

Peduncoli con molti fiori, foglie cuoriformi, ottuse, quasi lobate, dentate, glabre, fusto e piccioli irti. *Pers. l. c. p.* 225.

Geran. malvaceum. *Bauhin. Hist.* III *p.* 472 cum icone mediocri.

Nasce nel Lido *nei* muri antichi *e luoghi* sassosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta annuale.

DECANDRIA

GERANIUM. (Storchschnabel) Geranio.

Cal. di cinque foglie. *Cor.* regolare di cinque petali. *Nettari* cinque alla base dei filamenti più lunghi. *Arilli* cinque, monospermi restati, alla base del *ricettacolo* rostrato. *Reste* nude dritte.

1. *G. molle*. (Weicher S.) G. molle.

Peduncoli con due fiori, foglie reniformi pelose, le radicali 9-lobi, quelle del fusto 7-lobi, lobi trifidi, petali bifidi della lunghezza del calice muticо, arilli glabri rugosi, fusto dritto peloso. *Pers. Syn.* II *p.* 236. *Röhl. germ.* II *p.* 372. *Schultes aust.* II *p.* 286.

Nasce in Campalto *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

2. *G. dissectum*. (Zerschnittener S.) G. tagliuzzato.

Peduncoli con due fiori, foglie 5-partite con lobi trifidi lineari, petali smarginati, della lunghezza del calice restato, arilli pelosi, semi reticolati. *Pers. loc. cit. Röhl. loc. cit. p.* 373. *Schult. loc. cit. p.* 287.

Nasce in Chioggia *e* Malghera *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta annuale.

3. *G. rotundifolium*. (Rundblättriger S.) G. a foglie rotonde.

Peduncoli con due fiori, foglie radicali reniformi 7-lobe, quelle del fusto subrotonde, troncati alla base, 5-lobe, con lobi trifidi, petali interi della lunghezza del calice restato, arilli irsuti, semi reticolati. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

G. folio malvae rotundo. *Zann. Ven. p.* 112. *t.* 291.

G. folio rotundo multum serrato. *Bauh. Hist.* III *p.* 473 cum icone.

Nasce negli Orti *e luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta annuale.

4. *G. pusillum*. (Nidriger S.) G. piccolo.

Peduncoli con due fiori, pentandri, foglie quasi 7-lobe, con lobi trifidi, petali smarginati, della lunghezza del calice mutico, arilli pubescenti. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. aust.* II *p* 288.

G. columbinum majus flore minore caeruleo. *Zann. Ven. p.* 112.

Nasce nel Lido *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta annuale.

5. *G. Robertianum*. (Stinkender S.) G. Robertiano.
Peduncoli con due fiori, foglie 3-5 partite con lacinie pennatofesse, petali doppiamente più lunghi del calice restato, 10-angolato, arilli rugosi, reticolati, semi glabri. *Röhl. l. c. Schult. l. c.*
G. Pedunculis bifloris, calycibus pilosis decemangulatis. *Pers. l. c.*
G. Robertianum primum. *Zann. Ven. p.* 111. *t.* 228.
G. Robertianum murale. *Bauh. Histor.* III *p.* 480 cum icone.
Geranio V. *Matth. p.* 906 icon.
Nasce nei muri *e nei luoghi* sassosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

POLYANDRIA

ALTHEA. (Eibisch) Altea.
Calice doppio, l'esterno 6-fido. *Arilli* molti monospermi.

A. officinalis. (Gemeiner E.) A. officinale.
Foglie tomentose bislungo-ovate dentate. *Pers. Syn.* II *p.* 248. *Röhl. germ.* II *p.* 375. *Schult. aust.* II *p.* 292. *Savi mat. med. t.* 3.
A. Dioscoridis et Plinii. *Zann. Ven. p.* 10. *t.* 236.
A. s. Bismalva. *Bauh. Hist.* II *p.* 954 icon.
Althea. *Matth. p.* 975 cum icone.
Nasce nei luoghi umidi, *specialmente intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

MALVA. (Malve) Malva.

Calice doppio, l'esterno di tre foglie. *Arilli* molti monospermi.

1. *M. sylvestris*. (Wald M.) M. selvatica.

Fusto dritto erbaceo, foglie cuoriformi 5-7-lobi, con lobi seghettati acuti, peduncoli e piccioli pelosi. *Pers. Synops.* II *p.* 254. *Röhl. germ.* II *p.* 374. *Schult. aust.* II *p.* 290.

M. vulgaris, flore majore, folio sinuato. *Zannich. Ven. p.* 179. *t.* 260. *Bauh. Hist.* II *p.* 949.

Nasce comunemente negli Orti *e luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Maggio *sino* Decembre, *ed è pianta che vive* uno, *e qualche volta* due anni.

2. *M. rotundifolia*. (Rundblättrige M.) M. a foglie rotonde.

Fusto giacente, foglie cordato-orbicolate 5-lobe, peduncoli fruttiferi declinati. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

M. vulgaris flore minore, folio rotundo. *Bauhinus Hist.* II *p.* 949 cum icone.

Trovasi, benchè di rado; fra' Rovinazzi *in* Chioggia *ed in* Santa Marta; *fiorisce nei mesi di* Giugno *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale, *e qualche volta* biennale.

È in tutte le sue parti minore della precedente. Fusto *un poco scabro peloso.* Foglie 5-7-*lobi, inegualmente dentate.* Fiori *piccioli, bianchi, ovvero rossigni.* Arilli 10-15 *un poco pelosi.*

HIBISCUS. (Ibisch) Ibisco.

Calice doppio, l'esteriore di molte foglie. *Stim.* 5. *Cassella* di cinque cavità e con molti semi.

H. Trionum. (Stunden I.) I. orario.

Foglie dentate, le superiori tripartite, lobi lanceolati, quello di mezzo lunghissimo, calici gonfii membranacei nervosi. *Pers. Syn.* II *p.* 258. *Röhl. germ.* II *p.* 376. *Schult. aust.* II *p.* 291.

Ketmia vescicaria vulgaris. *Zann. Ven. p.* 156. *t.* 167.

Alcea solisequa multis, Veneta. *Bauh. Historia* III *p.* 1068 icon.

Alcea africana sive vescicaria trifoliae glabre. *Barr. icon. t.* 472.

Nasce negli Orti *e nei luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

DIADELPHIA

HEXANDRIA.

FUMARIA. (Erdrauch) Fumosterno [Savi].

Calice di due foglie caduche. *Corolla* irregolare, spronata alla base. *Filamenti* 2 membranacei, ciascuno dei quali con tre antere. *Cassella* di una sola cavità, senza valve, con un solo seme.

1. *F. officinalis*. (Gemeiner E.) F. comune.

Fusto ramoso patente, frutti globosi retusi, foglie arcicomposte con foglioline cuneiformi-lanceolate

incise. *Pers. Synops.* II *p.* 278. *Röhl. german.* II *p.* 377. *Schult. aust.* II *p.* 306. *Savi mat. med. t.* 1.

F. officinarum et Dioscoridis. *Zann. Ven. p.* 104. *t.* 247.

F. vulgaris. *Bauh. Hist.* III *p.* 201.

Fumaria. *Matth. p.* 1217 cum icone.

Nasce comunemente negli Orti; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta annuale.

2. *F. parviflora*. (Kleinblüthiger E.) F. a fiori piccioli.

Fusto ramoso diffuso, frutti globosi acuti, foglie arcicomposte, con foglioline tripartite lineari scanalate. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

Nasce come la precedente.

OCTANDRIA

POLYGALA. (Kreutzblume) Poligallo.

Calice di cinque foglie, due delle quali in forma di *ale*, colorite. *Cassella* cordata a rovescio, di due cavità e con due *valve*.

1. *P. vulgaris*. (Gemeine H.) P. comune.

Fiori in grappoli crestati, ale calicine trinervi, ottuse, della lunghezza della corolla, fusti giacenti, foglie lineari lanceolate acute. *Pers. Synops.* II *p.* 271 *Röhl. german.* II *p.* 378. *Schult. aust.* II *p.* 307. *Savi mat. med. t.* 23.

P. latifolia ec. ec. *Zann. Ven. p.* 214. *t.* 38.

P. major. *Bauh. Hist.* III *p.* 387.

Onobrychis secunda. *Dalech. Hist. p.* 491 cum icone.

Nasce communemente in Campalto e Malghera; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

2. *P. monospeliaca.* (Französischer K.) P. di monpellier.

Fiori in grappoli, crestati, ale calicine reticolate acute, più lunghe della corolla, fusto dritto, foglie lineari-lanceolate acute. *Pers. l. c. Röhl. l. c.*

P. acutioribus foliis, monspeliaca. *Zann. Ven. p.* 215. *t.* 85.

P. vulgaris coloris obsoleti foliis angustissimis. *Bauh. Hist.* III *p.* 388.

Onobrychis tertia. *Dalech. Hist. p.* 491 cum icone.

Nasce nel Lido *nei luoghi* montuosi, sterili; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

DECANDRIA

GENISTA. (Ginster) Ginestra.

Calice bilabbrato, tubuloso, col labbro *superiore* bidentato, *l' inferiore* tridentato. *Vessillo* bisluugo piegato indietro. *Legume* subrotondo, compresso.

1. *G. tinctoria.* (Färber G.) G. dei tintori.

Foglie lanceolato-ovate glabre, rami tereti, striati,

dritti, inermi, legumi glabri. *Pers. Syn.* II *p.* 287. *Röhl. germ.* II *p.* 381. *Schult. aust.* II *p.* 312.

G. tinctoria. *Zann. Ven. p.* 108. *t.* 165.

Tinctorius flos. *Bauh. Hist.* I *p.* 391.

Nasce in Campalto *e* Malghera *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Settembre, *ed è* pianta fruticosa.

2. *G. germanica*. (Deutscher G.) G. germanica.

Spini composti, rami fioriferi inermi, foglie ovate irsute quasi picciolate, fiori in grappoli terminali, nudi, carena pubescente, legumi quasi falciformi villosi. *Pers. l. c. p.* 288. *Röhl. l. c. p.* 382. *Schult. l. c. p.* 314.

G. spartium. *Zann. Ven. p.* 108. *t.* 92.

G. aculeata foliosa. *Bauh. Hist.* I *p.* 399.

Nasce nei Treporti *nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta fruticosa.

ONONIS. (Hauchechel) Ononide.

Calice 5-partito con lacinie lineari. *Vessillo* striato. *Filamenti* connati. *Legume* gonfio sessile.

O. spinosa. (Dornige H.) O. spinoso.

Fiori ascellari, quasi binati, foglie terne, le superiori solitarie elittico-lanceolate seghettate, quasi glabre, rami spinosi, villosi. *Pers. Syn.* II *p.* 289. *Röhl. german.* II *p.* 382. *Schult. aust.* II *p.* 315. *Savi mat. med. t.* 9.

Anonis spinosa. *Zann. Ven. p.* 17. *t.* 210.

A. s. resta bovis vulgaris purpurea: *Bauh. Hist.* II *p.* 391 cum icone aliena.

β floribus albis.

Anon. flore albo. *Zann. Ven. p.* 17.

A. s. resta bovis vulgaris alba. *Bauh. Hist.* II *p.* 391.

Nasce comunemente nei luoghi montuosi *ed* erbosi, β *in* Chioggia; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Agosto, *ed è* pianta fruticosa.

ANTHYLLIS. (Wundklee) Antillide.

Calice gonfio. *Legume* subrotondo coperto dal calice con 1-3 *semi*.

A. Vulneraria. (Gemeines W.) A. da ferite.

Erbacea, foglie pennate ineguali, con foglioline lanceolate, capolino doppio. *Pers. Syn.* II *p.* 292. *Röhl. germ.* II *p.* 382. *Schult. aust.* II *p.* 317.

Vulneraria rustica. *Zann. Ven. p.* 281. *t.* 59. *Bauh. Hist.* II *p.* 362 icone.

Nasce nel Cavallino, Treporti *ed intorno* Malghera; *fiorisce nei mesi di* Aprile *sino* Agosto, *ed è* pianta perenne.

LATHYRUS. (Platterbse) Latiro.

Stilo piano, peloso di sopra, allargato in cima. *Calice* con le due lacinie superiori più corte.

1. *L. pratensis*. (Wiesen P.) L. dei prati.

Riccio semplicissimo con due foglie lanceolate, stipole saettiformi, peduncoli multiflori. *Pers. Syn.* II *p.* 305. *Röhl. germ.* II *p.* 388. *Schult. aust.* II *p.* 323.

L. luteus sylvestris dumetorum: *Bauhin. Histor.* II *p.* 304 cum icone.

Nasce nel luogo detto Aca bianca *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

Radice *serpeggiante*. Fusto *rampicante*, *ramoso*, *con angoli scabri*. Foglioline *elittico-lanceolate*. Peduncoli *con* 8-12 *fiori gialli*. Vessillo *con strie nere*. Legumi *dritti*. Schult. *l. c.*

2. *L. Aphaca*. (Blattlose P.) L. senza foglie.

Ricci senza foglie, stipole grandissime saettiformi-cordate, peduncoli con un solo fiore. *Pers. l. c. p.* 304. *Röhl. l. c. p.* 386. *Schult. l. c. p.* 322.

Aphaca. *Zann. Ven. p.* 19.

Vicia quae Pitine anguillarae. *Bauh. Hist.* II *p.* 316 icon. *p.* 317.

Nasce negli Orti *e nei luoghi* coltivati, *specialmente nell' Isola detta* S. Giacomo del Paludo; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

VICIA. (Wicke) Veccia.

Stimma trasversalmente peloso. *Calice* di sopra smarginato bidentato, dalla parte inferiore con tre denti retti lunghi. *Vessillo* smarginato.

1. *V. polyphylla*. (Vielblättrige W.) V. a molte foglie.

Peduncoli con molti fiori, più lunghi delle foglie, fiori imbricati, foglioline lineari-lanceolate acute, pelose, stipole semisaettiformi lanceolate, interis-

sime: *Persoon Synops.* II *p.* 306. *Schult. aust.* II *p.* 326.

Nasce in Chioggia *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

Fusti *giacenti tetragono-ancipiti*. Piccioli *con* 6-10 *paja di foglioline patenti lineari*. Peduncoli *eretti con fiori unilaterali nutanti*. Calice *violaceo obliquamente* 5-*dentato, con denti lesiniformi, con li due superiori più corti*. Vessillo *violaceo profondamente smarginato*. Carena *smarginata nella cima, lateralmente con una macchia violacea*. Ale *quasi della lunghezza del vessillo, celesti*. Legumi *bislungo-ovati nitidi nudi con* 3-6 *semi*. Schult. *l. c.*

2. *V. Cracca*. (Vogel W.) V. uccellaria.

Peduncoli con molti fiori più lunghi delle foglie, fiori imbricati, foglioline lanceolate ottuse. Stipole semisaettiformi lineari-lesiniformi interissime. *Pers. Syn. l. c. Röhl. germ.* II *p.* 390. *Schult. l. c.*

V. multiflora. *Zann. Ven. p.* 276.

V. multiflora perennis nemorensis s. dumetorum. *Bauh. Hist.* II *p.* 314.

Nasce nei Prati *ed appresso le* Siepi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

3. *V. sativa*. (Futter W.) V. coltivata.

Legumi quasi sessili e quasi binati dritti, foglie cuneiformi retuse, stipole incisodentate macchiate. *Pers. Syn.*

V. vulgaris sativa. *Bauh. Hist.* III *p.* 310.

Nasce fra le Biade *in* Campalto *e nel luogo detto* Monte dell'Oro; *fiorisce nei mesi di* Maggio e Giugno, *ed è* pianta annuale.

4. *V. angustifolia*. (Schmalblättrige W.) V. a foglie anguste.

Legumi sessili quasi solitarii patenti glabri, foglioline inferiori ovate, retuse, smarginate, le superiori lineari, interissime nella cima, stipole dentate, semi globosi. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 331.

Nasce come la precedente.

CYTISUS. (Geisklee) Citiso.

Calice bilabbiato, col labbro superiore bidentato: *Carena* eretta. *Legume* assottigliato alla base, compresso.

C. purpureus. (Rother G.) C. purpureo.

Fiori ascellari solitarii peduncolati, fusti giacenti, foglioline ovate a rovescio repande, legumi lineari un poco repandi. *Pers. Syn.* II *p.* 310. *Röhling germ.* II *p.* 394. *Schult. aust.* II *p.* 381.

C. praecox spicatus rubello flore. *Zann. Ven. p.* 83, *t.* 10. *fig.* 2.

Nasce nel luogo detto Cortelazzo; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta fruticosa.

LIQUIRITIA. (Süssholtz) Regolizia.

Calice tubuloso eguale 5-partito. *Vessillo* eretto piegato. *Ale* patenti. *Carena* bifida. *Legume* bislungo glabro con 3-4 *semi*.

L. officinalis. (Gemeines S.) R. comune.
L. fogliol. impari petiolate. *Pers. Syn.* II *p.* 313.
Glycirhyza glabra. *L. Röhl. germ.* II *p.* 397. *Schult. aust.* II *p.* 366.
Glyc. siliquosa sive germanica. *Zann. Ven. p.* 115. *t.* 160.
Gl. repente radice. *Bauh. Hist.* II *p.* 328.
Glicirrhiza. *Matth. p.* 688 icone.
Nasce comunemente nel luogo detto San Giuliano *vicino* Malghera, *e non lungi da* Malamocco *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

CORONILLA. (Peltschen) Coronilla.
Calice bilabbiato. *Petali* unguiculati. *Lomento* terete articolato.

C. varia. (Bunte P.) C. varia.
Erbacea, foglioline molte; ovate a rovescio, lanceolate glabre, lomenti dritti eretti. *Pers. Syn.* II *p.* 314. *Röhl. germ.* II *p.* 412. *Schult. aust.* II *p.* 370.
Nasce nel Cavallino *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.
Fusto *tubuloso angolato striato giacente*. Piccioli *con* 15-21 *foglie elittiche*, ovate *a rovescio, ottuse mucronate*. Ombrelle *con peduncoli lunghissimi, con* 13-30 *fiori rossastri*.

HIPPOCREPIS. (Pferdehuf) Sferracavallo.
Lomento compresso, con una sutura più volte smarginata, curvo.

H. comosa. (Zopfförmiger P.) S. comune:
Legumi peduncolati conferti arcuati, con il margine esterno repando. *Pers. Syn.* II *p.* 315. *Röhl. germ.* II *p.* 411. *Schult. aust. p.* 371.
Ferum equinum germanicum Siliquis in summitate. *Zann. Ven. p.* 100. *t.* 72.
Ornithopodio affinis vel potius Solaee vel ferro equino herbae. *Bauhin. Hist.* II, *p.* 348.
Nasce abbondevolmente nei luoghi arenosi *nei* Treporti; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Agosto, *ed* è pianta perenne.

GALEGA. (Geisraute) Galega.
Calice 5-dentato con denti quasi eguali lesiniformi. *Legumi* lunghi tereti torulosi.

G. officinalis. (Gemeine G.) G. officinale:
Foglie inegualmente pennate, con foglioline lanceolate mucronate glabre, stipole saettiformi. *Pers. Syn.* II *p.* 330. *Schult. aust.* II *p.* 383.
G. vulgaris. *Zann. Ven. p.* 106. *t.* 248.
Galega. *Bauh. Hist.* II *p.* 342 icon.
G. ovvero Capraria. *Matth. p.* 779 icon.
Nasce intorno Malghera *nei* Prati umidi *ed appresso i* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

ASTRAGALUS. (Traganth) Astragalo.
Carena ottusa. *Legume* di due cavità con la sutura inferiore piegata in dentro.

A. glyciphyllos. (Süssholzblättriger T.) A. a foglie di Regolizia.

Fusto giacente, foglioline glabre ovate, mucronate, ottuse, stipole ovato-lanceolate, grappoli peduncolati più brevi delle foglie, legumi arcuati quasi triquetri. *Pers. Syn.* II *p.* 338. *Röhl. german.* II *p.* 398. *Schult. aust.* II *p.* 337.

Astragalus luteus perennis. *Zann. Ven. p.* 31.

Foenum graecum sylvestre. *Bauh. Hist. p.* 330.

Nasce nel Lido, Campalto *e* Malamocco *nei luoghi* secchi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

MELILOTUS. (Steinklee) Meliloto.

Calice tubuloso 5-dentato. *Carena* semplice più corta delle ale e del vessillo. *Legume* più lungo del calice, rugoso. *Fiori* in grappoli.

1. *M. officinalis*. (Meliloten S.) M. officinale.

Legumi nudi con due semi nudi, un poco rugosi, ovati, un poco compressi acuti. Stipole lesiniformi. Fusto dritto, carena ed ale della lunghezza del vessillo. *Pers. Syn.* II *p.* 348. *Röhl. germ.* II *p.* 402. *Schult. aust.* II *p.* 345.

Trifol. odoratum s. melilotus. *Bauh. Hist.* II *p.* 370.

Nasce comunemente in Campalto *ed intorno* Malghera *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta biennale.

2. *M. vulgaris*. (Gemeiner S.) M. volgare.

Legumi nudi, con un solo seme, rugosi, ovati a

rovescio, acuti, stipole setacee, fusto dritto. Ale più lunghe della carena e più corte del vessillo. *Röhl. l. c. Schult. l. c.*

M. officinalis β. *L. Pers. l. c.*

M. alba maritima. *Zann. Ven. p.* 183 *t.* 104.

Nasce come la precedente.

3. *M. Kochiana*. (Kochs S.) M. Cochiano.

Legumi nudi, con due semi, quasi glabri, compressi, acuti, stipole dentate, fusto ascendente, ale della lunghezza della carena e più corte del vessillo. *Röhl. l. c. p.* 405. *Schult. l. c. p.* 346.

Nasce nei luoghi umidi, *specialmente intorno* Brondolo; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta biennale.

TRIFOLIUM. (Klee) Trifoglio.

Fiori in capolini. *Legume* coperto dal calice, evalve, con 2-4 semi,

Calice *glabro*.

1. *T. hybridum*. (Bastard K.) T. ibrido.

Fiori in capolini umbellati, legumi con 2-4 semi, denti calicini quasi eguali, fogliolina ovato-bislunghe, smarginate, seghettate, fusto ascendente. *Pers. Syn.* II *p.* 348. *Röhl. germ.* II *p.* 405. *Schult. aust.* II *p.* 349.

T. elegans. *Savi obs. p* 92. [Schult.]

Nasce nel Lido, *e specialmente in* Chioggia *nei luoghi* erbosi *e nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

2. *T. repens*. (Kriechender K.) T. serpeggiante.
Fiori in capolini umbellati, legumi con 3-4 semi, denti superiori del calice più corti, foglioline ovato bislunghe, smarginate, seghettate, fusto serpeggiante. *Pers. Syn. l. c. p.* 349. *Schult. loc. cit. p.* 350. *Röhl. l. c. p.* 404. *Savi obs. p.* 86.
T. pratense album. *Zann. Ven. p.* 265.
T. pratense flore albo minus, et foemina glabrum. *Bauh. Hist.* II *p.* 380.
Nasce comunemente nei luoghi erbosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *sino* Settembre, *ed è* pianta perenne.

Calici *villosi*.

3. *T. pratense*. (Wiesen K.) T. dei prati.
Spighe unite ovate, quasi doppie, cinte da due stipole opposte membranacee, calice col dente infimo, più corto del tubo della corolla monopetala, ineguale, stipole restate, foglioline ovali-smarginate interissime macchiate, fusto ascendente. *Persoon l. c. p.* 350. *Röhl. l. c. p.* 405. *Schult. l. c. p.* 352. *Savi obs. p.* 49.
T. pratense flore monopetalo. *Zann. Ven. p.* 264. *t.* 185.
T. purpureum vulgare. *Bauh. Hist.* II *p.* 374.
Trifoglio dei prati. *Matth. p.* 883 icone.
Nasce come la precedente.

4. *T. angustifolium*. (Schmalblättriger K.) T. a foglie sottili.

Spighe villose conico-bislunghe, calice con denti setacei, quasi eguali, foglioline lineari-lanceolate acute, fusto dritto. *Pers. Syn. p.* 351. *Röhl. germ.* II *p.* 406. *Schult. aust.* II *p.* 357. *Savi obs. p* 58.

T. alopecurum angustifolium elatium. *Barrel. icon. t.* 699.

Nasce in Chioggia *nei luoghi* erbosi *ed* asciutti; *fiorisce il mese di* Giugno, *ed è* pianta annuale.

5. *T. arvensis*. (Acker K.) T. arvense.

Spighe villosissime quasi cilindriche, calice con denti setacei più lunghi della corolla, foglioline ovate a rovescio-lineari. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 358. *Savi obs. p.* 17.

T. arvense humile spicatum. *Zann. Venet. p.* 264. *t.* 147.

Lagopus vulgaris trifolius quorumdam. *Bauh. Hist.* II *p.* 377.

Lagop. vulgaris Fuchsi. *Dalech. Hist. Lugd. p.* 444.

Lagop. angustifolia minor erectior. *Barrel. ic. t.* 901.

Lagopo. *Matth. p.* 1036 icone.

Nasce come la precedente; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

Calici *gonfii ventricosi*.

6. *T. fragiferum*. (Erdbeeren K.) T. fragifero.

Capolini subrotondi, calici gonfii bidentati, richinati, fusti serpeggianti, foglioline ovate a rovescio, retuse. *Pers. l. c. Schult. l. c. p.* 361. *Röhl. l. c. p.* 408. *Savi obs. p.* 76.

T. fragiferum nostras, purpureum, folio oblongo. *Zann. Ven. p.* 266.

T. caule nudo glomerulis glabris. *I. Bauhin. Histor. p.* 379.

T. fragiferum minus oblongo capite italicum. *Barr. ic. t.* 851, *et* 852.

Nasce abbondevolmente intorno Malghera *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

Vessilli *piegati in dentro*.

7. *T. campestre*. (Feld K.) T. campestre.

Spighe ovate imbricate, vessillo persistente declinato, foglioline, ovate a rovescio, ottuse, quella di mezzo picciolata, fusto diffuso. *Persoon loc. cit. Röhl. l. c.*

T. procumbens. *Schult. l. c. p.* 364.

T. agrarium. *Savi obs. p.* 103.

Nasce in Chioggia *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

8. *T. agrarium*. (Goldfarbener K.) T. agrario.

Spighe ovali imbricate, vessilli persistenti piegati in dietro, calice con denti glabri, ineguali, foglioline lanceolate cuneate, con quella di mezzo sessile, stipole lanceolate, fusto dritto semplice. *Persoon l. c. Röhl. l. c. p.* 405. *Schult. aust. p.* 362. *Savi obs. p.* 108.

T. pratense luteum foemina, flore pulchriore s. lupulino? *Bauh. Hist.* II *p.* 381. (Savi)

Nasce in Campalto *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta annuale.

LOTUS. (Schotenklee) Loto.

Calice tubuloso. *Ale* conniventi longitudinalmente dal lato superiore. *Filamenti* cuneiformi. *Legume* bislungo terete, dritto.

1. *L. siliquosus*. (Wiesen S.) L. dei prati.

Legumi solitarii membranaceo-quadrangoli, fusti giacenti, foglie nella pagina inferiore pubescenti. *Pers. Syn.* II *p.* 353. *Röhl. germ. p.* 396.

L. pratensis ec. ec. *Zann. Ven. p.* 171. *t.* 164.

L. siliquosa lutea monspeliensis. *Bauhin. Histor.* II *p.* 359.

β *L. maritimus*. Foglie glabre. *Pers. l. c. Röhl. l. c.*

Nasce nei luoghi umidi, β salsi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *sino* Agosto, *ed è* pianta perenne.

2. *L. corniculatus*. (Gemeiner S.) L. comune.

Capolini depressi, fusti giacenti, legumi cilindrici patenti. *Pers. l. c. p.* 354. *Röhl. l. c. p.* 395. *Schult. l. c. p.* 384.

L. s. Melilotus pentaphyllos. *Zann. Venet. p.* 170. *t.* 280.

L. corniculata glabra major. *Bauh. Hist.* II *p.* 356.

Nasce nei luoghi umidi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

DORYCNIUM. (Halbklee) Doricnio.

Calice 5-dentato bilabbiato. *Filamenti* lesiniformi.

Stimma capitato. *Legume* un poco maggiore del calice, gonfio, con 1-2 semi.

D. fruticosum. (Strauchartiger H.) D. fruticoso.
Foglioline lineari lanceolate acute. *Pers. Synops.* II *p.* 354.
Lotus Dorycnium. *L. Sp. pl.*
Nasce in Campalto *e non lungi da* Cortelazzo *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta fruticosa.

MEDICAGO. (Schneckenklee) Medica.
Legume compresso avvolto in spira. *Carena* discosta dal vessillo.

1. *M. sativa*. (Luzerner S.) M. coltivata.
Peduncoli racemosi, legumi liscii spiralmente contorti, stipole interissime, foglie bislunghe dentate. *Pers. Syn.* II *p.* 356. *Röhl. germ.* II *p.* 414. *Schult. aust.* II *p.* 371.
Medica major erectior floribus purpurascentibus. *I. Bauh. Hist.* II *p.* 382. *Zann. Ven. p.* 181. *t.* 124.
Nasce comunemente nei Prati, *specialmente* in San Niccolò *di* Lido; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Ottobre, *ed è* pianta perenne.

2. *M. falcata*. (Sichel S.) M. falciforme.
Peduncoli racemosi, legumi contorto-falciformi pubescenti, foglioline cuneiformi smarginate, seghettate nella cima, fusto giacente. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 372.

Nasce intorno Malghera *e* Campalto *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

3. *M. Lupulina*. (Hopfenartiger S.) M. Lupolina.
Spighe ovali, legumi reniformi monospermi, fusti giacenti. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 373.
β foglie e fusto pubescenti.
Nasce comunemente in Campalto *e negli* Orti; β *intorno* Malghera *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta biennale.

4. *M. maculata*. (Gefleckter S.) M. macchiata.
Peduncoli 2-4 flori, legumi spirali compressi, aculei curvi, arcuati, foglie ovate a rovescio, dentate nella cima. *Pers. l. c. p.* 357.
Nasce nei luoghi montuosi *nel* Lido *ed in* Chioggia; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta annuale.
Fusti *giacenti, alla base ramosi, angolati, villosi*. Piccioli *lunghissimi, superiormente scanalati*. Foglioline *cordate a rovescio, glabre, con una macchia nera nel mezzo*. Stipole *dentate acuminate con denti acuti ineguali*. Peduncoli *ascellari con* 2-6 *fiori aurei*.

5. *M. coronata*. (Geckrönter S.) M. coronata.
Peduncoli con molti fiori, legumi spirali cilindrici, piani nelle due parti, pubescenti, aculei distichi, strettamente appoggiati lesiniformi, stipole dentate alla base, foglioline cordate a rovescio, dentate. *Pers. l. c.*

Medica coronata Cherleri parva. *Bauhin. Histor.* II *p.* 386 icon.

Nasce nel Lido *ed in* Chioggia *nei luoghi* asciutti; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta annuale.

6. *M. marina*. (Meerstrands S.) M. marino:

Tomentosa, peduncoli con molti fiori, legumi spirali subrotondi muricati, stipole indivise, foglie ovate a rovescio, interissime. *Pers. l. c. Röhling. germ.* II *p.* 413.

M. lutea gnaphalitea ec. ec. *Zann. Ven. p.* 181. *t.* 62.

Trifol. cochleatum marinum ec. ec. *Bauhin. Hist.* II *p.* 383.

Nasce abbondevolmente nei luoghi arenosi, *specialmente nel* Lido; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

7. *M. rigidula*. (Steifer S.) M. rigida.

Peduncoli con molti fiori, legumi spirali cilindrici, con spini conici dritti patenti, stipole dentate, foglioline ovate a rovescio, dentate. *Pers. loc. cit. p.* 358. *Röhl. germ.* II *p.* 413.

Medica hirsuta echinis rigidioribus. *Bauhin. Hist.* II *p.* 385. *Zann. Ven. p.* 182.

Nasce nel Lido *e nei* Treporti *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

M. minima β (Kleinster S.) M. minima.

M. (*polymorpha* λ *hirsuta*) Peduncoli con molti fio-

ri, legumi spirali con spini oncinati, stipole interissime, foglioline ovate a rovescio, dentate nella cima. *L. Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. aust.* II *p.* 375.

Medica echinata hirsuta. *Bauh. Hist.* II *p.* 386.

Nasce come la precedente.

POLYADELPHIA vedi POLYANDRIA

SYNGENESIA

AEQUALIS.

† *Semiflosculosi s. ligulati.*

TRAGOPOGON. (Bocksbart) Tragopogo, *Ricett.* nudo. *Calice* semplice di molte foglie. *Pappo* piumoso stipitato.

T. pratense. (Wiesen B.) T. dei prati.

Calici eguali al raggio della corolla, foglie intere drittissime. *Pers. Syn.* II *p.* 359. *Röhl. german.* II *p.* 431. *Schult. aust.* II *p.* 402.

T. flore luteo. *Bauh. Hist.* II *p.* 1058.

Nasce comunemente intorno Malghera *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta biennale.

SONCHUS. (Gänsedistel) Sonco.

Calice imbricato ventricoso. *Ricett.* nudo. *Pappo* peloso sessile,

1. *S. maritimus*. (Seerstrands G.) S. marino.
Peduncoli quasi solitarii terminali nudi, foglie lanceolate abbraccianti il fusto indivise, seghettate all'indietro con denti acuti. *Persoon. Synops.* II *p.* 362.
Nasce nei luoghi umidi *in* Campalto, Malghera, *e* Treporti: *ed in* Malamocco *appresso il* mare; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. *S. oleraceus*. (Gemüseartige G.) S. oleraceo.
Peduncoli quasi tomentosi umbellati, calice glabro, foglie dentate abbraccianti il fusto, intere e runcinate pennatofesse, semi dentellati nel margine. *Pers. Syn.* II *p.* 363. *Röhl. germ.* II *p.* 425. *Schult. aust.* II *p.* 451.
S. laevis minor, paucioribus laciniis. *Zann. Venet. p.* 250.
Nasce negli Orti; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Decembre, *ed è* annuale.

3. *S. asper*. (Scharfe G.) S. aspro.
Peduncoli quasi tomentosi umbellati, calice glabro, foglie dentate abbraccianti il fusto intere e runcinate, pennatofesse, semi striati glabri. *Röhl. germ.*
S. asper laciniatus et non laciniatus. *Zann. Ven. p.* 250. *t.* 196.

Nasce come la precedente.

LACTUCA. (Sallat) Lattuca.

Calice imbricato cilindrico, membranaceo nel margine. *Ricett.* nudo. *Pappo* semplice stipitato.

1. *L. Scariola*. (Wilder S.) L. selvatica:

Foglie verticali, con la carena aculeata, acute, saettiformi alla base, runcinato-pennatofesse. *Pers. Syn.* II *p.* 364. *Röhl. germ.* II *p.* 425. *Schult. aust.* II *p.* 424. Endivia major ec. ec. *Barrell. ic. t.* 135.

L. sylvestris s. Endivia multis dicta folio laciniato, dorso spinoso. *Bauh. Hist.* II *p.* 1003 icon.

Nasce abbondevolmente nei terreni *di* Santa Marta; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Agosto, *ed è* pianta annuale.

2. *L. saligna*. (Weidenblättriger S.) L. a foglie di salice.

Foglie con carena più o meno aculeata, le radicali lanceolate pennatofesse, quelle del fusto lineari, interissime, saettiformi. *Pers. Syn. l. c. p.* 365. *Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 425.

Endivia minor lactucina spinosa. *Barr. icon. t.* 136.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

CHONDRILLA. (Knorpelsalat) Condrilla:

Calice calicolato. *Ricett. nudo*. *Pappo* stipitato peloso. *Semi* muricati.

C. juncea. (Binsenartiger K.) C. giunciforme.
Foglie radicali runcinate, quelle del fusto lineari interissime. *Pers. Syn.* II *p.* 365. *Röhl. germ.* II *p.* 427. *Schult. aust.* II *p.* 421.
Ch. viminea. *Bauh. Hist.* II *p.* 1021 icon.
Nasce nel Lido *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta perenne.

LEONTODON. (Löwenzahn) Dente di leone.
Calice doppio. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* stipitato piumoso.

1. *L. Taraxacum*. (Gemeiner L.) D. comune.
Calice con le squamme esterne richinate, scapo con un solo fiore, foglie runcinate glabre, con lacinie lanceolate dentate. *Pers. Syn.* II *p.* 367. *Röhling germ.* II *p.* 428. *Schult. aust.* II *p.* 405.
Dens leonis latiore folio. *Zann. Ven. p.* 85.
Hedypnois sive Dens Leonis Fuchsi. *Bauh. Hist.* II *p.* 1035.
Hedypnois. *Fuchs Hist. p.* 681.
Nasce comunemente nei Prati *e fra* Sassi; *fiorisce nei mesi di* Marzo *sino* Novembre, *ed è* pianta perenne.

2. *L. palustre*. (Sumpf L.) D. paludoso.
Calice con le squamme esterne appoggiate, ovate, scapo con un solo fiore, foglie lanceolate sinuato-dentate, glabre. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 406 sub L. livid.
Nasce in Campalto *nei luoghi* erbosi *ed* umidi; *fio-*

risce nei mesi di Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

APARGIA. (Pfaffenröhrlein) Apargia.

Calice imbricato. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* sessile piumoso.

A. hastilis. (Glattes P.) A. glabra.

Scapo nudo con un solo fiore, glabro, striato, foglie lanceolate runcinato-dentate glabre. *Pers. Syn.* II *p.* 367. *Röhl. german.* II *p.* 429. *Schult. aust.* II *p.* 408.

Dens Leonis glaber angustiore et longiore folio flore minore. *Zann. Ven. p.* 87.

Nasce nel Cavallino *e* Treporti *nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Ottobre, *ed è* pianta perenne.

PICRIS. (Bitterkraut) Amaria.

Calice calicolato. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* piumoso quasi sessile. *Semi* striati trasversalmente.

P. hieracioides. (Habichtskrautartiges B.) A. comune.

Fusto dritto scabro, foglie lanceolate, dentate, abbraccianti il fusto, fiori corimbosi, peduncoli squammosi. *Pers. Syn.* II *p.* 370. *Röhl. germ.* II *p.* 430.

Hieracium asperum majore flore in agrorum limitibus. *Bauhinus Hist.* II *p.* 1029.

Nasce comunemente in Campalto, Fusina *e* Malghe-

ra *nei luoghi* montuosi *ed* asciutti; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

HIERACIUM. (Habichtskraut) Ieracio.

Calice ovato imbricato. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* semplice sessile.

1. *H. Pilosella.* (Gemeines H.) I. Pelosella.

Scapo nudo peloso, con un solo fiore, foglie ovate interissime, nella pagina inferiore tomentose, stoloni serpeggianti. *Pers. Syn.* II *p.* 371. *Röhl. germ.* II *p.* 418. *Schult. aust.* II *p.* 428.

Pilosella majori flore sive vulgaris repens. *Bauhin. Historia* II *p.* 1039 cum icone.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. *H. florentinum.* (Florentiner H.) I. fiorentino.

Scapo folioso, un poco glabro, con molti fiori corimbosi, peduncoli proprj divaricati, calici irti, foglie lanceolato-lineari interissime. *Pers. loc. cit. Röhl. l. c. p.* 419. *Schult. l. c. p.* 432.

Nasce come la precedente.

3. *H. cymosum.* (Vielblumis H.) I. cimoso.

Scapo quasi nudo, peloso alla base, multifloro, fiori quasi umbellati, foglie bislunghe, lanceolate intere. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

H. Pilosellae folio erectum majus. *Zann. Ven. p.* 130. *t.* 150. *fig.* 2.

Pilosella minori flore, hirsutior et elatior non repens. *Bauh. Hist.* II *p.* 1040.

Nasce nel Cavallino *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

CREPIS. (Pippau) Crepide.

Calice calicolato con squamme caduche. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* peloso stipitato.

1. *C. pulchra*. (Schöner P.) C. glutinosa. *Savi.*

Foglie radicali runcinate, quelle del fusto ovato-lanceolate saettiformi alla base, pannochia corimbosa divaricata nuda. Prenanthes hieracifolia. *Pers. Syn.*

Hieracium pulchrum. *Bauh. Hist.* II *p.* 1024 cum icone.

Nasce, benchè di rado, intorno Malghera; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

2. *C. foetida*. (Stinkender P.) C. fetida.

Foglie runcinato-pennatofesse irte, piccioli dentati, quelle della sommità alla base profondamente intagliate, calici ovati pelosi angolati. *Pers. Syn.* II *p.* 376. *Röhl. germ.* II *p.* 427 sub Wibelia. *Schult. aust.* II *p.* 416.

Nasce non lungi dagli Alboroni *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *sino* Agosto, *ed è* pianta annuale.

3. *C. virens:* (Grüner P.) C. verdastro:
Foglie glabre, le inferiori dentate, con denti distanti, le superiori quasi interisime, quasi saettiformi, fusto ramoso alla base, diffuso, calici pubescenti. *Pers. l. c. Röhl. l. c.* sub C. pinnatifida. *Schult. aust.* II *p.* 420.
Hierac. luteum hirsutum. *Bauh. Hist.* II *p.* 1024 cum icone.
Nasce in Campalto *e* Malghera *nei* Prati *e luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed* è pianta annuale.

HYPOCHAERIS. (Ferkelkraut) Ipochetide.
Calice quasi imbricato. *Ricettacolo* paleaceo. *Pappo* piumoso.

H. radicata. (Aestiger F.) I. ramosa.
Fusto ramoso liscio, foglie runcinate ottuse scabre, peduncoli squammosi. *Pers. Syn.* II *p.* 348. *Röhl. germ.* II *p.* 434. *Schult. aust.* II *p.* 401.
Hieracium dentis leonis folio. *Zann. Ven. p.* 141: *t.* 121.
Hier. macrocaulon junceum sive minus primum. *Bauh. Hist.* II *p.* 1031 icone.
Nasce nei Prati; *fiorisce nei mesi di* Giugno e Luglio, *ed è* pianta perenne.

LAPSANA. (Rainkohl) Lassana.
Calice quasi calicolato, con ciascuna squamma interna, scanalata. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* nessuno.

L. communis. (Gemeiner R.) L. comune.

Foglie ovate picciolate angolato-dentate, pedunculi tenui ramosissimi. *Pers. Syn.* II *p.* 348. *Röhl. germ.* II *p.* 416. *Schult. aust.* II *p.* 454.

Lampsana. *Zann. Ven. p.* 159.

Lapsana Dodonaei. *Bauh. Hist.* II *p.* 1028.

Nasce negli Orti *e nei luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

CICHORIUM. (Wegwarte) Cicorea.

Calice calicolato. *Ricettacolo* quasi paleaceo. *Pappo* polifillo paleaceo.

C. Intybus. (Gemeine W.) C. comune.

Fiori ascellari gemelli, quasi sessili, foglie runcinate. *L. Pers. Syn.* II *p.* 379. *Röhl. germ.* II *p.* 434. *Schult. aust.* II *p.* 399.

C sylvestre s. officinarum. *Zann. Ven. p.* 65.

C. sylvestre et sativum. *Bauhin. Hist.* II *p.* 1007 cum icone.

Cichorea sèlvatica. *Matth. p.* 532 icon.

β C alba. Fiori bianchi. *Pers. l. c.*

Nasce comunemente nei luoghi montuosi *e* sassosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

SCOLYMUS. (Golddistel) Scolimo.

Calice imbricato spinoso, circondato da foglioline spinose. *Ricettacolo* paleaceo. *Pappo* o.

S. aggregatus. (Gehäufter G.) S. ammucchiato.

Fiori ammucchiati, semi papposi.

S. hispanicus. *Pers. Syn.* II *p.* 380. *Savi Bot. Etrusc.*

S. chrysanthemos. *Zann. Ven. p.* 240. *t.* 175.

Spina lutea. *Bauh. Hist.* II *p.* 84.

Nasce in tutte le Spiaggie arenose, *e specialmente in quella del* Lido; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

†† *Floribus flosculosis.*

CARTHAMUS. (Saflor) Cartamo.

Calice imbricato con squamme subovato-fogliacee. *Ricettacolo* paleaceo-setoso. *Pappo* paleaceo.

C. lanatus. (Wolliger S.) C. lanuto.

Fusto lanoso, foglie inferiori pennatofesse, dentate, quelle della sommità abbraccianti il fusto pennatofesso-dentate spinose. *Pers. Syn.* II *p.* 380. *Röhl. germ.* II *p.* 435.

Trovasi, benchè di rado, in Campalto *nei luoghi* asciutti; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

ARCTIUM. (Klette) Personata.

Calice globoso con squamme uncinate. *Ricettacolo* paleaceo. *Pappo* setoso-paleaceo.

A. glabrum. (Glatte K.) P. glabra.

Foglie del fusto cuoriformi picciolate, dentellate, calici glabri. A. Lappa. *L. Pers. Syn.* II *p.* 383. *Röhl. germ.* II *p.* 456. *Schult. aust.* II *p.* 457.

Lappa major s. Arctium Dioscoridis. *Zann. Venet. p.* 160. *t.* 257.

Personata s. Lappa major aut Bardana: *Bauh. Hist.* II *p.* 570 icon.

Personata maggiore. *Matth. p.* 1213.

Nasce in Campalto *e* Malghera *nei luoghi* asciutti *ed* umidi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta biennale.

CARDIUS: (Distel) Cardo.

Calice imbricato, ventricoso, con squamme spinose: *Ricettacolo* villoso. *Pappo* capillare.

1. *C. nutans.* (Hängende D.) C. pendente:

Foglie scorrenti lanceolate sinuate spinose, fiori solitarii richinati, calice con squamme patenti. *Pers. Synops.* II *p.* 384. *Röhl. germ.* II *p.* 437. *Schult. aust.* II *p.* 467.

C. nutans. *Bauh. Hist.* III *p.* 5[illegible]. ic. *Zann. Ven. p.* 50. *t.* 162.

Nasce nei Rovinazzi, *specialmente nel* Lido *ed in* Fusina; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta bienne.

2. *C. acanthoides.* (Krebsdistelartige D.) C. acantoide.

Foglie scorrenti sinuato-spinose, calici globosi quasi peduncolati, squamme lineari ritorte. *Pers. l. c. p.* 385.

C. acauthoides. *Bauh. Histor.* III p. 56.

Nasce nel Lido *nei luoghi* arenosi *ed* asciutti; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale *e* biennale.

3. *C. Marianus*; (Marien D.) C. macchiato.

Foglie sessili abbraccianti il fusto, astato-pennatofesse spinose, calici afilli, con spini scanalati, raddoppiato-spinosi. *Pers. l. c. p.* 386. *Röhl. l. c. p.* 439. *Schult. l. c. p.* 474.

C. albis maculis notatus vulgaris. *Zann. Ven. p.* 51.

C. marianus sive lacteis maculis notatus. *Bauhinus Hist.* III *p.* 52 cum icone.

Nasce nel Lido *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

CNICUS. (Kratzkraut) Cnico.

Calice imbricato ventricoso, con squamme spinose; *Ricettacolo* villoso. *Pappo* piumoso.

1. *C. lanceolatus*. (Lanzettblättriges K.) C. lanceolato.

Foglie scorrenti ispide pennatofasse, con lacinie bilobe divaricate spinose, calici ovati aranoideo-pubescenti, squamme lanceolate, spinose patenti. *Pers. Syn.* II *p.* 387. *Röhl. germ.* II *p.* 439. *Schult. aust.* II *p.* 459.

C. lanceatus latifolius. *Zann. Ven. p.* 50.

C. lanceolatus s. sylvestris Dodonaei. *Bauh. Hist.* III *p.* 58 cum icone.

Nasce nei Rovinazzi *e nei luoghi* asciutti; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta biennale.

2. *C. arvensis*. (Acker K.) C. dei campi.

Foglie sessili pennatofesse spinose, fusto panicolato,

calici ovati spinosi: *Pers. Syn.* II *p.* 388. *Röhl. l. c. p.* 442. *Schult. l. c. p.* 467.

Carduus serpens laevicaulis. *Bauh. Hist.* III *p.* 59 cum icone.

Nasce come la precedente, *e specialmente nei* terreni *di* Santa Marta; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

SERRATULA. (Scharte) Serratola:

Calice imbricato cilindrico inerme. *Ricettacolo* paleaceo o peloso. *Pappo* peloso rigido, persistente.

S. tinctoria: (Färber S.) S. dei tintori:

Foglie lirato-pennatofesse, colla pennola terminale granda, acutamente seghettate, fiori in corimbi fastigiati. *Pers. Syn.* II *p.* 118. *Röhl. l. c. p.* 435. *Schult. aust.* II *p.* 454.

Serratula. *Bauh. Hist.* III *p.* 23 icon.

Nasce abbondevolmente nei luoghi umidi *nei* Treporti *e nel* Cavallino; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta perenne.

BIDENS. (Zweizahn) Bidente.

Calice quasi eguale calicolato, qualche volta pochi semiflosculi nel raggio. *Ricettacolo* paleaceo piano. *Pappo* con due reste scabre. *Semi* tetragoni.

B. tripartita. Dreitheiliger Z.) B. tripartito.

Fiori discoidei, calice esterno maggiore dei fiori, semi dritti, foglie tripartite, con lacinie lanceolate,

dentate. *Pers. Syn.* II *p.* 393. *Röhl. german.* II *p.* 443. *Schult. aust.* II *p.* 476.

B. foliis tripartito divisis. *Zann. Ven. p.* 38.

Verbesina s. Cannabina aquatica, flore minus pulchro elatior ac magis frequens. *Bauh. Hist.* II *p.* 1073.

Nasce comunemente intorno Malghera *nei luoghi* acquosi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta annuale.

EUPATORIUM. (Wasserdost) Eupatorio.

Calice imbricato bislungo. *Stilo* lungo semibifido. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* peloso o scabro.

1. *E. canabinum*. (Hanfartiger W.) E. canapino.

Foglie picciolate tripartite, con lacinie lanceolate seghettate, delle quali quella di mezzo più lunga, calice con 5-6 fiori. *Pers. Synops.* II *p.* 400. *Röhl. germ.* II *p.* 443. *Schult. aust.* II *p.* 477.

E. canabinum. *Zann. Ven. p.* 97. *t.* 7.

E. adulterinum. *Bauh. Hist.* II *p.* 1065.

Eupatorio comune. *Matth. p.* 1069.

Nasce nei luoghi acquosi *ed* umidi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

CHRYSOCOMA. (Goldhaar) Comaurea.

Calice imbricato emisferico. *Stilo* appena più lungo dei fioretti. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* semplice.

C. Lynosiris. (Deutsches G.) C. a foglie di lino.

Erbacea, foglie lineari glabre, calici lassi. *Pers. Syn.* II *p.* 405. *Röhl. germ.* II *p.* 443. *Schult. aust.* II *p.* 477.

Conyza linariaefolia ec. ec. *Zann. Ven. p.* 73. *t.* 71.

Heliochrysos Tragi sive Linaria tertia. *Bauh. Hist.* III *p.* 151 cum icone.

Nasce nei Treporti *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta perenne.

Fusto *alto* 2-3 *piedi, dritto, duro, un poco scabro, quasi semplice.* Foglie *patenti un poco, scabre.* Fiori *terminali corimbosi aurei.* Peduncoli *laterali, più alti del fusto, fogliosi, ingrossati in cima.* Calice *con foglioline lineari-setacee.*

SUPERFLUA

TANACETUM. (Rheinfarn) Tanaceto.

Calice imbricato emisferico con squamme acuminate. *Corollette* del raggio obsoletamente trifide. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* quasi marginato.

1. *T. vulgare.* (Gemeiner R.) T. volgare.

Foglie bipennate, con foglioline intagliate seghettate. *Pers. Syn.* II *p.* 409. *Röhl. germ.* II *p.* 444. *Schult. aust.* II *p.* 487.

T. vulgare luteum. *Zann. Ven. p.* 257. *t.* 283.

T. vulgare flore luteo. *Bauh. Hist.* III *p.* 131.

Nasce in Cortelazzo *ed in* Chioggia *nelle* Strade; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

ARTEMISIA. (Beyfuss) Artemisia.

Calice imbricato, con squamme rotondate conni-

venti. *Corolla* del raggio o. *Picettacolo* quasi nudo. *Pappo* nessuno.

A. Abrotanum. (Stabwurz B.) A. abrotano.
Fruticosa, fusto drittissimo, foglie inferiori bipennate, le superiori pennate sottili, calici pubescenti emisferici. *Pers. Syn.* II *p.* 409.
Trovasi, benchè di rado, nei Treporti *e nel* Cavallino *nei luoghi* asciutti; *fiorisce nei mesi* di Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta fruticosa.

2. *A. paniculata*. (Rispenartiger B.) A. panicolata.
Fusti numerosi suffruticosi dritti, foglie moltofesse setacee, calici glabri emisferici. *Pers. Syn. l. c.*
Ab. mas angustifolium majus. *Zannich. Ven. p.* 1. *tab.* 30.
Ab. vulgare. *Bauh. Hist.* III *p.* 192 cum icone.
β Ab. mas angustifolium minus. *Zann. Ven. p.* 2.
Abrot. cum pulchris corimbis. *Bauh. Hist.* III *p.* 194.
Nasce nei Treporti *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta fruticosa.

3. *A. campestris*. (Feld B.) A. dei campi.
Foglie del fusto setacee, pennate glabre, le radicali pennate, con lacinie trifide incane, fusto giacente vergato ramoso, fiori ovati peduncolati. *Pers. loc. cit. p.* 410. *Röhl. germ.* II *p.* 448. *Schult. aust.* II *p.* 482.
Abr. campestre caulibus rubentibus. *Zannich. Ven. p.* 3.

Nasce non lungi da Brondolo *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta perenne.

Ricettacolo *nudo*. *Pers. l. c.*

4. *A. vulgaris*. (Gemeiner B.) A. volgare.

Foglie pennatofesse piane intagliate, con la pagina inferiore tomentosa, grappoli semplici ritorti, calici tomentosi, raggio dei fiori 5-floro. *Pers. l. c. p.* 413; *Röhl. loc. cit. p.* 449. *Schult. aust.* II *p.* 485.

A. caule et flore purpurascentibus. *Zann. Ven. p.* 21. *t.* 237.

A. vulgaris. *Bauh. Hist.* III *p.* 184.

Nasce comunemente nei Rovinazzi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed* è pianta perenne.

5. *A. caerulescens*. (Bläulicher B.) A. cerulea.

Foglie incane lanceolate interissime, le radicali intagliate, fiori bislunghi peduncolati nutanti. *Pers. l. c. Röhl. l. c.*

Seriphium marinum lavendulae folio. *Zann. Ven. p.* 245. *t.* 156.

Absynthium marinum latifolium Mathioli. *Bauhin. Hist.* III *p.* 174 icon.

Assenzo marino. *Matth. p.* 725 icon.

β Più cerulea, con rami richinati. *Nob.*

Nasce comunemente nei terreni salsi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed* è pianta perenne.

GNAPHALIUM. (Ruhrkraut) Gnafalio.

Calice imbricato, con le squamme marginali roton-

date, scariose, nitide, colorate. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* peloso o piumoso.

G. luteo-album. (Gelblichweisses R.) G. giallo-bianco.
Erbacea, foglie abbraccianti mezzo fusto linear-lanceolate, quasi ondate come il fusto, tomentose. *Pers. Syn.* II *p.* 420. *Röhl. germ.* II *p.* 445. *Schult. aust. p.* 488.
Chrisocome citrina latifolia italica: *Barrel. ic. p.* 88. *t.* 367.
Gnaphal. ad stoechadem citrinam accedens. *Bauhin. Hist.* III *p.* 160.
Nasce intorno Chioggia *nei luoghi* arenosi; *fiorisce il mese di* Luglio, *ed è* pianta annuale.

CONYZA. (Dürrwurz) Conisa.
Calice imbricato con squamme patenti. *Corolle* del raggio trifide. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* semplice capillare.

C. squarrosa. (Gemeine D.) C. volgare.
Calici squarrosi, fusto erbaceo corimboso, foglie lanceolate acute seghettate scabre. *Pers. Syn.* II *p.* 426. *Röhl. german.* II *p.* 444. *Schult. aust.* II *p.* 487.
Conyza major vulgaris. *Zann. Ven. p.* 72. *t.* 245.
C. major Matthioli, Baccharis quibusdam. *Bauhin. Hist.* II *p.* 1050.
Nasce nei luoghi asciutti *e nei* muri; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta biennale.

ERIGERON. (Berufkraut) Erigero.

Corolla con li fioretti del raggio lineari sottilissimi. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* peloso.

1. *E. canadense*. (Gemeines B.) E. di canadà.

Fusto ramosissimo irto, fiori in pannocchia, foglie lineari-lanceolate ciliate. *Pers. Synops.* II *p.* 430. *Röhl. germ.* II *p.* 454. *Schult. aust.* II *p.* 510.

Virga aurea virginiana annua. *Zann. Ven. p.* 279.

Nasce in ogni luogo nella città; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta annuale.

2. *E. diversifolium*. (Verschiedenblättriges B.) E. diversifoglio.

Foglie inferiori ovate seghettate, le superiori lanceolate un poco pelose, calici emisferici, con lacinie quasi eguali strigose. E. annuum: *Pers. l. c. p.* 431.

Aster annuus. *Röhl. germ. Schult. aust.*

Nasce intorno Malghera *e nell'* Aca bianca; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale *e* biennale.

3. *E. acre*. (Scharfes B.) E. scabro.

Peduncoli alterni uniflori, foglie lineari-lanceolate, fusto ramoso peloso. *Pers. loc. cit. Röhl. loc. cit. Schult. l. c.*

Aster arvensis caeruleus acris. *Zann. Venet. p.* 27. *t.* 10. *f.* 1.

Senecio s. Erigeron caeruleus, aliis. Conyza caerulea. *Bauh. Hist.* II *p.* 104.

Nasce in Cortelazzo *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* annuale *e* perenne.

SENECIO. (Kreutzkraut) Senecio.

Calice cilindrico calicolato, con squamme sfaccellate nella cima. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* semplice.

1. *S. vulgaris*. (Gemeines K.) S. comune:

Corollette nude, foglie abbraccianti il fusto pennatofesse, dentate, fiori in pannocchie corimbose: *Pers. Syn.* II *p.* 433. *Röhl. germ.* II *p.* 456. *Schult. aust.* II *p.* 518.

S. minor vulgaris. *Zann. Ven. p.* 244.

S. vulgarius sive Erigeron. *Bauh. Hist.* II *p.* 1041 sine icone.

Nasce comunemente negli Orti *e luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Gennaro *sino* Decembre, *ed è* pianta annuale.

2. *S. Jacobaea*. (Jacobs K.) S. giacomeo:

Raggio patente, foglie lirato-bipennatofesse divaricate, dentate glabre, fusto dritto. *Pers. l. c. p.* 435. *Röhl. l. c. p.* 458. *Schult. aust. p.* 523.

Jacobaea vulgaris. *Bauh. Hist.* II *p.* 1057.

Nasce comunemente intorno Malghera *nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

3. *S. aquaticus*. (Wasser K.) S. acquatico.

Raggio patente, fioretti elittici, foglie inferiori ova-

té a rovescio intere, quelle del fusto lirate seghettate, semi glabri. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. loc. cit.*

Jacobaea latifolia: *Bauh. Hist.* II *p.* 1057.

Nasce intorno Malghera *nei* Prati acquosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

4. *S. paludosus.* (Sumpf K.) S. dei paludi:

Corollette raggianti, foglie abbraccianti mezzo fusto, lanceolate, acutamente seghettate, con la pagina inferiore villosa, corimbo terminale divaricato, fusto drittissimo. *Pers. l. c. p.* 436. *Röhl. l. c. Schult. l. c.*

Jacobaea palustris altissima, foliis serratis. *Zannich. Ven. p.* 146. *t.* 131.

Virgae auraeae sive Solidagini angustifoliae affinis, Lingua avis Dalechampii. *Bauh. Hist.* II *p.* 1063 cum icone.

Nasce comunemente intorno Mestre *nei* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

ASTER. (Sternblume) Astro.

Calice imbricato con le squamme inferiori patenti. *Corolla* raggi più di dieci. *Ricettacolo* nudo scrobiculato. *Pappo* semplice.

A. Tripolium. (Meerstrands S.) A. marino:

Foglie lineari-lanceolate carnose triplinervi, le inferiori quasi seghettate nella cima, fusto glabro co-

rimboso, calici eguali. *Pers. Syn.* II *p.* 445. *Röhl. germ.* II *p.* 462. *Schult. aust.* II *p.* 532.

A. maritimus palustris caeruleus salicis folio. *Zann. Ven. p.* 26. *t.* 2.

Tripolium majus. *Bauh. Hist.* II *p.* 1064.

Nasce comunemente nei luoghi inondati dall'acqua salsa; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta perenne.

INULA: (Alant) Enola.

Calice squarroso ovvero imbricato. *Corolla* con raggi numerosi. *Antere* finite inferiormente in due sete. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* semplice.

1. *I. Helenium*. (Wahrer A.) E. Elenio.

Foglie abbraccianti il fusto rugose, nella pagina inferiore tomentose, calice con squamme ovate. *Pers. Syn.* II *p.* 450. *Röhl. germ.* II *p.* 463. *Schult. aust.* II *p.* 504. *Savi mat. med. t.* 6.

Elenio. *Matth. p.* 79.

Nasce in San Niccolò *di* Lido *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

2. *I. brittanica*. (Wiesen A.) E. dei prati.

Foglie abbraccianti il fusto lanceolate, seghettate alla base, nella pagina inferiore pelose, fusto corimboso villoso, rami laterali più lunghi del fusto. *Pers. l. c. p.* 450. *Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 507.

Aster palustris luteus, folio longiori lanuginoso. *Zann. Ven. p.* 28. *t.* 155. *f.* 2.

Ast. tertius pannonicus clusii, luteus, folio hirsuto salicis. *Bauh. Hist.* II *p.* 1047.

Brittanica vera. *Dalech. Hist. p.* 1082.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi* acquosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

3. *I. dysenterica*. (Ruhr A.) E. disenterica:

Foglie abbraccianti il fusto cordato-bislunghe quasi tomentose, fusto villoso panicolato, calice con squamme setacee. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 506.

Aster pratensis autumnalis conyze folio. *Zannichel. Ven. p.* 29. *t.* 141.

Conyza media Matthioli, flore magno luteo, humidis locis proveniens: *Bauh. Hist.* II *p.* 1050 cum icone:

Coniza mezzana. *Matth. p.* 920 icon.

Nasce come la precedente.

4. *I. salicina*. (Weidenblattriger A.) E. a foglie di salice.

Foglie lanceolate ritorte seghettato-scabre, rami angolati, fiori inferiori più alti: *Pers. l. c. p.* 451. *Röhl. l. c. p.* 464. *Schult. l. c. p.* 507.

Nasce in Campalto *nei luoghi* montuosi *ed* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne:

5. *I. ensifolia*. (Nervigter A.) E. nervosa:

Foglie sessili lineari acuminate nervose, glabre,

sparse, fusto semplicissimo unifloro. *Pers. loc. cit. Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 509.

Aster luteus linarie rigido, glabro folio. *Zannich. Ven. p.* 28. *t.* 27.

Nasce nel Cavallino *e* Cortelazzo *nei luoghi* arenosi *ed* asciutti; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

6. *I. crithmifolia*. (Dichblättriger A.) E. a foglie crasse.

Foglie lineari camose tricuspidate. *Pers. l. c. Röhl. loc. cit.*

Aster maritimus, folio tereti, crasso, tridentato. *Zann. Ven. p.* 29. *t.* 23.

Critmum marinum tertium Matthioli, flore luteo Buphtalmi. *Bauh. Hist.* III *p.* 106 cum icone.

Critamo III. *Matth. p.* 520 cum icone.

Nasce nei luoghi inondati dall'acqua salsa *detti volgarmente* Barene, *ed appresso il* mare *nei luoghi* sassosi *non lungi da* Malamocco; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta fruticosa.

7. *I. viscosa*. (Klebriger A.) E. vischiosa.

Foglie sessili, richinate alla base lanceolate lunghe, fusto vergato, peloso, vischioso, peduncoli ascellari unifiori foliosi. *Pers. l. c. p.* 452. *Schult. l. c. p.* 507.

Erigeron viscosum. *L. Röhl. germ.* II *p.* 454.

Virga aurea major, foliis glutinosis, graveolentibus. *Zann. Ven. p.* 278. *t.* 103.

Conyza major monspeliensis odorata. *Bauh. Hist.* II *p.* 1053 cum fig. mala.

Nasce nei Treporti *e nel* Cavallino *nei luoghi* arenosi *ed* asciutti; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

TUSSILAGO. (Huflattig) Farfara.

Calice semplice con squamme eguali, quasi membranacee. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* semplice sessile.

T. Farfara. (Gemeiner H.) F. comune.

Scapo unifloro, quasi nudo, bratteato, corollette raggianti, foglie cuoriformi angolate, dentate, pagina inferiore tomentosa. *Pers. Synops.* II *p.* 455. *Röhl. germ.* II *p.* 459. *Schult. aust.* II *p.* 528.

T. vulgaris. *Zann. Ven. p.* 267. *t.* 266.

Tussilago. *Bauh. Hist.* III *p.* 563.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta perenne.

BELLIS. (Massliebe) Bellide.

Calice emisferico con squamme eguali. *Semi* ovati a rovescio. *Ricettacolo* nudo conico. *Pappo* nessuno.

B. perennis. (Gemeine M.) B. perenne.

Scapo nudo con un solo fiore, foglie ovate a rovescio, intaccate, vellose. *Pers. Syn.* II *p.* 459. *Röhl. germ.* II *p.* 451. *Schult. aust.* II *p.* 495.

B. sylvestris minor. *Zann. Ven. p.* 35. *t.* 206. *f.* 1.

B. minor sylvestris spontanea. *Bauh. Hist.* III *p.* 113.

Nasce comunemente nei Prati *e luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

CHRYSANTHEMUM. (Goldblume) Crisantemo.
Calice emisferico imbricato, con le squamme marginali membranacee. *Ricettacolo* nudo. *Pappo* nessuno o marginato.

C. Leucanthemum. (Weisse G.) C. bianco.
Foglie abbraccianti il fusto, lanceolate seghettate, alla base intagliato-dentate; fusto dritto quasi ramoso. *Pers. Syn.* II *p.* 460. *Röhl. germ.* II *p.* 452. *Schult. aust.* II *p.* 496.
Leucanthemum vulgare. *Zann. Ven. p.* 161. *t.* 184.
Bellis major. *Bauh. Hist.* III *p.* 114 icon.
Nasce comunemente intorno Malghera *nei* Prati *e luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

MATRICARIA. (Mutterkraut) Matricale.
Calice piano con squamme scariose nel margine. *Ricettacolo* nudo cilindrico-conico. *Pappo* nessuno.

M. Chamomilla. (Gemeines M.) M. Camomilla.
Foglie bipennate, squamme del calice ottuse. *Pers. Syn.* II *p.* 463. *Röhl. germ.* II *p.* 451. *Schult. aust.* II *p.* 495.
Chamaemelum vulgare Leucanthemum. *Zann. Ven. p.* 58.
C. vulgare. *Bauh. Hist.* III *p.* 116 icon.

Nasce negli Orti *e luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta annuale.

ANTHEMIS. (Kamille) Antemide.

Calice emisferico quasi eguale con più di 5 raggi. *Ricettacolo* paleaceo con palei piani, acuminati in cima, rigidi. *Pappo* nessuno o con margine membranaceo.

A. Cota. (Italiänische K.) A. italiana.

Foglie bipennatofesse con lacinie lineari lesiniformi-dentate, palei tereti pungenti e dilatati alla base. *Pers. Syn.* II *p.* 465. *Willd. Sp. p.* 2174.

Nasce nei terreni *di* Santa Marta; *fiorisce il mese di* Giugno, *ed è* pianta annuale.

ACHILLEA. (Garbe) Millefoglio.

Calice ovato imbricato. *Fioretti* del raggio circa 4. *Ricettacolo* paleaceo. *Pappo* nessuno.

1. *A. Millefolium.* (Gemeine G.) M. volgare.

Foglie bipennate un poco glabre, pennole con lacinie lineari, dentate. *Pers. Syn.* II *p.* 469. *Röhling germ.* II *p.* 466. *Schult. aust.* II *p.* 542. *Savi mat. med. t.* 26.

M. vulgare album. *Zann. Ven. p.* 187. *t.* 143.

Mill. Stratiotes pennatum. *Bauhin. Hist.* III *p.* 136. icon.

Nasce comunemente nei Prati *e nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *sino* Novembre, *ed è* pianta perenne.

Trovasi ancora una varietà a fiori porporei.

2. *A. magna*. (Grosse G.) M. grande.
Foglie bipennate quasi pelose, con lacinie lineari, dentate, orecchie incrociate. *Pers. l. c. Röhl. l. c. Schult. l. c.*
Nasce intorno Malghera *e* Campalto *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto; *ed è* pianta perenne.

FRUSTRANEA

CENTAUREA. (Flockenblume) Centaurea.
Calice vario. *Corolle*, quelle del raggio imbutiformi bislunghe, irregolari. *Ricettacolo* setoloso. *Pappo* semplice vario.

1. *C. Cyanus*. (Korn F.) C. Ciano.
Calici seghettati, foglie lineari sessili interissime, le inferiori alla base pennatofesse. *Pers. Synops.* II *p.* 483. *Röhl. german.* II *p.* 469. *Schult. aust.* II *p.* 551.
Cyamus segetum flore caeruleo. *Zann. Ven. p.* 77. *t.* 289.
Cyanus. *Bauh. Hist.* III *p.* 21 icon.
Ciano minore. *Matth. p.* 537 icon.
Nasce fra le Biade; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

2. *C. paniculata*. (Rispenartige F.) C. panicolata.

Calici ciliati, con squamme ovate appoggiate, foglie inferiori bipennate, le superiori pennatofesse, fusto panicolato. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p.* 470. *Schult. loc. cit.*

Jacea foliis candicantibus laciniatis calyculis non splendentibus. *Zann. Ven. p.* 145. *t.* 8.

Centaurie majoris species tenuifolia. *Bauh. Hist.* III *p.* 31.

Nasce abbondevolmente nel Lido *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

3. *C. Jacea*. (Gemeine F.) C. comune:

Calici scariosi, con squamme ovate, lacere nella cima, foglie lanceolate interissime, le radicali quasi dentate, rami angolati. *Pers. l. c. p.* 485. *Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 554.

Jacea nigra pratensis latifolia. *Zann. Venet. p.* 144. *t.* 206. *f.* 2.

Jacea nigra vulgaris capitata et squamata. *Bauhin. Hist.* III *p.* 27.

Nasce comunemente intorno Malghera *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

4. *C. Calcitrapa*: (Stendinstel F.) C. stellata.

Calici quasi raddoppiato-spinosi sessili, foglie pennatofesse lineari dentate, fusto peloso. *Pers. loc. cit. p.* 486. *Röhl. l. c. p.* 471. *Schult. l. c. p.* 555.

Cyanoides stellata spinosa flore purpureo. *Zannich. Ven. p.* 76. *t.* 152.

Carduus stellatus sive Calcitrapa: *Bauh. Histor.* III *p.* 89.

Nasce nei luoghi asciutti; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta annuale.

GYNANDRIA

DIANDRIA.

ORCHIS. (Knabenkraut) Orchide.

Calice ringhioso, con la fogliolina superiore concava. *Labello* dilatato terminato posteriormente in uno sprone lungo. *Antera* accresciuta nella cima dello stilo.

Radici *testicolate indivise.*

1. *O. pyramidalis.* (Piramiden K.) O. piramidale.

Labello trifido quasi eguale alla base bitubercolato, con la lacinia di mezzo smarginata, sprone più lungo del germe, foglioline del calice ovato-lanceolate, spiga unita. *Pers. Syn.* II *p.* 503. *Röhl. germ.* II *p.* 476. *Schult. aust.* I *p.* 42.

O. spica purpurea congesta pyramidali. *Zann. Ven. p.* 196. *t.* 4.

Nasce comunemente intorno Malghera *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

2. *O. coriophora.* (Stinkendes K.) O. puzzante.

Labello trilobo, con la lacinia di mezzo più sottile

e più lunga, le laterali richinate dentellate, sprone più breve del germe, foglioline del calice conniventi. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p. 473. Schult. l. c. p. 43.*

Nasce intorno Malghera e Campalto *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Maggio e Giugno, *ed è* pianta perenne.

3. *O. Morio.* (Triften K.) O. delle pasture.

Labello largo trilobo, con il lobo di mezzo smarginato e con i lobi laterali intaccati richinati, sprone bifido nella cima, ascendente, foglioline del calice ovali, ottuse, conniventi. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p. 474. Schult. l. c.*

O. Morio foemina. *Zann. Ven. p.* 195. *t.* 28.

O. minor purpurea, et aliorum colorum, cum alis virentibus. *Bauh. Hist.* II *p.* 761 cum icone.

Nasce in San Niccolò *di* Lido, *nei* Treporti *e nel* Cavallino; *fiorisce nei mesi di* Aprile e Maggio, *ed è* pianta perenne.

4. *O. Mascula.* (Männliches K.) O. maschio.

Labello 3-fido intaccato, con la licinia di mezzo più lunga biloba, sprone quasi ritorto ottuso, calice con le foglioline esterne quasi falciformi, acute richinate. *Pers. l. c. p.* 504. *Röhl. l. c. p.* 477. *Schult. loc. cit.*

Trovasi, benchè di rado, nei Prati *ai* Treporti; *fiorisce nei mesi di* Maggio e Giugno, *ed è* pianta perenne.

Radici *palmate*.

5. *O. conopsea*. (Fliegenartiges K.) O. moschiforme.

Labello trifido quasi eguale, quasi intero, sprone setaceo più lungo del germe, calice con le foglioline esterne patentissime, spiga cilindrica, fiori sparsi. *Pers. Syn.* II *p.* 505. *Röhl. germ.* II *p.* 479. *Schult. aust.* II *p.* 52.

Nasce intorno Campalto *e* Malghera *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

OPHRIS. (Ragwurz) Ofride.

Calice di cinque foglie, delle quali le tre esterne ovato-lanceolate, le due interne [*Petali*] piccole quasi lineari. *Labello* dalla base dello stilo, senza sprone, grande quasi lobato, pendente. *Ginostemio* incurvo.

O. arachnites. (Spinnenblumige R.) O. a fiori in forma di ragno.

Labello villoso trilobo, col lobo di mezzo ovato a rovescio, e brevissimamente trilobo, petali patenti, dei quali li tre esterni bislunghi ottusi, i due interni lineari-lanceolati brevissimi. *Pers. Syn.* II *p.* 510. *Röhl. germ.* II *p.* 480. *Schult. aust.* I *p.* 56.

Nasce nei Treporti *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

HELLEBORINE. (Stendelwurz) Elleborine.

Calice ringhioso di cinque foglie, delle quali le tre esterne più sottili delle due interne, conniventi,

HEXANDRIA

ARISTOLOCHIA, (Osterluzei) Aristolochia.

Calice o. *Corolla* monopetala ligolata, ventricosa alla base. *Cassella* inferiore di sei cavità e con molti semi.

Fusto *eretto*.

1. *A. rotunda*. (Runde O.) A. rotonda.

Foglie cuoriformi quasi sessili ottuse, fusto un poco dritto quasi semplice, fiori solitarii dritti, labbro bislungo retuso. *Pers. Syn.* II *p.* 527. *Röhl. germ.* II *p.* 484. *Schult. aust.* I *p.* 584.

A. rotunda. *Bauh. Hist.* III *p.* 559.

Nasce nel Lido *ed in* Campalto *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. *A. Clematitis*. (Gemeine O.) A. comune.

Foglie subrotondo-cordate, picciolate, ottuse, peduncoli uniflori ammucchiati, corolle dritte, labbro bislungo. *Pers. l.c. Röhl. l.c. Schult. l. c.*

A. Clematitis recta. *Zann. Ven. p.* 20. *t.* 180.

A. Clematitis vulgaris. *Bauh. Hist.* III *p.* 560 cum icone.

Nasce a San Niccolò *di* Lido *appresso le* Siepi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

MONOECIA

MONANDRIA.

ZOSTERA. (Wasserriemen) Zostera.
Masc. *Calice* o. *Corolla* o. *Antera* ovata piantata sulla parte superiore di uno spadice unilaterale.
Femm. *Calice* o. *Corolla* o. *Germi* ovati sulla parte inferiore dello spadice unilaterale. *Stilo* bifido. *Cassella* con un solo seme.

Z. marina. (Gemeine W.) Z. comune.
Foglie interissime quasi trinervi, fusto un poco terete. *Pers. Syn.* II *p.* 528. *Röhl. germ.* II *p.* 79.
Nasce comunemente nelle Lagune *e nel* Mare; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta perenne.

DIANDRIA

LEMNA. (Wasserlinse) Lenticola.
Masc. *Calice* di una sola foglia. *Corolla* o.
Femm. *Calice* di una sola foglia. *Corolla* o. *Stilo* 1. *Cassella* di una sola cavità con due semi.

L. minor. (Kleine W.) L. minore.
Foglie ellittiche sotto e sopra piane, unite alla base, radici solitarie. *Pers. Syn.* II *p.* 532. *Röhl. germ.* II *p.* 90. *Schult. aust.* I *p.* 64.

Nasce nelle acque quiete; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed* è pianta perenne.

TRIANDRIA

TYPHA. (Kolben) Tifa.

Masc. *Amento* cilindrico. *Calice* obsoleto, di tre foglie. *Corolla* o.

Femm. *Amento* cilindrico sotto il maschio. *Cal.* o. *Corolla* o. Un solo seme pedicellato, col pedicello circondato da peli lunghi.

T. latifolia. (Breitblättrige K.) T. a foglie larghe. Foglie quasi ensiformi, spiga maschia e femmina approssimate, l'una e l'altra cilindriche. *Pers. Syn.* II *p.* 532. *Willd. Spec.* IV *p.* 197. *Röhl. germ.* II *p.* 520. *Schult. aust.* I *p.* 163.

T. palustris major. *Bauh. Hist.* II *p.* 539.

Tipha. *Matth. p.* 911.

Nasce comunemente intorno Malghera *nei luoghi* inondati; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed* è pianta perenne.

SPARGANIUM. (Igelskopf) Sparganio.

Masc. *Amento* subrotondo. *Calice* di tre foglie. *Corolla* o.

Femm. *Amento* subrotondo. *Calice* di tre foglie. *Corolla* o *Stimma* bifido. *Drupa* secca con un solo seme.

S. ramosum. (Aestiger I.) S. ramoso.

Foglie triquetre alla base, con lati concavi, fusto ramoso, stimmi lineari. *Pers. Syn.* II *p.* 533. *Röhl. germ.* II *p.* 510.

S. quibusdam. *Bauh. Hist.* II *p.* 541.

Sparganio. *Matth. p.* 1043 cum icone.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi* acquosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

CAREX. (Segge) Carice.

Masc. *Amento* imbricato. *Calice* squamma solitaria. *Corolla* o.

Femm. *Calice* squamma solitaria. *Corolla* ventricosa monopetala, 2-dentata nella cima. *Stimma* 2-3. *Noce* triquetra chiusa dalla corolla persistente.

1. Spighe *androgine sessili alterne.*

1. *C. vulpina.* (Fuchs S.) C. volpina.

Spiga androgina composta, spighette numerose, ternate e quinate, ammucchiate, bislunghe, conferte, di sopra maschi, stimma due, frutti ovati 2-dentati compresso-triquetri patenti, brattee setacee. *Pers. Syn.* II *p.* 537. *Schkur. Caric. t.* C *f.* 10. *Röhl. germ.* II *p.* 490. *Schult. aust.* I *p.* 132.

Nasce in Campalto, Chioggia *e nel* Lido; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

2. *C. muricata.* (Stechende S.) C. muricata.

Spiga androgina composta, spighette ovate, di sopra maschie, approssimate, stimma due, frutti

orizzontali piano-convessi 2-dentati, marginati alla base, nel margine ciliato seghettati. *Pers. loc. cit. p.* 538. *Schkur. Caric. t.* E Dd *f.* 22. *Röhl. germ.* II *p.* 491. *Schult. l. c. p.* 133.

Nasce nel luogo detto Aca bianca *nei* Prati umidi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *sino* Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. Spighe *monoiche ovvero con sessi distinti.* Stimmi *per lo più tre.*

3. *C. pilulifera.* (Pillen S.) C. pilolifera.

Spiga maschia solitaria, femmine quasi terne approssimate elittico-subrotonde sessili, stimmi tre, frutti subrotondi brevemente rostrati pubescenti più brevi della squamma bislunga, acuta, fusto decumbente. *Pers. l. c. p.* 540. *Schkur. Caric. t.* I *f.* 39. *Röhl. l. c. p.* 496. *Schult. l. c. p.* 140.

Nasce in Campalto *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

4. *C. tomentosa.* (Filzige S.) C. tomentosa.

Spiga maschia solitaria, femmine geminate cilindriche quasi approssimate sessili, stimmi tre, frutti subrotondi tomentosi maggiori della squamma ovata acuminata. *Pers. l. c. p.* 541. *Schkur. Caric. t.* F *f.* 28. *Röhl. l. c. p.* 497. *Schult. l. c. p.* 142.

Nasce in Campalto *ed intorno* Malghera *nei* Prati umidi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

5. *C. extensa.* (Ausgdehnte S.) C. steso.

Spiga maschia solitaria quasi sessile, femmine elitti-

co subrotonde rinchiuse peduncolate, quasi terne, quasi approssimate, brattee fogliacee lunghissime, stimmi tre, frutti elittici bidentati nervosi maggiori della squamma ovata mucronata. *Pers. l. c. p.* 542. *Schkur. Caric. t.* V *et* Xx *f.* 72. *Röhl. l. c. p.* 498.

Nasce intorno Malghera *e* Campalto *nei* Paludi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

3. Spighe *con sessi distinti, maschia solitaria, femmine, le superiori sessili ovvero rinchiuse peduncolate, le inferiori peduncolate.*

6. *C. panicea.* (Fennichartige S.) C. panicea.

Spiga maschia solitaria, femmine quasi due rimote, quella di sopra quasi rinchiuso-peduncolata, quella di sotto lungamente peduncolata, stimmi tre, frutti ovati ottusi, maggiori della squamma ovata. *Pers. l. c. p.* 544. *Schkur. Caric. t.* Ll *f.* 100. *Röhl. l. c. p.* 502. *Schult. l. c. p.* 149.

Nasce in Campalto *nei* Prati umidi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

7. *C. nitida.* (Glänzende S.) C. splendente.

Spiga maschia solitaria, femmine due bislunghe approssimate, la inferiore delle quali peduncolata, stimmi tre, frutti elittico-globosi nitido-glabri, coll'apertura bifida, maggiori della squamma ovata. *Pers. l. c. p.* 543. *Röhl. l. c. p.* 503. *Schultes l. c. p.* 150.

Nasce in Campalto *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

8. *C. caespitosa*. (Rasen S.) C. cespitosa.

Spiga maschia solitaria, femmine cilindriche ottuse quasi terne distanti, delle quali quella di sotto lungamente peduncolata, stimmi due, frutti ovati ottusi con l'apertura pertugiata, maggiore della squamma bislunga ottusa, foglie patenti. *Pers. l.c p.*546. *Schkur. Caricæ.* Aa *et* Bb *f.* 85. *Röhl. l. c. p.* 504. *Schult l. c. p.* 152.

Nasce in Campalto *nei* Fossi *e nei* Paludi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

Spighe *maschie anche* 2-3.

4. Spighe *con sessi distinti, maschie molte.*

9. *C. recurva*. (Graublättrige S.) C. ritorta.

Spighe maschie geminate, femmine cilindriche quasi ternate peduncolate pendenti, stimmi tre, frutti ellittici ottusi un poco scabri, eguali alla squamma ovata cuspidata. *Röhl. l. c. p.* 507. *Schult. l. c. p.* 157.

C. (*glauca*) Spicis masculis geminatis foeminis cylindricis peduncolatis maturis pendulis, fructibus ovatis obtusis. *Pers. l. c. p.* 545.

C. (*flacca*) Vaginis brevissimis vel nullis, spicis cilindricis, foemineis laxis, fructiferis pendulis, capsulis obtuso ovatis apice integris. *Schkur. Carices. p.* 117. *t.* O *f.* 57.

Nasce in Campalto *nei* Prati umidi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

10. *C. paludosa*. (Morast S.) C. paludoso.

Spighe maschie due, femmine terne dritte cilindri-

che assottigliate, le inferiori peduncolate, stimmi tre, frutti ovati nervosi bidentati più larghi della squamma lanceolata restata. *Pers. loc. cit. p.* 546. *Schkur. Caric. p.* 121. *t.* Oo *et* Vv *f.* 102. *Röhl. l. c. p.* 508. *Schult. l. c. p.* 156.

Nasce in Campalto *nei* Paludi; *fiorisce neï mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

11. *C. hirta.* (Haarfrüchtige S.) C. irta.

Spighe maschie due, femmine tre bislunghe rimote, le inferiori brevemente peduncolate, stimmi tre, frutti bislunghi acuminaati irti 2-cuspidati maggiori della squamma bislunga restata, vagine e foglie quasi irte. *Röhl. l. c. p.* 510. *Schult. l. c. p.* 161.

C. Pilosa, spicis omnibus oblongis, faemineis remotis vaginatis, vaginis lanato-villosis, capsulis hirtis. *Pers. l. c. p.* 547. *Schkur. p.* 127. *t.* Uu *f.* 108.

Nasce nei Treporti *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.

TETRANDRIA

ALNUS. (Else) Ontano.

Masc. *Amento* composto da ricettacoli cuneiformi, troncati, triflori. *Calice* una squamma. *Corolla* quadripartita.

Femm. *Amento*. *Calice* con squamme biflore. *Corolla* o. *Semi* compressi, ovati, nudi.

A. glutinosa. (Gemeine E.) O. comune.

Foglie subrotondo-cuneiformi, quasi retuse glutinose, vene inferiormente con ascelle villose. *Pers. Syn.* II *p.* 550. *Röhl. germ.* II *p.* 512. *Schult. aust.* I *p.* 321.

A. rotundifolia glutinosa viridis. *Zann. Ven. p.* 7.

A. vulgaris. *Bauh. Hist.* I *p.* 151.

Alno. *Matth. p.* 157.

Nasce comunemente in Campalto *e nel luogo detto* Aca bianca; *fiorisce nei mesi di* Gennaro *e* Febbraro, *ed è* pianta fruticosa.

BUXUS. (Buchsbaum) Bosso.

Masc. *Calice* di tre foglie. *Petali* due. Un rudimento del *Germe*.

Femm. *Calice* di quattro foglie. *Petali* tre. *Stili* tre. *Cassella* 3-rostrata, e di tre cavità. *Semi* 2.

B. sempervirens. (Gemeiner B.) B. comune.

Foglie ovate, piccioli un poco pelosi nel margine, antere ovato-saettiformi. *Pers. Syn.* II *p.* 551. *Röhl. germ.* II *p.* 512. *Schult. aust.* I *p.* 322.

Buxus. *Fuchs Hist. p.* 643 cum icone.

Bosso. *Matth. p.* 208 cum icone.

Nasce in Campalto *appresso i* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta fruticosa.

URTICA. (Nessel) Ortica.

Masc. *Calice* di quattro foglie. *Corolla* o. *Nettario* centrale ciatiforme.

Femm. *Cal.* di due valve. *Cor.* o. *Seme* 1 nitido.

1. *U. urens*. (Brenn N.) O. abbrucciante.
Foglie opposte elittiche quasi 5-nervi, acutamente seghettate, spighe glomerate geminate. *Pers. Syn.* II *p.* 552. *Röhl. germ.* II *p.* 511. *Schult. aust.* I *p.* 317.
U. minor annua. *Bauh. Hist.* III *p.* 446.
Urticoides urens. *Zann. Ven. p.* 280.
Urtica minor. *Fuchs Hist. p.* 107.
Ortica III. *Matth. p.* 1185 cum icone.
Nasce negli Orti *e luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

2. *U. dioica*. (Gemeine N.) O. comune.
Foglie opposte cordate ovato-lanceolate grossamente seghettate, fiori dioici, spighe panicolate glomerate geminate più lunghe del picciolo. *Pers. loc. cit. p.* 553. *Röhl. l. c. Schult. l. c. p.* 318.
U. urens maxima. *Zann. Ven. p.* 280.
U. vulgaris major. *Bauh. Hist.* III *p.* 445.
U. major. *Fuchs Hist. p.* 107 cum icone.
Nasce come la precedente; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta perenne.

PENTANDRIA

XANTHIUM. (Spitzklette) Carpola. (*Savi*)
Masc. *Calice* comune imbricato. *Corolla* monopetala 5-fida imbutiforme. *Ricettacolo* paleaceo.
Femm. *Calice* involglio di due foglie e con un solo fiore. *Corolla* o. *Drupa* secca, muricata, bifida nella cima. *Noce* di due cavità.

1. *X. Strumarium*: (Gemeine S.) C. Bardana:
Fusto inerme, foglie cordate trinervate. *Pers. Syn.* II *p.* 558. *Röhl. germ.* II *p.* 521. *Schult. aust.* I *p.* 466.
X. s. Lappa minor. *Bauh. Hist.* III *p.* 572.
Xanthium. *Zann. Ven. p.* 282. *Fuchs Hist. p.* 579.
Xanthio ovvero Lappa minore. *Matth. p.* 1263.
Nasce nel Lido *nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

2. *X. spinosum*. (Dornige S.) C. spinosa.
Fusto con spini ternati, foglie trilobe. *Pers. loc. cit. Röhl. l. c.*
Trovasi, benchè di rado, nel Lido *nei luóghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

AMARANTHUS, (Amaranth) Amaranto.
Masc. *Calice* di tre o cinque foglie. *Corolla* o: *Stami* tre o cinque.
Femm. *Calice* di tre o cinque foglie. *Cor.* o. *Stili* tre. *Cassella* coperchiata di una sola cavità. *Seme* uno.

Triandri.

1. *A. Blitum*. (Wilder A.) A. selvatico:
Glomeruli triandri quasi spicati, fiori trifilli, foglie ovate retuse, fusto diffuso. *Pers. Syn.* II *p.* 560. *Röhl. germ.* II *p.* 511. *Schult. aust.* I *p.* 274.
Blitum rubrum minus. *Zann. Ven. p.* 39. *I. Bauh. Hist.* II *p.* 697.

Nasce nei Rovinazzi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

2. *A. prostratus*. (Liegender A.) A. giacente.
Glomeruli triandri spicati, fiori trifilli, foglie rombeo-ovate un poco ottuse, retuse, fusto giacente ramoso. *Pers. l. c. Röhl. l. c. p.* 585. *Schult. aust. loc. cit.*
Blitum sylvestre spicatum. *Zann. Ven. p.* 39.
Blitum album minus. *Bauh. Hist.* II *p* 967.
Nasce nei Rovinazzi *e fra* Sassi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta annuale.

Pentandri.

3. *A. hybridus*. (Bastard A.) A. ibrido.
Grappoli pentandri ricomposti ammucchiati dritti, foglie ovato-lanceolate. *Pers. l. c.*
A. major. *Barrell. ic. t.* 648, *et* 650.
A. maximus novae anglie totus viridis, *Zann. Ven. p.* 13.
Nasce comunemente dentro e fuori della città *nei luoghi* sassosi *e nei* Rovinazzi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

POLYANDRIA

Stami *oltre sette*.

SAGITTARIA. (Pfeilkraut) Saettaria.

Masc. *Calice* di tre foglie. *Corolla* di tre petali. *Filamenti* quasi 24.

Femm. *Calice* di tre foglie. *Corolla* di tre petali. *Pistilli* molti. *Semi* molti nudi.

S. sagittifolia. (Gemeines P.) S. comune.

Foglie lanceolate acuminate, saettiformi, con lobi lanceolati dritti, scapo semplice. *Pers. Synops.* II *p.* 563. *Röhling german.* II *p.* 514. *Schultes aust.* II *p.* 124.

Sagitta. *Bauh. Hist.* III *p.* 789 cum icone.

β Sagitta minor angustifolia. *Bauh. Hist.* III *p.* 790 cum icone.

Nasce intorno Malghera *nei* Fiumi *e nei* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

POTERIUM. (Becherblume) Poterio.

Masc. *Calice* di quattro foglie. *Cor.* 4-partita. *Stami* 30-50.

Femm. *Calice* di quattro foglie. *Corolla* 4-partita. *Pistilli* due. *Semi* chiusi nel tubo della corolla indurita.

P. Sanguisorba. (Gemeine B.) P. comune.

Inerme, fusti quasi angolosi. *Pers. Syn.* II *p.* 566. *Röhl. germ.* II *p.* 515. *Schult. aust.* II *p.* 48.

Pimpinella Sanguisorba minor hirsuta. *Zann. Ven.* *p.* 210. *t.* 119.

Pimpinella minore. *Matth. p.* 1088.

Sanguisorba minor. *Bauh. Hist.* III *p.* 113.

Nasce nel Lido *nei* Prati; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* perenne.

QUERCUS. (Eiche) Quercia.

Masc. *Calice* quasi 5-fido. *Corolla* o. *Stammi* 5-10.

Femm. *Calice* di una sola foglia col margine interissime. *Corolla* o. *Stili* 2-5. *Noce* coriacea circondata alla base dal calice persistente.

Q. Robur. (Stein E.) Q. Rovere.

Foglie bislunghe picciolate glabre sinuate, lobi rotondati, frutti bislunghi sessili. *Pers. Synops.* II *p.* 570. *Röhl. germ.* II *p.* 515. *Schult. aust.* I *p.* 619.

Quercia. *Matth. p.* 222 cum icone.

Nasce in Campalto; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta arborea.

JUGLANS. (Wallnuss) Noce.

Masc. *Amento* imbricato. *Calice* una squamma. *Corolla* 6-partita. *Filamenti* 4-18.

Femm. *Calice* 4-fido superiore. *Corolla* 4-fida. *Stili* due. *Drupa* coriacea con noce solcata.

J. regia. (Gemeine W.) N. comune.

Amenti poliandri, foglioline quasi nove, ovali glabre quasi seghettate e quasi eguali, frutti globosi. *Pers. Syn.* II *p.* 566. *Röhl. germ.* II *p.* 517.

Nasce in Campalto; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta arborea.

CORYLUS. (Haselnuss) Avellana.

Masc. *Amento* imbricato. *Calice* una squamma. *Corolla* o. *Stammi* 8.

Femm. *Calice* bipartito lacero: *Stili* due. *Noce* ovata circondata dal calice persistente.

C. Avellana. (Gemeine H.) A. comune.

Stipole bislunghe ottuse, calici del frutto campaniformi allargati lacero-dentati. *Pers. Syn.* II *p.* 571. *Röhl. germ.* II *p.* 513.

Nasce in Campalto *nei luoghi* umidi *ed* ombrosi; *fiorisce nei mesi di* Febbraro *e* Marzo, *ed è* pianta fruticosa.

ARUM. (Aron) Aro.

Spata monofilla cucullata: *Spadice* nudo di sopra, femmineo di sotto e stamineo nel mezzo. *Bacca* per lo più monospermo.

A. italicum. (Italienischer A.) A. italiano:

Senza fusto; foglie albo-venose astato-saettiformi, con lobi auricolati divaricati, spadice clavato più corto della spata. *Pers. Syn.* II *p.* 575.

Nasce nei luoghi ombrosi *ed appresso i* muri; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

MONADELPHIA

MOMORDICA. (Eselsgurke) Elaterio.

Masc. *Calice* 5-fido. *Cor.* 5-partita. *Stammi* tre.

Femm. *Calice* 5-fido. *Corolla* 5-partita. *Stilo* 3-fido. *Pappone* che si apre con elasticità. *Semi* compressi.

M. Elaterium. (Gemeine E.) E. comune.

Pomi elittici ispidi, foglie cuoriformi ispide ottuse dentate, fusto senza ricci. *Pers. Syn.* II *p.* 593. *Röhl. germ.* II *p.* 521. *Savi mat. med. t.* 11.

Elaterium officinarum cucumis asininus dictus. *Zann. Ven. p.* 91. *t.* 63. *Bauh. Hist.* II *p.* 248.

Nasce nei Rovinazzi *e luoghi* sassosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale *e qualche volta* biennale.

Fusto *giacente*. Foglie *verrucoso-ispide glauche*. Fiori *giallo-verdi*, *maschi ammucchiati*, *femmine solitarie*. Calice *con lacinie sottili acuminate*. Corolla *con lobi muricati nella cima*. Frutti *ritorti cilindrici muricati*. Semi *ovati-bislunghi*, *nitidi*.

BRYONIA. (Zaunrübe) Brionia.

Masc. *Calice* 5-dentato. *Corolla* 5-partita. *Filamenti* cinque.

Femm. *Calice* 5-dentato. *Corolla* 5-partita. *Stilo* trifido. *Bacca* quasi globosa con molti semi.

B. dioica. (Zweyhäusige Z.) B. dioica.

Foglie cuoriformi palmate 5-lobe dentate, callosopuntate, fiori racemosi dioici. *Pers. Syn.* II *p.* 594. *Röhl. germ.* II *p.* 522. *Schult. aust.* I *p.* 107.

B. aspera sive alba baccis rubris. *Zann. Ven. p.* 41. *t.* 243.

Vitis alba s. Bryonia: *Bauh. Hist.* II *p.* 143.

Nasce in Campalto *e nel luogo detto* Aca bianca *nelle* Siepi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

DIOECIA

DIANDRIA.

SALIX. (Weide) Salice.

Masc. *Amento* cilindrico. *Calice* una squamma. *Corolla* o. Una *glandola* nettarifera alla base.

Femm. *Amento* cilindrico. *Calice* una squamma. *Corolla* o. *Stilo* 2-fido. *Cassella* di una sola cavità e con due valve. *Semi* papposi.

1. *S. rosmarinifolia.* (Rosmarinblättrige W.) S. a foglie di ramerino.

Foglie lineari-lanceolate quasi interissime piane, pubescenti nella pagina superiore, e nella pagina inferiore sericei, germi lanceolati villosi, stili prolungati. *Pers. Syn.* II *p.* 602. *Röhl. germ.* II *p.* 532. *Schult. aust.* I *p.* 76.

S. humilis angustifolia. *Zann. Ven. p.* 233. *t.* 125.

S. pumila angustifolia inferne lanuginosa. *Bauhin. Hist.* I *p.* 212.

Nasce nei Treporti *nei luoghi* acquosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta fruticosa.

2. *S. caprea.* (Sohl W.) S. caprea.

Foglie ovate acuminate seghettate rugose, nella pagina inferiore tomentose, stipole quasi lunate, casselle ventricose. *Pers. l. c. p.* 603. *Röhl. l. c. p.* 534. *Schult. l. c. p.* 78.

S. latifolia, folio ex rotunditate acuminato. *Zann. Ven. p.* 233.

S. latifolia inferne hirsuta. *Bauh. Histor.* I *p.* 215 cum icone.

Nasce in Campalto *nei luoghi* umidi *ed appresso i* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta arborea.

3. *S. alba*. (Gemeine W.) S. comune.

Foglie lanceolate acuminate seghettate, sericei da una e dall'altra parte, serrature inferiori glandolosi, stimmi bipartiti. *Pers. l. c. p.* 604. *Röhl. l. c. p.* 535. *Schult. l. c. p.* 81.

S. vulgaris alba arborescens. *Zann. Ven. p.* 232.

Nasce in Campalto *ed intorno* Malghera *nelle* Strade *e luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta arborea.

TRIANDRIA

OSYRIS. (Osyris) Osiride.

Masc. *Calice* 3-fido. *Corolla* o.

Femm. *Calice* 3-fido. *Corolla* o. *Stilo* uno. *Stimma* subrotondo. *Bacca* di una sola cavità.

O. alba. (Weisse O.) O. bianca.

Osyris: *L.*

O. foliis linearibus acutis. *Pers. Synops.* II *p.* 606. *Röhl. germ* II *p.* 536.

Casia poetica monspeliensium. *Zann. Ven. p.* 53. *t.* 83.

Nasce nel Cavallino *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nel mese di* Giugno, *ed è* pianta fruticosa.

OCTANDRIA

POPULUS. (Pappel) Piopo.

Masc. *Amento* cilindrico. *Calice* una squamma lacera. *Corolla* turbinata obliqua intera.

Femm. *Amento* cilindrico. *Calice* e *Corolla* come nel fior maschio. *Stimma* 4-fido. *Cassella* di due cavità. *Semi* papposi.

1. *P. alba.* (Weisse P.) P. bianco.

Foglie cordato-subrotonde, lobate dentate nella pagina inferiore tomentoso-nivei, amenti ovati. *Persoon Syn.* II *p.* 523. *Röhl. germ.* II *p.* 538. *Schult. aust.* I *p.* 603.

P. alba majoribus foliis. *Zannich. Ven. p.* 217.

P. alba Leuci. *Bauh. Hist.* I *p.* 160.

Nasce agli Alboroni; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta arborea.

2. *P. nigra.* (Schwarze P.) P. nero.

Foglie con le due pagine glabre acuminate seghettate deltoidi, più lunghe che larghe. *Pers. loc. cit. Röhl. l. c. Schult. l. c.*

P. nigra. *Zannich. Ven. p.* 217. *t.* 122.

P. nigra s. Aegiros. *Bauh. Hist.* I *p.* 155.

Popolo uero. *Matth. p.* 153 cum icone.

Nasce comunemente nel Lido; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta arborea.

ENNEANDRIA

MERCURIALIS. (Bingelkraut) Mercorella.

Masc. *Calice* 3-partito. *Cor.* o. *Stami* 9 ovvero 12. *Antere* globose didime.

Femm. *Calice* 3-partito. *Corolla* o. *Stili* 2. *Cassella* dicocca di due cavità e con un solo seme.

M. annua. (Jähriges B.) M. annuale.

Annuale, fusto incrociato, foglie glabre, fiori maschi spicati. *Pers. Syn.* II *p.* 625. *Röhl. germ.* II *p.* 539. *Schult. aust.* I *p.* 622.

M. testiculata s. masc. ♀ *Zann. Ven. p.* 186.

M. spicata s. foemina. ♂ *Zann. Ven. p.* 186.

M. masc. et foemina. *Bauh. Hist.* II *p.* 977.

M. masc. *Fuchs Hist. p.* 475. ♀

M. foemina. *Fuchs Hist. p.* 476. ♂

Mercorella maschio. *Matth. p.* 1360. ♀

Mercorella femmina. *Matth. p.* 1361. ♂

Nasce comunemente negli Orti *e luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Giugno e Luglio, *ed è* pianta annuale.

HYDROCHAERIS. (Froschbiss) Idrocheride.

Masc. *Spata* di due foglie. *Calice* 3-fido. *Corolla* di tre petali. Li tre *Filamenti* interni formanti uno *Stilo*.

Femm. *Calice* 3-fido. *Corolla* di tre petali. *Stili* 6. *assella* di sei cavità, con molti semi, inferiore.

H. Morsus Ranae. (Gemeiner F.) I. comune.

Hydrochaeris. *Pers. Syn.* II *p.* 625. *Röhl. germ.* II *p.* 539. *Schult. aust.* I *p.* 623.

N. minor s. morsus ranae. *Bauh. Hist.* III *p.* 173. cum icone aliena.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi* acquosi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta perenne.

MONADELPHIA

JUNIPERUS. (Wachholder) Ginepro.

Masc. *Amento* ovato. *Calice* una squamma. *Corolla* o. *Stami* tre.

Femm. *Calice* 3-partito. *Petali* tre. *Stili* tre. *Bacca* con tre semi e con tre turbecoli.

J. communis. (Gemeiner W.) G. comune.

Foglie terne, patenti, mucronate, più lunghe della bacca. *Pers. Syn.* II *p.* 632. *Röhl. germ.* II *p.* 539. *Schult. aust. p.* 277.

J. vulgaris fruticosa. *Zann. Ven. p.* 151.

J. vulgaris baccis parvis purpureis. *Bauh. Hist.* I *p.* 293.

Nasce abbondevolmente nei Treporti *e nel* Cavallino *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta fruticosa.

POLYGAMIA

MONOECIA.

ANDROPOGON. (Bartgras) Andropogine.

Hermaph. *Cal.* gluma uniflora. *Cor.* restata alla base, o nella cima. *Stami* tre. *Stili* due. *Seme* 1.

Masc. *Calice* unifloro. *Corolla* mutica. *Stami* tre.

1. *A. Gryllus*. (Gemeines B.) A. comune.

Pannocchia semplice diffusa, rami con tre fiori nella cima; quello di mezzo ermafrodito, restato nella cima, sessile e barbato alla base, fiori laterali maschi pedicellati mutici. *W.*

A. Paniculae pedunculis simplicissimis, trifloris, flosculo hermaphrodito aristato, ciliato, basi barbato. *Pers. Syn.* I *p.* 103.

A. Paniculae ramis simplicissimis trifloris. *Röhling germ.* II *p.* 108. *Schult. aust.* I *p.* 193.

Aegilops bromoides juba purpurascente. *Bauhinus Hist.* II *p.* 436 sine icon.

Gramen sparteum festuceum sive Aegilops spartea villosa. *Barr. ic. t.* 18. *f.* 2.

Nasce intorno Malghera *nei luoghi* montuosi; *fiorisce il mese di* Giugno, *ed è* pianta perenne.

Fusto *alto* 2-4 *piedi stritto, di sotto un poco com-*

presso, glabro, con 4-5 nodi rossi. Foglie *lineari acuminate, carenate, richinate nella cima, nel margine e nel dorso, qua e là con peli bianchi.* Vagine *glabre, ovvero con pochi peli.* Linguetta *brevissima ciliata.* Rami *per lo più disposti in verticillo, filiformi lunghissimi, solamente nella cima con spighette, quella di mezzo è ermafrodita, circondata alla base da peluzzi rossi, le laterali sono maschie ovvero neutre, tutte di un colore porporino.* Valvola *esterna del fiore ermafrodito mutica obsolete 7-nerve, la interna 5-nerve, con una resta dorsale. La* Corolla *consiste da tre valve ciliate porporee, delle quali la esterna mutica, la interna con una resta lunghissima.* Reste *nei fiori ermafroditi sono appena più lunghe del calice.* Schuit. *l. c.*

2. *A. Ischaemum.* (Deutsches B.) A. polistachio.

Spighe dilatate quasi otto, fiori geminati e lanati alla base, l'ermafrodito sessile, con corolla 2-valve e restata nella cima, il maschio pedicellato con corolla univalve mutica. *W. Sp. pl.*

A. Spicis digitatis plurimis, flosculis seesilibus, aristato muticoque, pedicellis lanatis. *Schreb. gram.* II *p.* 166. *t.* 33.

Gramen Dactylon spicis villosis. *Zann. Ven. p.* 117. *t.* 194.

Gramen digitatum hirsutum. *Bauh. Hist.* II *p.* 445 cum icone.

Gramen Dactylon spicis aristatis, geniculatis. *Barr. ic. t.* 753. *fig.* 2 mala.

Nasce intorno Malghera *ed in* Fusina *nei luoghi* montuosi; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta perenne.

HOLCUS. (Pferdegrus) Olco.

Hermaph. *Calice* con *gluma* 1-ovvero 2-flora. *Corolla glumia* restata sotto la cima. *Stami* tre. *Stili* due. *Seme* uno.

Masc. *Calice gluma* 2-valve. *Corolla* 0, ovvero 2-valve. *Stami* tre.

1. *H. arundinaceus*. *Nob.* (Rohrblättriges P.) O. arundinaceo.

Spighette uniflore, le ermafrodite sessili restate ovvero mutiche, le maschie pedicellate mutiche. *W. Sp. pl.* sub H. halep.

H. (*halepensis*) Panicula laxa nutante, glumis oblongis, foliis acuminato-setaceis. *Schreb. Gram. p.* 128. *t.* 18.

Sorghum (*halepense*) Panicula sparsa, glumis oblongis glabris, floris hermaphroditis lanceolatis muticis, foemineo aristato. *Pers. Syn.* I *p.* 101.

Andropogon (*arundinaceus*) Panicula ramosa multiflora. *Röhl. germ.* II *p.* 108. *Schult. aust.* I *p.* 194.

Gramen palustre arundinaceum, milii panicula, semine phalaridis. *Barrell. ic. t.* 8 figur. mala.

Nasce negli Orti *ed intorno* Fusina *nei* Prati *e nei luoghi* erbosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

Radice *serpeggiante*. Fusto *alto* 2-4 *piedi*, *dritto striato*. Nodi *pubescenti*. Foglie *lunghissime*, *mu-*

ricate nel margine. Vagine *tereti glabre*. Linguetta *pelosa*, Pannocchia *lunga mezzo sino un piede nutante*. Spighette *alterne unilaterali acute, nitide*.

2. *H. lanatus*. (Wolliges P.) O. lanato.
Glume biflore villose, l'ermafrodito mutico, il maschio con una resta ritorta. *Schreb. gram. p.* 145. *t.* 20. *fig.* 1.
H. Glumis villosis mucronatis, flor. masculi arista incurva, foliis vagina tumida villosa. *Pers. Syn.* I *p.* 78.
Gramen lanatum. *Dalech. Hist. p.* 425. *Bauh. Hist.* II *p.* 466 cum icone.
Nasce intorno Malghera *e nei* Treporti *specialmente nei* Prati umidi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

VALANTIA. (Valantie) Valantia.
Hermaph. *Calice* o. *Corolla* 4-fida. *Stami* quattro: *Stilo* 2-fido. *Seme* uno.
Masc. *Calice* o. *Corolla* 3-4-fida. *Stami* 3-4. *Pistillo* abortivo.

1. *V. Cruciata*. (Gemeine V.) V. comune.
Foglie quaterne elittico-bislunghe trinervi reticolate ispide, peduncoli ramosi glabri bratteati, brattee bislunghe, frutti glabri. *Schult. aust.* I *p.* 309.
V. foliis quaternis ovatis hirsutis, pedunculis lateralibus diphyllis, floribus masculis ut plurimum 4-fidi. *Pers. Syn.* I *p.* 129.

Nasce in Campalto *e nell'*Aca bianca *nei luoghi* erbosi *ed* ombrosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne.

2. *V. tricornis.* (Dreyhörnige V.) V. tricorne.

Foglie ottone aculeate all'indietro, peduncoli tripartiti, frutto nutante granolato. *Roth. neue Beitr.* I *p.* 142. *Schult. aust.* I *p.* 310.

V. (*spuria*) Pedunculis trifloris, floribus omnibus pedicellatis, fructu [majusculo] granulato reflexo, caule decumbente simplici aculeato. *Pers. l. c.*

Trovasi, benchè di rado, nei terreni *di* Santa Marta; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta annuale.

PARIETARIA: (Glaskraut) Vetriola.

Hermaph. *Calice* 4-fido. *Corolla* o. *Stami* quattro elastici. *Stilo* 1. *Seme* 1 superiore, prolungato.

Femm. *Calice* di due foglie. *Seme* coperto dal calice secco prolungato.

P. officinalis: (Gemeine G.) V. comune.

Foglie lanceolato-ovate, peduncoli dicotomi, calici di due foglie. *L. Sp. pl. Pers. Synops.* II *p.* 555. *Röhl. germ. Schult. aust.*

P. officinarum et Dioscoridis. *Zannich. Ven. p.* 204. *t.* 272.

Parietaria: *I. Bauh. Hist.* II *p.* 976.

Nasce comunemente nei muri *e nei* Rovinazzi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta perenne.

ATRIPLEX: (Melde) Atriplice:

Hermaph. *Calice* di cinque foglie: *Corolla* o. *Stami* cinque. *Stilo* 2-partito. *Seme* uno depresso.

Femm. *Calice* di due foglie. *Corolla* o. *Stami* o: *Stilo* bipartito. *Seme* uno compresso.

1. *A. portulacoides*: (Portulack M.) A. a foglie di porcellana.

Fusto fruticoso giacente, foglie ovate a rovescio interissime opposte. *Pers. Syn.* I *p.* 293. *Röhl. germ.* II *p.* 191.

A. maritima angustissimo folio. *Zann. Ven. p.* 32. *t.* 127.

Nasce nei luoghi bagnati dall'acqua salsa; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto.

2. *A. veneta*. (Venetiänische M.) A. veneta.

Fusto eretto erbaceo, foglie inferiori triangolari-astate dentate, le superiori lanceolate quasi astate interissime, frutto con calici rombei acuti, obsoleti tridentati nella cima. *Wild. Diet. Lexicon bot. Nacht.* I *p.* 420.

A. maritima perennis, folio deltoide, s. triangulari, minus incano? *Zann. Ven. p.* 31. *t.* 49 cum icone mala.

A. marinae species Valerando? *Bauh. Hist.* II *p.* 974 cum icone.

Nasce come la precedente, *ma più di* rado.

3. *A. laciniata*. (Gerissene M.) A. laciniata.

Fusto eretto erbaceo, foglie triangolari profonda-

mente dentate, nella pagina inferiore argentee, frutto con calici rombei, trinervi, dentellati. *Schult. aust.* I *p.* 460.

A. Caule herbaceo, foliis deltoidibus dentatis subtus argenteis. *Pers. l. c.*

Nasce nei luoghi secchi *e specialmente intorno* Malamocco *appresso il* mare; *fiorisce nei mesi di* Agosto *e* Settembre, *ed è* pianta annuale.

Fusto *più o meno eretto, diffuso*. Foglie *più lunghe che larghe, ottuse, con denti acuti, pagina superiore glauca, la inferiore con squammette argentee, le superiori astate*. Fiori *disposti in* Spighe *panicolate nude*. Antere *gialle*. Calici *grandi 3-lobi nella cima*. Schult. *l. c.*

4. *A. triangularis*. (Dreieckige M.) A. triangolare.

Fusto erbaceo quasi giacente, foglie triangolari-astate quasi interissime, frutto con calici triangolari quasi dentati e 2-mucronati nel disco. *W. Sp. pl.*

Nasce nei Muri *e nei* Rovinazzi bagnati dall'acqua salsa; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

5. *A. patula*. (Ausgebreitete M.) A. patente.

Fusto erbaceo patentissimo, foglie triangolari-astate acuminate, quasi dentate, frutto con calici rombei denticolati nella cima e quasi muricati nel disco. *Röhl. germ.* II *p.* 192. *Schult. aust.* I *p.* 460.

A. procumbens, Caule herbaceo patulo, folia triangulari-lanceolata, calic. sem. triangularibus acutis margine et disco dentatis. *Pers. l. c.*

Nasce negli Orti *e nei luoghi* coltivati; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta annuale.

ACER. (Ahorn) Acero.

Hermaph. *Calice* 5-fido. *Corolla* di cinque petali. *Stami* otto. *Pistillo* uno. *Samar.* 2-3 monosperme terminate da un'ala.

Masc. *Calice* 5 fido. *Corolla* 5-petala. *Stami* otto.

A. campestre. (Feld A.) A. dei campi.

Foglie 5-lobe interissime, con i lobi maggiori ottusi, obsolete quasi sinuate, corimbi eretti. *Röhl. germ.* II *p.* 242. *Schult. aust.* I *p.* 602.

A. fol. 5-lobis obtusis glabris, racemis erectis, cortice tuberoso rimoso. *Pers. Syn.* I *p.* 417.

Nasce nel Lido *ed in* Campalto; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta fruticosa.

DIOECIA

FICUS. (Feigenbaum) Fico.

Ricettacolo comune turbinato carnoso connivente con fiori contenuti nell'interno. *Fiori* maschi e femmine o nello stesso individuo, o in individui diversi.

Masc. *Calice* tripartito. *Corolla* o. *Stami* tre.

Femm. *Calice* 5-partito. *Corolla* o. *Pistillo* uno. *Seme* uno chiuso dal calice persistente quasi carnôso.

F. Carica: (Gemeine F.) F. comune.

Foglie cuoriformi 3-5 lobe repando-dentate, lobi ottusi, pagina superiore scabra, la inferiore pubescente, ricettacoli piriformi glabri. *Pers. Syn.* II *p.* 608. *Röhl. germ. p.* 541.

Nasce nei Treporti *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed è* pianta arborea.

FINE DELLE PIANTE FENEROGAME.

CRIPTOGAMIA

FILICES.

EQUISETUM. (Schachtelhalm) Equiseto.

Fruttificazione terminale, conica, composta di corpicciuoli chiodiformi, sotto il capo dei quali vi è una serie d' *Invogli* fatti a cartoccio, membranosi che si aprono longitudinalmente dal lato interno, e sono pieni di globetti verdastri sferici muniti di quattro appendici settiformi avvoltate intorno ai globetti in istato di umidità, distese ed aperte in croce in istato di siccità. *Savi*.

1. *E. arvense*. (Acker S.) E. dei campi.

Scapo fruttifero nudo; fronda sterile verticillato-ramosa decumbente. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1288. *Röhl. germ.* III *p.* 14.

Nasce in Campalto *ed intorno* Malgera *nei* campi; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta perenne.

2. *E. palustre*. (Sumpf S.) E. paludoso.

Fusto semplice ramoso glabro, rami 5-goni un poco scabri dritti, guaine setacee moltofesse, con denti patenti e scariosi nel margine, amento terminale bislungo. *Röhl. germ. l. c. p.* 15.

E. Caule angulato, frondibus simplicibus. *Lin. Sp. pl. Gmel. Syst. l. c.*

Nasce nei Prati umidi; *fiorisce nei mesi di* Giugno e Luglio, *ed* è pianta perenne.

MARSILEA. (Vierblatt) Quadrifoglio.

Fruttificazione radicale. *Invoglio* comune doppio, gl'interni ovvero proprj 14-18 disposti in due serie, in ogni serie 7-9. *Antere* e *Germi* attaccati al lato esterno dell'invoglio interno.

M. quadrifolia. (Gemeines V.) O. comune.

Marsilea. *Röhl. germ.* III *p.* 26. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1322.

Lenticula palustris quadrifolia. *Bauhin. Histor.* III *p.* 785 cum icone.

Nasce non lungi da Malghera *nei luoghi* acquosi; *fiorisce nei mesi di* Giugno e Luglio, *ed* è pianta perenne.

SALVINIA. (Salvinie) Salvinia.

Fruttificaz. radicale. *Invogli* fruttiferi doppii uniloculari contenenti alcuni *germi* ed altri genitali maschi sopra un ricettacolo colounare.

S. natans. (Gemeine S.) S. nuotante.

Salvinia. *Röhl. germ.* III *p.* 17.

Marsilea natans. *L. Sp. pl. Gmel. Syst. Nat.*

Nasce comunemente in Campalto *ed intorno* Malghera *nei* Fossi; *fiorisce nella* State; *ed* è pianta perenne.

CETERACH. (Ceterach) Cetracca.

Casselle circondate da un *anello* elastico disposte in *sori* lineari traversali nella pagina inferiore della fronda, senza *coperchio*.

C. officinarum. (Gebräuchliches C.) C. officinale.
Fronde pennatofesse con lobi rotondati quasi eguali, pagina inferiore paleacea. *Röhl. german.* sub Grammitis Ceterach. *Swarz.*
Asplenium (*Ceterach*) Frondibus pinnatifidis, laciniis alternis confluentibus obtusis. *Lin. Spec. pl. Gmel. System. Natur.* II *p.* 1801. *Savi mat. med. t.* 2.
Asplenium s. Ceterach. *Bauh. Hist.* III *p.* 749 cum icone. *Barr. ic. t.* 1043.
Nasce sopra i tetti *e sopra i* muri *nei luoghi* secchi; *fiorisce la* State, *ed è* pianta perenne.

ASPIDIUM. (Waldfarrn) Aspidio.
Casselle circondate da un *anello* elastico disposte in *sori* rotondi nella pagina inferiore della *fronda* con *coperchio* caduco.

1. *A. Thelypteris*. (Sumpf W.) A. paludoso.
Fronde quasi bipennate con penne pennatofesse interissime ritorte nel margine, sori nel margine finalmente confluenti. *Röhl. germ.* III *p.* 25.
Polypodium (*Thelypteris*) Fronde bipinnata, pinnis pinnatifidis integerrimis subtus undique polline tectis. *Lin. Sp. pl. Syst. Nat. a Gmel.* II *p.* 1311.
Filix mollis s. glabra vulgari mari non ramosa accedens. *Bauh. Hist.* II *p.* 730.

Filix fontis admirabilis ad marem vulgarem non ramosam accedens. *Bauhin. Histor.* III *p.* 731.

Filix tenuissime et profunde dentata. *Bauh. Historia* III *p.* 149 cum icone.

Filix minor non ramosa. *Bauh. Hist.* III *p.* 731 cum icone.

Nasce in Chioggia *nei luoghi* umidi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed* è pianta perenne.

2. *A. Filix mas.* (Männlicher E.) A. maschio:

Fronda bipennata bislunga, penne pennate bislunghe alterne, pennole bislunghe ottuse intaccate, seghettate nella cima, sori approssimati alla costa media, stipite squammoso. *Röhl. l. c.*

Polypodium (*Filix mas.*) *Lin. Sp. Gmel. Syst. Nat. Savi mat. med. t.* 54.

Nasce nel Lido *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *ed* Agosto, *ed* è pianta perenne.

ASPLENIUM. (Streinfenfarru) Aspleno:

Casselle circondate da un *anello* elastico disposte in *sori* lineari traversali nella pagina inferiore della *fronda*, con un *coperchio* che si apre verso la costa media.

1. *A. Trichomanes.* (Brauner S.) A. bruno.

Fronde penuate con penne subrotonde intaccate. *Lin. Röhl. germ.* III *p.* 29. *Savi mat. med. t.* 16.

Nasce nei muri antichi; *fiorisce nei mesi di* Luglio *sino* Agosto, *ed* è pianta perenne.

2. *A. Ruta muraria*. (Mauer S.) A. murale.
Fronda alternativamente composta, foglioline cuneiformi quasi trilobe intaccate. *L. Röhl. germ.* III *p.* 29.
Nasce come la precedente:

MUSCI

TRICHOSTOMUM. (Haarmund) Tricostomo.
Peristoma semplice dentato con denti fessi quasi sino alla base. *Frutto* terminale con *coperchio* berettiforme.

T. pulvinatum. (Polster H.) T. pulvinato.
Tronco dritto ramoso, foglie dritte ovato-lanceolate con punta lunga capillare, teca subrotonda ritorta, coperchio restiforme. *Röhl. germ.* III *p.* 61.
Bryum (*pulvinatum*) Surculo ramoso, foliis oblongis piliferis, capsulis subrotundis nutantibus, calyptris minutis. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1333.
Nasce sopra i tetti *nei luoghi* ombrosi; *fiorisce nei mesi di* Febbraro *e* Marzo, *ed è* pianta perenne.

TORTULA. (Schraubenmoos) Tortiglio.
Peristoma cigliato con cigli connati alla base. *Frutto* terminale.

T. ruralis. (Feld S.) T. campestre.
Tronco ramoso, foglie ovate bislunghe piliferi patenti richinate, tecaforo dritto, teca dritta quasi

cilindrica, coperchio lungo conico: *Röhl. germ.* II *p.* 78.

Bryum (*rurale*) Surculo ramoso, foliis reflexis obovatis obtusis apice piliferis, capsulis cylindricis operculis conicis acutis. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1335.

Nasce nei muri *e nei luoghi* sterili; *fiorisce nei mesi di* Febbraro *e* Marzo, *ed è* pianta perenne.

BARBULA. (Bartmoos) Barbola.

Peristoma cigliato con cigli liberi alla base.

B. muralis. (Mauer B.) B. murale.

Tronco ramoso, foglie bislunghe spatolate, pilifere nella cima, patenti, tecaforo dritto, teca dritta quasi cilindrica, coperchio conico acuminato. *Röhl. germ.* III *p.* 78.

Bryum (*murale*). Surculo brevissimo subdiviso, foliis ovatis acutis apice piliferis, capsulis oblongis operculis conicis acutis. *Gmel. System. Natur.* II *p.* 1333.

Nasce sopra i muri *e sopra i* tetti; *fiorisce nei mesi di* Febbraro *e* Marzo, *ed è* pianta perenne.

LESKEA. (Strauchmoos) Surcolaria.

Peristoma dentato-cigliato, denti sedici ed altrettanti cigli cuniformi e connessi alla base da una membrana. *Frutto* laterale.

L. complanata. (Flaches S.) S. piana.

Surcolo serpeggiante, diviso, pennato, con penne filiformi nella cima, foglie acuminate enervi inte-

rissime, teca dritta ovata, coperchio conico acuminato un poco obliquo. *Röhl. germ.* III *p.* 85.

Hypnum (*complanatum*). Frondibus complanatis ramosissimis, foliis distichis imbricatis ovato-obtusis complicatis, capsulis ovatis, operculo conico. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1341.

Nasce nei tronchi *degli* alberi; *fiorisce nei mesi di* Febbraro *e* Marzo, *ed è* pianta perenne.

HEPATICAE

MARCHANTIA. (Sternlebermoos) Marcanzia.

Ricettacolo comune peduncolato, peltato, laciniato, con casselle sotto le lacinie. *Cassella* ovata a rovescio uniloculare, che apresi nella cima per lo più in otto lacinie ritorte.

M. polymorpha. (Vielgestaltiges S.) M. poliforme.

Fronda lobata ottusa, ricettacolo femmineo raggiato, il maschio picciolato. *Röhl. germ.* III *p.* 131. *Ejusd. tom.* I *p.* 295. *t.* 4. *f.* 24. 25.

M. Surculis obtuse lobatis, capsulis sternatis decemfidis. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1353.

Hepatica secunda. *Zann. Ven. p.* 284. *t.* 308. minus bona.

Nasce nei luoghi ombrosi *ed* umidi; *fiorisce nei mesi di* Marzo *ed* Aprile, *ed è* pianta perenne.

ALGAE

FUCUS. (Tang) Fuco.

Spore disposte in sporangi aggregati immersi nella sostanza della pianta e muniti di pori muciflui, contenenti la fruttificazione.

1. *F. Acinaria*. (Beeren T.) F. Acinaria.

Fusto radicato terete-compresso spinuloso ramosissimo, foglie sessili lineari-lanceolate intere, fruttificazioni globoso-vesiculose inani peduncolate. *Wulf. Crypt. aquat. p.* 30.

F. Caule filiformi ramoso, foliis linearibus integerrimis, vesiculis globosis peduncolatis. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1380.

Acinaria Imperati. *Ginan. op. post.* I *p.* 18. *tab.* 16. 17. 18. 19. *Donati marin. p.* 35. *t.* 4. *f.* 1.

Nasce nel Lido *e nel* Cavallino *nel* mare.

2. *F. vesiculosus*. (Blasen T.) F. vesichioso.

Fronda piana dicotoma bruna con vesiche aerifere sparse, fruttificazione terminale sessile tubercolosa. *Röhl. germ.*

F. Fronde plana dicothoma costata integerrima, vesiculis axillaribus geminis, terminalibus tuberculatis. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1280.

F. Fronde repetito-dichotoma, marginibus integra, caule medium folium transcurrente, vesiculis terminalibus ovalibus faretis verrucosis. *Wulf. l. c. p.* 34.

Quercus marina prima. *Ginan. op. post.* I *p.* 21. *t.* 20. *fig.* 39.

Virsoides. *Donati marin. p.* 31. *t.* 4.

Nasce nel mare *sopra le* pietre, *specialmente intorno* Fusina *e nel luogo del* Forte *di* S. Giuliano *non lungi da* Malghera.

3. *F. ceranoides*. (Hornartiger T.) F. corniforme.

Fronda quasi coriacea, lineare, dicotoma, interissima enerve, piana, più augusta alla base, carnea ovvero porporea, fruttificazione terminale bifida tubercolosa. *Röhl. germ.* III *p.* 137.

F. Fronde plana dichotoma integerrima punctata lanceolata, vesicolis tuberculatis bifidis terminalibus. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1380.

F. Fronde plana subcoriaceo-membranacea repetito-dichotoma, avenia, apicibus dichotomiarum integerrimis oblongo-ovatis. *Wulf. l. c. p.* 37.

Nasce al Cavallino *nel* mare.

4. *F. lacer*. (Zerrissener T.) F. lacero.

Fronda piana quasi coriaceo-membranacea, dicotoma senza ordine, avenia, cime dei dicotomi lacero-laciniate. *Wulf. l. c. p.* 38.

F. ceranoides β lacer. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1380.

Nasce come la precedente.

5. *F. concatenatus*. (Kettenförmiger T.) F. catenato.

Fronda filiforme ramosissima, rametti dicotomi, vesichette monoliformi distanti innate, foglie lesini-

formi. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1382. *Roth. Catal. bot.* II *p.* 159.

F. Caule coriaceo-lignescente, tuberoso, erecto, ramosissimo, ramis elongatis paniculatis, aphyllis, ramorum virgis, vesicas oblongo-ovales mucifluas, serius tuberculosas laxe concatenantibus. *Wulf. l. c. p.* 49.

Cremenei Istris abrotani vel Thymi foliis. *Bauhinus Hist.* III *p.* 798 cum figura mala.

Abiete marino di Teofrasto. *Ginan. op.* I *p.* 17. *tab.* 15.

Nasce come la precedente.

CERAMIUM. (Hornfaden) Ceranio.

Casselle accrescinte nella superficie dei fili membranaceo-cartilaginei contenenti le spore.

A. *Fili conformi*, ovvero *inarticolati*.

1. *C. longissimum*. (Längster H.) C. lunghissimo.

Fili conformi tereti, filiformi, cartilaginei dicotomi, rami e rametti quasi unilaterali, prolungati ed assottigliati in cima ed alla base, casselle emisferiche, laterali, sessili e sparse. *Roth. Catal. bot. fasc.* III *p.* 116. *Röhl. germ.* III *p.* 139.

Fucus. Cartilagineus, caule erecto terecti, ramis longissimis globulis lateralibus sessilibus. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1384.

Fucus. Caule brevi gracili terete cartilagineo, ramosissimo, ramis elongatis rectis chordaeformibus, rariter et vage ramulosis, tuberculus spheroidicis

umbilicato-porosis. *Wulf. Cript. aquat. pag.* 48.

β. *C. flagellare.* Fili ramosi più densi, rami più brevi.

Fucus (*confervoides*). *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1384. *Wulf. l. c. p.* 45.

Nasce dentro e fuori della città *nelle* Lagune *e nei* Canali.

2. *C. uniforme. Nob.* (Finförmiger H.) C. uniforme.

Fili tereti conformi, cartilaginei, rami dritti quasi fastigiati e quasi dicotomi, alternamente prolungato-ramulosi, eguali nelle due parti, gracili albido-flavescenti. *Nob.*

Fucus. Caule tereti cartilagineo, ima a basi ramoso, ramis erectis subfastigiatis, alternatim elongato-ramulosis, utrisque tereti filiformibus, subsimplicibus, apice furcatis. *Wulf. Crypt. p.* 61.

Nasce nei Treporti *e nel* Lido *nel* mare.

3. *C. gigartinum.* (Zahnästiger H.) C. dentiforme.

Fili conformi compressi, cartilaginei, lineari, quasi dicotomi, colla superficie nuda, rami quasi fastigiati, rametti brevi dentiformi quasi distichi, casselle nei rami laterali e terminali sessili, globose, nude. *Roth. Cat. fasc.* III *p.* 109.

Fucus. Fronde cartilaginea filiformi-compressa dichotoma, globulis pedunculatis terminalibus subjacente arista. *Gmel. Syst. Veg.* II *p.* 1386.

Nasce nel Porto *del* Lido *nel* mare *sopra i* sassi.

4. *C. attenuatum.* (Verdünter H.) C. assottigliato.

Fili conformi tereti, filiformi, ramosi, cartilaginei, rami e rametti alterni patenti, in cima ed alla base assottigliati, casselle laterali, sessili subrotonde, trasparenti. *Nob.*

Nasce a S. Erasmo *nel* mare.

5. *C. plicatum*. (Verwickelter H.) C. piegato.

Fili conformi, tereti, filiformi, cartilaginei, diafani, ramosissimi, implicati, rami e rametti sparsi, casselle laterali remquasime, otissi peduncolate. *Nob.*

C. Filamentis, cartilagineis, teretibus setiformibus, diaphanis ramossimis, implicatis, continuis, capsulis lateralibus, remotissimis subsessilibus. *Roth. Cat. bot. fasc.* II *p.* 162. *Röhl. germ.*

Fucus. Capillaris uniformis ramosissimus subdiaphanus. *Gmel. Syst. Veg.* II *p* 1385.

Nasce a S. Erasmo *nei* Canali.

6. *C. musciforme*. (Moosartiger H.) E. muschiforme.

Fili conformi, compressi lineari-filiformi, ramosi membranaceo-coriacei, rami e rametti alterni, rametti ultimi dicotomi, il fusto ed i rami coperti nel margine di ciglie, casselle . . . . *Nob.*

Fucus. Caule ex tereti plano-compresso, membranaceo-coriaceo, subfiliformi, ramosissimo, ramis divaricato-patentissimis setaceis una cum caule ciliis marginalibus mollibus obsitis. *Wulf. Cript. p.* 47.

Nasce al Cavallino *nel* mare.

7. *C. spinosum*. (Dorniger H.) C. spinoso.

Fili conformi tereti, filiformi cartilaginei ramosissi-

mi, rami sparsi, quasi opposti qualche volta, rametti ottusi verticillato terni. *Nob.*

Fucus. Aphyllus cartilagineus ramosus denticulis verticillato-ternis. *Gmel. Syst. Veg.* II *p.* 1386.

Nasce a S. Erasmo *nei* Canali.

8. *C. setaceum*. (Borslemförmiger H.) C. setaceo.

Fili conformi tereti filiformi, coriacei, ramosi, rami alternativamente pennati, rametti semplici ovvero un poco ramosi nella cima, casselle peduncolate bislunghe. *Nob.*

Fucus. Caule gracili terete, coriaceo, alternatim pinnulatis, pinnulis setaceis subsimplicibus, furculatis. *Wulf. Crypt. aquat. p.* 59.

Nasce a S. Erasmo *nel* mare *sopra le* pietre.

B. *Fili spuriamente ginocchiati.*

9. *C. torulosum*. (Wulstartiger H.) C. toruloso.

Fili quasi membranacei, tubulosi, tereti, torulosi, ramosissimi, spuriamente ginocchiati, dalle strette quasi regolari, rami dicotomi e verticillati, casselle nei rami supremi verticillate, conico-troncate, sessili. *Roth. Cat. bot. fasc.* III *p.* 125.

Nasce nel Cavallino *nel* mare.

C. *Fili ginocchiati, ginocchi fasciati.*

10. *C. elongatum*. (Werlängerter H.) C. prolungato.

Fili ginocchiati filiformi, cartilaginei, tereti opaci dicotomi con rami e rametti setacei prolungati, diffusi,

ginocchi fasciati sottili opaci, articolazioni la metà più brevi del diametro, quasi pellucide, reticolato-venose, casselle racemose laterali pedicellate subrotonde nude. *Röth. Cat. fasc.* III *p.* 128.

Nasce a S. Erasmo *ed ai* Treporti *nel* mare *e sopra i* sassi.

11. *C. inflexum*. (Gebogener H.) C. piegato.

Fili ginocchiati filiformi, tereti, cartilaginei, opaci, flessili, densamente ramosi, rami setacei sparsi approssimati, quasi distichi, insieme con i rametti capillari, in diversi modi piegati, ginocchi fasciati angusti quasi elevati, articolazioni eguali al diametro della lunghezza striate, casselle laterali, sessili, sparse, emisferiche. *Roth. Cat. fascic.* III *p.* 131. *Röhl. germ.*

Fucus (*flexilis*). Caule gracili terete cartilagineo alternatim supradecomposito-ramoso, ramis patentissimis inordinate ramificatis. *Wulf. Cript. p.* 60?

Nasce nel Porto *del* Lido *sopra i* sassi.

12. *C. hirsutum*. (Kurzhaariger H.) C. irsuto.

Fili ginocchiati filiformi, tereti, quasi cartilaginei, irsuti, ramosissimi, rami alternativamente ricomposto-pennati, pennule alterne fascicolato-moltofesse, ginocchi fasciati oscuri, articolazioni quasi eguali al diametro della lunghezza, trasparenti, casselle ascellati solitarie peduncolate, ovate, che si aprono nella cima. *Roth. Cath. fasc.* III *p.* 137. *Röhl. germ.*

C. hirsutum. *Roth. Cath. fasc.* II *p.* 169. *t.* IV.

Nasce nel Lido *e nei* Treporti *nel* mare.

13. *C. Wulfenii* (Wulfens H.) C. di Wulfen.

Fili ginocchiati filiformi, tereti quasi cartilaginei, quasi opaci, densamente ramosi, rami alternativamente ricomposto-pennati, rametti pennatofessi setacei quasi incurvi, ginocchi fasciati angustissimi oscuri, articolazioni la metà più brevi del diametro, casselle laterali sessili quasi diafane, ovate a rovescio. *Roth. Cat. bot. fasc.* III *p.* 140. *Röhl. germ.*

Fucus (*fruticulosus*). Caule gracili coriaceo-terete, supradecomposito-ramosissimo diffuso, ramis subsetaceis alternatim laxe ramulosis, ramulis exiguis subpinnato denticulatis. *Wulf. Crypt. aquat. p.* 56.

Nasce al Cavallino *nel* mare.

14. *C. confervoides*. (Konfervenartiger H.) C. confervoide.

Fili ginocchiati capillacei, tereti, membranacei, densissimi, ramosissimi, ineguali, rami e rametti alterni, fascicolati, ginocchi fasciati quasi contratti opaci, articolazioni eguali al diametro della lunghezza, subrotondi pellucidi, casselle laterali, peduncolate, ovali-acuminate. *Roth. Cat. fasc.* III *p.* 148.

C. confervoides. *Roth. l. c. fasc.* I *p.* 151. *t.* 8. *fig.* 4. *Röhl. germ.* III *p.* 143.

Conferva (*littoralis*). Filamentis ramosissimis elongatis scabriusculis. *Gmel. Syst. Vegt.* II *p.* 1393.

Nasce nella Laguna *a* S. Marta, *sopra altre piante marine*.

15. *C. virgatum*. (Ruthenförmiger H.) C. verghiforme.
Fili ginocchiati filiformi, tereti quasi cartilaginei, ineguali ramosissimi, rametti setacei, forcati nella cima, ginocchi fasciati, più o meno ristretti, articolazioni quasi tre volte più lunghe del diametro, più o meno inflate quasi trasparenti, casselle laterali solitarie, remote, sessili quasi globose ed invogliate alla base. *Roth. Cat. bot.* III *p.* 152. *Röhl. germ.* III *p.* 144.
C. virgatum. *Roth. l. c. fasc.* I *p.* 148. t. 8. *f.* 1.
Nasce nel Lido *e nei* Treporti *nel* mare.

16. *C. diaphanum*. (Durchscheinender H.) C. diafano.
Fili ginocchiati, capillari, tereti, membranacei, ineguali, repetito-dicotomi ramosissimi, rami fastigiati, rametti ultimi conniventi-tenagliformi, ginocchi fasciati un poco grossi glabri, opaci, articolazioni cilindracee, trasparenti, cinque volte più lunghe del diametro, casselle globose, sessili, solitarie, in fine lateralmente invogliate. *Roth. Cat. bot. fasc.* III *p.* 154. *Röhl. germ.* III *p.* 144.
Conferva (*diaphana*). Filamentis capillaribus geniculatis, meras per dichotomia elongatas, ramosissimis, ertimis breviter conniventi-forcipatis, geniculis glabris. *Wulf. Crypt. p.* 26.
β *C. elegans*. *Roth l.c. fasc.* I *p.* 224.
γ *C. fastigiatum*. *Roth. l. c. fasc.* III *p.* 155.
Conferva (*fastigiata*). Filamentis plus quam capillaceis, mollissimis, geniculatis, ramosissimis, ramis repetitodichotomis fastigiatis, articulis quam genicula duplo longioribus. *Wulf. Cript. aquat. p.* 28.

Nasce nel Porto *del* Lido *sopra i* sassi *e sopra altre piante.*

17. *C. fastigiatum*: (Gleichhoher H.) C. fastigiato.
Fili ginocchiati capillari, tereti cartilaginei, quasi eguali ramosissimi, rametti fastigiati fascicolati, i terminali brevissimi forcolati, ginocchi fasciati quasi pellucidi, articolazioni la metà più brevi del diametro, casselle laterali solitarie sessili, subrotonde nude. *Roth. Cat. fasc.* III *p.* 157. *Röhl. germ.*
Nasce come la precedente.

CONFERVA. (Konferve) Conferva.
Tubi ovvero *fili* erbacei, contenenti nelle parieti interne, le *spore* inservienti alla propagazione.

A. TUBULOSE.

a. *Inarticolate.*

1. *C. intestinalis.* (Darmförmige K.) C. intestiniforme.
Tubi semplici inarticolati inflati sinuosi flavo-viridi.
C. intestinalis. *Roth. Cat. fasc.* II *p.* 159. *Röhling germ.* III *p.* 147.
C. Filamentis simplicibus cylindraceo-tubulosis inarticulatis, serius inaequaliter per omnem longitudinem tuberose intumescentibus. *Wulf. Crypt. aquat. p.* 13.
Nasce comunemente nei Canali.

b. *articolate per* stretture.

2. *C. crinita.* (Haarige K.) C. crinita.
Tubetti filiformi, tereti, lunghissimi, per remoti

intervalli, semi strangolato-articolati, ramosi, rami sparsi dalla base tubercolosa capillari, lunghi semplici. *Roth. Cat fasc.* III *p.* 174.

C. crinita. *Roth. Cat. bot. fasc.* I *p.* 162. *t.* 1. *fig.* 3. *Röhl. germ.*

C. Filamentis filiformis-tubulosis, strictis laxissime semistrangulato-articulatis, vage ramulosis, ramulis setaceo-tubulosis, caetera homogeneis. *Wulfen Crypt. aquat. p.* 15.

Nasce nelle Lagune.

3. *C. compressa.* (Zusammengedrückte K.) C. compressa.

Tubetti semplici e ramosi varj, semistrangolato-articolati compressi. *Roth. Cat. fasc.* III *p.* 175. *Röhlin germ.* III *p.* 148.

C. Filamentis tereti-tubulosis, semistrangulato-articulatis, vage parceque ramosis, articulis oblongo-ovalibus. *Wulf. Crypt. aquat. p.* 14.

Ulva (*compressa*). Tubulosa, ramosa, compressa. *Gmel. Syst. Veget.* II *p.* 1391.

Nasce nella Laguna *sopra i* Sassi *e sopra le* Conchiglie.

4. *C. clathrata.* (Gegitterte K.) C. clatrata.

Tubetti setacei tereti continui, sparsamente ramosi, venoso-clatrati, per intervalli indeterminati semistrangolato-quasi articolati, rami e rametti quasi unilaterali capillari divaricati. *Roth. Catal. bot. fasc.* III *p.* 175. *Röhl. germ.* III *p.* 148.

Nasce nel Porto *del* Lido *sopra le pietre.*

B. FILAMENTOSE.

α Continue.

* *Ramose.*

5. *C. tenax.* (Zähe K.) C. tenace.

Fili continui, filiformi, plicato-rugosi alla base ramosissimi, rami setacei sparsi, ristretti, inferiormente quasi ramosi, superiormente fascicolati. *Roth. Cat. bot. fasc.* III *p.* 182.

Nasce dentro della Città *nei* Canali.

β articolate, ginocchi spuri.

a *annullate.*

6. *C. Flos aquae.* (Wasserblüthe) C. Fior d'acqua.

Fili semplici continui, tenuissimi, dritti, che nuotano a guisa di membrana sopra l'acqua, zone interstiziali pellucide due volte più larghe degli anelli dei sporangi tenuissimi appena visibili. *Roth. Cat. bot. fasc.* III *p.* 192. *Röhl. germ.* III *p.* 151.

Nasce in Campalto *nei* Fossi *di acqua dolce.*

b *Utricoli matricali.*

* *Ramose.*

7. *C. fracta.* (Zerbechliche) K. C. fratta.

Fili ramosissimi, densissimi, capillari, sottilissimi, spuriamente ginocchiati, rami e rametti alterni divaricati, utricoli formanti articoli, cilindrici lunghissimi finalmente ovati. *Roth. Cat. bot.* III *p.* 130. *Röhl. germ.* III *p.* 155.

Nasce nella Laguna *non lungi da* S. Secondo.

8. *C. glomerata.* (Knäuel K.) C. glomerata.

Fili ramosissimi capillacei, spuriamente ginocchati, rami alterni, rametti ultimi fastigiati, brevi, dritti, semplici, quasi unilaterali, utricoli matricali formanti articoli cilindracei, quattro volte più lunghi che larghi. *Roth. Cat. bot.* III *p.* 235. *Röhl. germ.* III *p.* 155.

β *C. marina*.

Nasce abbondevolmente nel Porto *del* Lido *in* mare.

9. *C. rupestris*. (Felsen K.) C. rupestre.

Fili ramosissimi fascicolati, capillacei drittissimi vergati, ottusi nella cima, spuriamente ginocchiati, rami appoggiati, utricoli matricali somiglianti agli articoli, cilindracei dall'una e dall'altra parte, un poco ristretti, quattro volte più lunghi del suo diametro. *Rot. Cat. bot. fasc.* III *p.* 243. *Röhling germ.* III *p.* 156.

C. filamentis ramosissimis viridibus. *Gmel. Syst. Vegt.* II *p.* 1395.

β *C. glauca*. Rametti quasi fastigiati ed assottigliati nella cima. *Roth. l. c.*

Nasce nei Canali *intorno* S. Marta.

γ *Articolate di ginocchi veri.*

a *Fasciate*.

* *Semplici*.

10. *C. Linum*. (Flachs K.) C. Lino.

Fili semplici filiformi lunghissimi, un poco rigidi, eguali, piegati in dentro, ginocchiati, ginocchi fasciati sottili trasparenti, articolazioni eguali al

diametro ristretti e rugosi per siccità. *Roth. Cat. bot. fasc.* III *p.* 257.

C. Filamentis simplicissimis tereti-filiformibus longissimis geniculatis, articulis geniculisque breviter annularibus, aequalibus. *Wulf. Crypt. aquat. p.* 19.

Conferva marina di filamenti lunghi Lino acquatico, *Ginan. op. post.* I *p.* 27. *t.* 33. *f.* 72.

Nasce nel Lido *in* mare, *e specialmente nelle* Lagune *di* Chioggia:

11. *C. capillaris.* (Haarförmige K.) C. capillare.

Fili semplici capillari flessili, eguali, ginocchiati, ginocchi fasciati sottili quasi trasparenti, articolazioni la metà più lunghe del diametro, per siccità alternativamente compressi: *Roth. Cat. bot.* III *p.* 260. *Röhl. germ.* III *p.* 260.

C. Filamentis geniculatis simplicibus, alternatim compressis. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1393.

C. Filamentis simplicissimis capillaribus, longissimis geniculatis, articulis cylindricis, duplo quam genicula longioribus. *Wulf. Crypt. aquat. p.* 19.

Nasce comunemente nella Laguna *intorno* San Secondo.

12. *C. setacea.* (Borstenförmige K.) C. setacea.

Fili largamente ramosi, dicotomi, setacei, drittissimi quasi lubrici, eguali, ginocchiati, rami prolungati quasi divisi, ginocchi fasciati, angustissimi, pellucidi, articolazioni cilindracee opache sanguinee, sei volte più lunghe del diametro. *Roth. Cat. bot.* III *p.* 278.

Nasce nei Canali *a* Sant'Erasmo *sopra le* Conchiglie *e sopra altre* piante.

13. *C. subdivisa*. (Armästige K.) C. subdivisa.

Fili superiormente quasi ramosi, setacei, dritti, quasi ineguali, ginocchiati, ginocchi fasciati, molto tenuissimi, articolazioni cilindracee, sei volte più lunghe del diametro, spore cilindriche un poco grosse. *Roth. Cat. bot.* III *p.* 287. *Röhl. germ.*

Trovasi nella Laguna *non lungi da* S. Secondo.

14. *C. ciliata*. (Gewimperte K.) C. ciliata.

Fili repetito-dicotomi setacei, membranacei, ginocchiati, rametti ultimi piegati in dentro conniventi-tenagliformi, ginocchi fasciati opaci, circondati da peli, articolazioni trasparenti appena più lunghe del diametro. *Roth. Cat. bot.* III *p.* 295. *Röhl. germ.*

C. (*pilosa*). Filamentis, ramosis, dichotomis, setaceis, ramulis forcipatis apice inflexis, geniculis annularibus, obscuris pilosis, articulis cylindricis pellucidis glabris. *Roth. l. c. fasc.* II *p.* 225. *t.* V *fig.* 2.

Nasce sopra le Pietre *nel* Porto *del* Lido *ed al* Cavallino *sopra altre piante marine.*

b *Verticillate.*

15. *C. Myriophyllum*. (Tausendblättrige K.) C. millefoglia.

Fili ramosi setiformi cartilaginosi, ginocchiati, insieme coi rami divaricati, cinti ai ginocchi da ra-

metti verticillari, capillari, forcati, incurvi, due volte più lunghi degli articoli. *Roth. Cat. bot.* III *p.* 312.

Fucus (*verticillatus*). Caule tereti filiformi cartilagineo, supradecomposito-ramoso, ramis subdichotomis diffusis, setulis homogeneis multifidis verticillatim obtectis. *Wulf. Crypt. aquat. p.* 41. *t.* 1. bona.

Nasce nel Lido *in mare.*

ULVA. (Watte) Ulva.

Spore accresciute sotto l'epidermide, d'una membrana diffusa e trasparente, e specialmente nel margine.

A. *Fronde distinte alla base.*

1. *U. Lactuca.* (Salat W.) U. Lattuca marina.

Fronde membranacee, più da una base, distiute bislunghe, piane, quasi ondate, inferiormente attenuate, verso la cima dilatate laciniate. *Roth. Cat. bot.* II *p.* 245. *Röhl. germ.* III *p.* 170.

U. palmata prolifera, membranacea, ramentis angustis. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1391.

U. Frondibus caespitose aggregatis, rectis, oblongis anguste decurrentibus, superiora versus latescentibus, serius laciniatis, proliferisve. *Wulf. Crypt. aquat. p.* 3.

Nasce comunemente dentro e fuori della Città *nei* Canali.

2. *U. purpurea*: (Purpurrothe W.) U. porporea:
Fronde membranacee solitarie, bislungo-lanceolate, piane, col margine intero, ondate. *Roth. Cat. bot. fasc.* II *p.* 245. *Röhl. l. c.*
U. purpurea. *Roth. Cat. bot. fasc.* I *p.* 209. *tab.* 6. *fig.* 1.
U. (*sericea*). Frondibus subaggregatis simplicibus oblongo-subovatis, planis, sessilibus, ora marginis undulato plicatis. *Wulf. Crypt. aquat. p.* 5.
Nasce comunemente nei Canali *della* Città; *si trova nei mesi di* Decembre *sino* Febbraro.

3. *U. lanceolata*. (Lanzettblättrige W.) U. lanceolata;
Fronde membranacee solitarie, cespitose, lanceolate, piane, interissime, dall'una e dall'altra parte annuate. *Roth. Cat. bot. fasc.* II *p.* 246. *Röhl. germ.* III *p.* 170.
U. fronde lineari aut simpliciter lanceolata integra, plana, in filum decurrente, serius margine flexuosa. *Wulf. Cript. aquat. p.* 1.
Nasce ael Porto *del* Lido *sopra le* Pietre.

4. *U. Linza*. (Zusammengelegte W.) U. raddoppiata.
Fronde membranacee, solitarie, bislunghe, raddoppiate, ondate, bullate. *Roth. Catal. bot. fasc.* II *p.* 246.
Nasce nella Città *nei* Canali.

5. *V. dichotoma*. *Nob.* (Gabelige W.) U. dicotoma.
Fronde membranacee, più da una base, congiunte,

dicotome, lineari, piane, ondate nel margine, di color roseo. *Nob.*

U. ramosa. *Huds flor. angl. p.* 476?

Nasce nel mare *a* S. Erasmo.

Fronde *arrivano alla lunghezza di circa un' oncia ed alla larghezza di circa una linea, cespitose, membranacee, di color roseo, dicotome, lineari, piane, ondate nel margine.* Rami *lineari, anche dicotomi, come tutta la fronda trasparenti, ed attaccati fortemente alla carta, nella quale è imposta.*

LICHENES

PARMELIA. (Schüsselflechte) Parmelia.

Tallo polimorfo. *Scutelle* concave elevate sopra il tallo, e coronate da margine libero.

P. parietina. (Stein P.) P. paretina.

Tallo orbicolare a colore di zafferano di sotto più pallido un poco fibroso, lacinie connate appoggiate piane, verso la cima dilatate, rotondate, apoteci nel mezzo concolori, ovvero di colore aranicino, con margine intero. *Röhl. germ. tom.* III *pars* II *p.* 95.

Nasce sopra hli alberi *e sopra i* muri.

CENOMYCE. (Hohlschwammflechte) Cenomice.

Tallo cartilagineo crostaceo folioso laciniato. *Pedunculi* tubulosi ciatiformi semplici e ramosi nella

cima, con e senza apoteci. *Cefalodj* tubulosi per lo più bruni o neri nella cima dei peduncoli.

C. damaecornis. (Dammhirschhornartige H.) C. damecorniforme.

Tallo membranaceo irregolarmente laciniato di sopra giallastro, lacinie moltofesse quasi canalicolate crispe ciliate da peli neri, scodelle turbinate cilindriche dentellate, apotecio marginale picciolo sessile. *Röhl. germ.* III *pars* II *p.* 120.

Nasce nei Treporti *sopra la* terra.

FUNGI

MUCOR. (Schimmel) Muffa.

Ricettacoli membranosi pedicellati globosi prima diafani, in fine opachi. *Semi* nudi quasi coerenti.

1. *M. Mucedo*. (Gemeiner M.) S. comune.

Conferto, stipite semplice, capolini piccoli diventando neri. *Röhl. germ.* III *pars* III *p.* 110.

M. Stipitatus, capsula globosa. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1486.

Nasce nei luoghi umidi *sopra le* frutta, *e sopra il* pane *ec. ec.*

2. *M. herbariorum*. (Kräuter S.) M. erbariola.

Senza stipite, giallastro persistente, cassella globosa sessile, sopra tomento corticoso. *Röhl. germ. l. c. p.* 111.

Nasce sopra le piante asciutte *nei luoghi* umidi.

AGARICUS. (Blätterschwamm) Agarico.

Senza *Volva*. *Cappello* polimorfo. *Foglie* intere ovvero frammischiate da più piccole di rado semplici, ramose.

1. *A. bicolor*. (Zweifarbiger B.) A. bicolore.

Cappello carnoso concavo, rossastro, ovvero bruno piegato in dentro nel margine quasi tomentoso, foglie quasi violacee, stipite grosso un poco tuberoso tomentoso concolore. *Röhl. germ.* III *pars* III *p.* 158.

Si trova, benchè di rado, negli Orti *nei luoghi* ombrosi *nei mesi di* Settembre *ed* Ottobre.

2. *A. campestris*. (Feld B.) A. campestre.

Cappello carnoso piano con squamme brune, stipite corto, anello imperfetto. *Röhl. loc. cit. p.* 220. *Trattin. Fung. p.* 1. *t.* 1. *f.* 2.

A. Pileo convexo canescente maculis piloso-squamosis, lamellis inaequalibus introrsum rotundatis (adulti) rufescentibus, stipite albido recto. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1399.

Nasce nei Letamieri *nel mese di* Settembre.

3. *A. fimetarius*. (Gemeiner B.) A. del letame.

Stipitato, cappello campaniforme lacero, foglie nere lateralmente flexuose. *Linn. Sp. pl.*

Nasce negli Orti *nei luoghi* umidi.

DAEDALEA: (Labyrinthenschwamm) Labirintario.
Cappello smezzato carnoso, suberoso, nella pagina inferiore munito da sinuosità buchiformi, retiforme:

D. quercina: (Eichen L.) L. quercino.
Fungo coriaceo di color ligneo, cappello piccolo rugoso glabro, foglie grandi sinuose ramose. *Röhl. germ.* III *pars* III *p.* 259. *Tratt. Fung. tab.* II *fig.* 3.
Merulius quercinus: Suberoso coriaceus planus villosus, semiorbicularis, annulis diversi colori pictus, venis confer-anastomosantibus ochroleucis flavisve. *Gmel. Syst. Nat.* II *p.* 1431.
Nasce in Campalto *sopra le* Quercie.

BOLETUS. (Löcherschwamm) Boleto:
Cappello polimorfo. *Imenio* poroso da tubi. *Pori e tubi* bislungo-rotondi interi.

1. *B. crispus*. (Krauser L.) B. crispo.
Cappelli imbricati nerastri rugosi, con margine crispo quasi ondato e quasi cartaceo, pori grandetti ineguali argenteo-cinerei. *Röhl. germ.* III *pars* III *p.* 271.
Nasce in Campalto *sopra i* tronchi arborei.

2. *B. fomentarius*. (Zunder L.) B. fomentario.
Smezzato duro, cappello quasi triquetro debole, quasi cordelliforme cinereo, pori in principio bianchi grisei, finalmente quasi neri. *Röhl. loc. cit. p.* 273.

ß *B. pomarius*: Smezzato piccolo; circa un'oncia e mezza largo ed alto, cappello perpendicolare cinereo-brunastro, pori piani nerastri. *Röhl. l. c.*

Nasce come la precedente; ß *sopra i* tronchi *degli* alberi fruttiferi.

FINE.

INDICE.

A

Acer
campestre pag. 251
Achillea
magna „ 217
Millefolium „ 216
Acorus
Calamus „ 95
Agaricus
bicolor „ 279
campestris „ ivi
fimetaris „ ivi
Agrimonia
Eupatoria „ 117
Agrostis
alba „ 16
interrupta „ 15
sylvatica „ ivi
Ajuga
reptans „ 137
Alisma
Plantago „ 100
Allium
angulosum „ 91
carinatum „ 90
sphaerocephalon „ 91
suaveolens pag. 90
Alnus
glutinosa „ 231
Alopecurus
agrestis „ 18
Alsine
media „ 85
Althaea
officinalis „ 169
Amaranthus
Blitum „ 233
hybridus „ 234
prostratus „ ivi
Anagallis
phoenicea „ 56
caerulea „ ivi
Andropogon
Gryllus „ 244
Ischaemum „ ivi
Angelica
sylvestris „ 79
Anthemis
Cota „ 216
Anthericum
ramosum „ 92

Anthoxanthum
odoratum pag. 7
Anthyllis.
Vulneraria „ 175
Antirrhinum
majus „ 155
Apium
graveolens „ 83
Apocynum
venetum „ 68
Apargia
hastilis „ 194
Arabis
Thaliana „ 164
Arctium
glabrum „ 199
Arenaria
marina „ 111
media „ ivi
rubra „ ivi
serpyllifolia „ ivi
Aristolochia
Aematitis „ 223
rotunda „ ivi
Artemisia
Abrotanum „ 205
caerulescens „ 206
campestris „ 205
paniculata „ ivi
vulgaris „ 206
Arum
italicum pag. 237
Arundo
arenaria „ 36
Donax „ 35
Phragmites „ 36
Asparagus
officinalis „ 93
acutifolius „ 94
Asperugo
procumbens „ 53
Asperula
cynanchica „ 43
Aspidium
Thelypteris „ 255
Filix mas. „ 256
Asplenium
Ruta Muraria „ 256
Trichomanes „ 257
Aster
Tripolium „ 210
Astragalus
glyciphyllos „ 181
Atriplex
laciniata „ 249
patula „ 250
portulacoides „ 249
triangularis „ 250
veneta „ 249
Avena
strigosa „ 35

B

Ballota
nigra pag. 145
Barbula
muralis „ 258
Bellis
perennis „ 214
Berberis
vulgaris „ 98
Betonica
officinalis „ 143
Bidens
tripartita „ 202
Boletus
crispus „ 280
fomentarius „ ivi
Borago
officinalis „ 53
Briza
media pag. 29
Bromus
sterilis „ 31
madritensis „ 32
mollis „ 31
pinnatus „ 32
squarrosus „ 31
Bryonia
dioica „ 238
Bunias
Erucago „ 157
Bupleurum
rotundifolium „ 75
Butomus
umbellatus „ 105
Buxus
sempervirens „ 231

C

Cakile
maritima „ 157
Caltha
palustris „ 136
Camelina
sativa „ 161
Campanula
pyramidalis „ 58
Rapunculus „ 58
Cardamine
hirsuta „ 161
pratensis „ 162

Digitized by Google

Carduus
acanthoides pag. 200
Marianus „ 201
nutans „ 200
Carex
caespitosa „ 229
extensa „ 227
hirta „ 230
muricata „ 226
nitida „ 228
recurva „ 229
tomentosa „ 227
pilulifera „ ivi
vulpina „ 226
paludosa „ 229
panicea „ 228
Carthamus
lanatus. „ 199
Caucalis
Anthriscus „ 77
grandifloru „ 76
Cenomyce
damaecornis „ 278
Centaurea
Calcitrapa „ 218
Cyanus „ 267
Jacea „ 218
paniculata „ 217
Ceramium
attenuatum „ 263
confervoides „ 267
diaphanum pag. 268
elongatum „ 265
fastigiatum „ 269
gigantinum „ 263
hirsutum „ 266
inflexum „ ivi
longissimum „ 262
musciforme „ 264
plicatum „ ivi
setaceum „ 265
spinosum „ 264
torulosum „ 265
uniforme „ 263
virgatum „ 268
Wulfenii „ 267
Cerastium
ovale „ 115
Ceterach
officinarum „ 255
Cheiranthus
Cheiri „ 164
Chelidonium
majus „ 127
Chenopodium
album „ 71
maritimum „ 73
olidum „ 72
polyspermum „ ivi
Scoparia „ 73
urbicum „ 71
viride „ 72

Chlora
perfoliata pag. 102
Chondrilla
juncea „ 193
Chrysanthemum
Leucanthemum „ 215
Chrysocoma
Lynosyris „ 203
Cichorium
Intybus „ 198
Clematis
maritima „ 133
recta „ ivi
Vitaba „ 132
Viticella „ ivi
Clinopodium
vulgare „ 146
Cnicus
arvensis „ 201
lanceolatus „ ivi
Cochlearia
Draba „ 158
Conferva
capillaris „ 273
ciliata „ 274
clathrata „ 270
compressa „ ivi
crinita „ 269
flos aquae „ 271
fracta „ ivi
glomerata „ ivi
intestinalis pag. 269
Linum „ 272
Myriophyllum „ 274
rupestris „ 272
setacea „ 273
subdivisa „ 274
tenax „ 271
Conium
maculatum „ 78
Convallaria
Polygonatum „ 94
Convolvulus
arvensis „ 57
sepium „ ivi
Soldanella „ ivi
Conyza
squarrosa „ 207
Coriandrum
sativum „ 87
Cornus
sanguinea „ 48
Coronila
varia „ 179
Corylus
Avellana „ 237
Crataegus
Oxiacantha „ 123
Crepis
foetida „ 196
pulchra „ ivi
virens „ ivi

Crithmum
maritimum pag. 78
Crypsis
schoenoides „ 17
Cucubalus
Behen „ 108
Cuscuta
vulgaris „ 70
Cynosurus
echinatus „ 24
Cynoglossum
officinale pag. 51
Cyperus
flavescens „ 11
longus „ ivi
Monti „ 12
virescens „ 11
Cytisus
purpureus „ 178
Cynodon
Dactylon „ 23

D

Dactylis
glomerata „ 24
Daedalea
quercina „ 280
Datura
Stramonia „ 61
Daucus
Carota „ 77
Delphinium
Consolida „ 130
Digitaria
sanguinalis „ 22
Dipsacus
sylvestris „ 41
Dorycnium
fruticosum „ 187
Draba
verna „ 160

E

Echinophora
spinosa „ 75
Echium
vulgare „ 53
Epilobium
pubescens „ 101

rosmarinifolium pag. 101
tetragonum „ 102
Equisetum
arvense „ 253
palustre „ 254
Erica
herbacea „ 102
Erigeron
acre „ 208
canadense „ ivi
diversifolium „ ivi
Erodium
Cicutarium „ 166
malacoides „ 167
Eryngium
maritimum „ 74
Erythraea
Centaurium „ 68
Erysimum
officinale „ 163
Evonymus
europaeus „ 65
Eupatorium
canabinum „ 203
Euphorbia
Chamaesice „ 118
Cyparissias „ 120
Helioscopia „ ivi
palustris „ 121
Paralias „ 119
Peplis „ ivi
Peplus „ ivi
platyphyllos „ 120
Euphrasia
Odontites „ 151
officinalis „ ivi

F

Fedia
olitoria „ 8
Festuca
elatior „ 30
Myurus „ 29
uniglumis „ 30
Ficus
Carica „ 252
Fragaria
vesca „ 125
Fuous
Acinaria „ 260
ceranoides „ 261
concatenatus „ ivi
lacer „ ivi
vesiculosus „ 260
Fumaria
officinalis „ 171
parviflora „ 172

G

Galega
officinalis pag. 180
Galeopsis
grandiflora „ 142
Galium
Aparine „ 44
Mollugo „ ivi
palustre „ 43
verum „ 44
Cenista
germanica „ 174
tinctoria „ 173
Genthiana
amarella „ 70
Pneumonanthe „ 69
Geranium
dissectum „ 167
molle „ ivi
pusillum „ 168
Robertianum pag. 169
rotundifolium „ 168
Githago
segetum „ 113
Gladiolus
communis „ 8
Glaucium
luteum „ 127
Glechoma
hederacea „ 140
Globularia
vulgaris „ 40
Gnaphalium
luteo-album „ 207
Gratiola
officinalis „ 5
Gypsophila
Saxifraga „ 107

H

Hedera
Helix „ 65
Helianthemum
Fumana „ 129
vulgare „ 130
Helleborine
cordigera „ 222
Hemerocallis
fulva „ 95

Hibiscus
Trionum pag. 171
Hieracium
cymosum „ 195
florentinum „ ivi
Pilosella „ ivi
Hippocrepis
comosa „ 180
Holcus
arundinaceus „ 246
lanatus „ 247
Hordeum
maritimum „ 38
murinum „ 37
Hottonia
palustris pag. 54
Hyacinthus
comosus „ 94
racemosus „ ivi
Hydrochaeris
Morsus Ranae „ 243
Hyoscyamus
albus „ 62
niger „ ivi
Hypericum
perforatum „ 131
quadrangulare „ ivi
Hypochaeris
radicata „ 197

I

Inula
brittanica „ 211
crithmifolia „ 213
dysentherica „ 212
Helenium „ 211
salicina „ 212
ensifolia „ ivi
viscosa „ 213
Iris
Pseud' Acorus „ 9
Juglans
regia „ 236
Juncus
acutus „ 96
bulbosus „ 97
effusus „ 96
maritimus „ ivi
pilosus „ 97
Juniperus
communis „ 243

K

Koeleria
cristata „ 33

L

Lactuca
Scariola pag. 192
saligna „ ivi
Lagurus
ovatus „ 34
Lamium
album „ 141
amplexicaule „ 142
Orvala „ 141
purpureum „ 142
Lappago
racemosa „ 23
Lapsana
communis „ 198
Lathyrus
Aphaca „ 176
pratensis „ 175
Lemna
minor „ 224
Leontodon
Taraxacum „ 193
palustre „ ivi
Leonurus
Cardiaca „ 145
Lepidium
graminifolium „ 158
Leskea
complanata „ 280
Leucojum
aestivum pag. 89
Ligustrum
vulgare „ 2
Limnetis
pungens „ 15
Linaria
Elatine „ 153
minor „ 154
muralis „ 153
vulgaris „ 154
Linum
catharticum „ 89
maritimum „ 88
tenuifolium „ ivi
Liquiritia
officinalis „ 179
Lithospermum
arvense „ 51
Lolium
perenne „ 39
temulentum „ 40
Lonicera
Caprifolium „ 59
Lotus
siliquosus „ 186
corniculatus „ ivi

Lychnis
Flos Cuculi pag. 114
vespertina „ ivi
Lycopus
vulgaris „ 6
Lysimachia
Nummularia pag. 55
vulgaris „ ivi
Lythrum
Hyssopifolia „ 117
Salicaria „ 116

M

Malva
rotundifolia „ 170
sylvestris „ ivi
Marchantia
polymorpha „ 259
Marsilea
quadrifolia „ 254
Matricaria
Chamomilla „ 215
Medicago
coronata „ 188
Falcata „ 187
lupulina „ 188
maculata „ ivi
marina „ 189
minima „ ivi
rigidula „ ivi
sativa „ 187
Melampyrum
arvense „ 152
Melica
caerulea „ 16
Melitotus
Kochiana „ 182
officinalis „ 181
vulgaris „ ivi
Melissa
Calamintha „ 148
Nepeta „ ivi
officinalis „ ivi
Mentha
aquatica „ 139
gentilis „ ivi
Pulegium „ 140
sylvestris „ 139
Mercurialis
annua „ 242
Mespilus
germanica „ 124
Momordica
Elaterium „ 238
Mucor
herbariorum „ 278
Mucedo „ ivi

Myagrum
rugosum pag. 157

Myosotis
arvensis pag. 50
palustris „ ivi

N

Nymphaea
alba „ 129
lutea „ ivi

O

Oenanthe
fistulosa „ 80
pimpinelloides „ 81
Oenothera
biennis „ 100
Ononis
spinosa „ 174
Ophrys
arachnites „ 121
Orchis
conopsea „ 221
coryophora „ 219
mascula „ 220
Morio „ ivi
pyramidalis „ 219
Origanum
vulgare „ 146
Ornithogalum
umbellatum „ 92
Ornus
europaea „ 2
Orobanche
caryophyllacea „ 156
Osyris
alba „ 240
Oxalis
corniculata „ 112
stricta „ 113

P

Panicum
glaucum „ 20
miliaceum „ 21
Crus Galli „ ivi

verticillatum pag. 20
viride „ ivi
Papaver
Rhoecas „ 128
somniferum „ ivi
Parietaria
officinalis „ 248
Parmelia
parietina „ 277
Parnassia
europaea „ 86
Pastinaca
sativa „ 82
Phalaris
arenaria „ 17
Phellandrium
aquaticum „ 81
Phleum
Phalaris „ 18
pratense „ ivi
Physalis
Alkekengi „ 63
Phytolacca
decandra „ 115
Picris
hieracioides „ 194
Pimpinella
magna „ 83
Plantago
altissima „ 46
Coronopus „ 47
lanceolata pag. 47
major „ 46
maxima „ 45
media „ 46
maritima „ 47
Psyllium „ 48
Poa
annua „ 26
aquatica „ 25
bulbosa „ 26
Eragrostis „ 27
maritima „ 25
megastachia „ 28
pilosa „ 27
pratensis „ 26
rigida „ 28
Polygala
vulgaris „ 172
monspeliensis „ 173
Polygonum
amphybium „ 104
aviculare „ 103
Convolvulus „ 105
Hydropiper „ 104
Persicaria „ ivi
Polypogon
monspeliense „ 19
Populus
alba „ 241
nigra „ ivi

Portulaca
oleracea pag. 116
Potamogeton
lucens „ 49
perfoliatum „ ivi
Potentilla
sylvestris „ 126
verna „ ivi
Poterium
Sanguisorba „ 235
Prismatocarpus
arvensis pag. 59
Prunella
laciniata „ 150
vulgaris „ 149
Prunus
Mahaleb „ 122
spinosa „ ivi
Punica
Granatum „ 121

Q

Quercus
Robur „ 236

R

Ranunculus
acris „ 135
bulbosus „ 134
heterophyllus „ 136
repens „ 135
sceleratus „ 134
Reseda
alba „ 118
lutea „ ivi
Rhamnus
Frangula „ 64
Rhinanthus
Crista Galli „ 152
Rosa
canina „ 37
Rottboellia
incurvata „ 124
Rubia
tinctorum „ 45
Rubus
fruticosus „ 125
Rumex
acutus „ 99
crispus „ 98

S

Saccharum
Ravennae pag. 36
Sagittaria
sagittifolia „ 235
Salicornia
fruticosa „ 1
herbacea „ ivi
Salix
alba „ 240
caprea „ 239
rosmarinifolia „ ivi
Salsola
Kali „ 74
Soda „ 73
Salvia
pratensis „ 6
Salvinia
natans „ 254
Sambucus
Ebulus „ 84
nigra „ 85
Samolus
Valerandi „ 54
Saponaria
officinalis „ 107
Satureja
hortensis „ 138
Saxifraga
tridactylites pag. 106
Scabiosa
columbaria „ 42
stellata „ ivi
Succisa „ 41
Scandix
Pecten „ 82
Schoenus
Mariscus „ 9
mucronatus „ 10
nigricans „ ivi
Scirpus
acicularis „ 12
Holloschoenus „ 13
maritimus „ 14
mucronatus „ ivi
lacustris „ 13
palustris „ 12
romanus „ 13
Scolymus
aggregatus „ 198
Scrophularia
canina „ 155
nodosa „ ivi
Scutellaria
galericulata „ 150

Secale
villosum pag. 38
Sedum
acre „ 112
Senecio
aquaticus „ 209
Jacobaea „ ivi
paludosus „ 210
vulgaris „ 209
Serapias
palustris „ 222
Serratula
tinctoria „ 202
Sherardia
arvensis „ 43
Silene
Otites „ 109
sericea „ ivi
Sinapis
Erucastrum „ 165
Sisymbrium
amphibium „ 162
Sophia „ 163
tenuifolium „ 162
Sium
sulcatum „ 80
Solanum
Dulcamara pag. 63
nigrum „ 64
Sonchus
asper „ 191
maritimus „ ivi
oleraceus „ ivi
Sparganium
ramosum „ 226
Stachys
germanica „ 144
palustris „ ivi
recta „ ivi
sylvatica „ 143
Statice
auriculaefolia „ 87
Limonium „ ivi
reticulata „ ivi
Stellaria
aquatica „ 110
nemorum „ ivi
Stipa
pennata „ 34
Symphytum
officinale „ 52
tuberosum „ ivi

T

Tamarix
gallica „ 85
Tanacetum
vulgare „ 204

Teucrium
Chamaedris pag. 137
montanum „ 138
Polium „ ivi
Thalictrum
angustifolium „ 133
flavum „ 134
Thlaspi
Bursa pastoris „ 159
campestre „ ivi
Thymus
Serpyllum „ 147
Tragopogon
pratense „ 190
Triglochin
palustre „ 99
Trisetum
pratense „ 33
Triticum
junceum pag. 38
repens „ 39
Trifolium
agrarium „ 185
angustifolium „ 183
arvense „ ivi
campestre „ 185
fragiferum „ 184
hybridum „ 182
pratense „ 183
repens „ ivi
Turritis
hirsuta „ 165
Tussilago
Farfara „ 214
Typha
latifolia „ 225

U

Ulmus
campestris „ 71
Ulva.
dichotoma „ 276
Lactuca „ 275
Linza „ 276
purpurea „ 276
Urtica
dioica „ 232
urens „ ivi
Utricularia
vulgaris „ 5

V

Valantia
cruciata pag. 247
tricornis „ 248
Valeriana
dioica „ 7
Verbascum
Blattaria „ 60
sinuatum „ 61
Thapsus „ 60
Verbena
officinalis „ 150
Veronica
agrestis „ 3
Chamaedris „ 3
hederaefolia „ 4
serpillifolia „ ivi
spicata pag. 3
Viburnum
Lantana „ 84
Vicia
angustifolia „ 178
Cracca „ 177
polyphylla „ 176
sativa „ 177
Viola
odorata „ 66
tricolor „ 67
Vincetoxicum
vulgare „ 67
Vitis
vinifera „ 66

X

Xanthium
spinosum „ 233
Strumarium „ ivi

Z

Zostera
marina „ 224

ERRORI:	CORREZIONI.

pag. lin.

3. 4. Ehrentragender E. Aehrentragender E.

4. 5. Da aggiungere:

V. filiformis (Fadenförmiger E.) V. filiforme:
Fiori solitarj, foglie cuoriformi intaccate, più brevi del peduncolo lunghissimo, filiformi, foglie calicine lanceolate, fusto giacente. *Savi Bot. Etrusc. p.* 15.
V. floribus solitariis, foliis cordatis crenatis pedunculo brevioribus, calyciuis lanceolatis, pedunculo filiformi longissimo. *Pers. Syn.* I *p.* 13.
Nasce e fiorisce come nella V. agrestis.

V. arvensis (Feld E.) V. degli Orti:
Fiori solitarj, foglie ovate incise seghettate, le florali lanceolate più lunghe del peduncolo, fusto dritto. *Savi l. c. p.* 17. *Pers. Syn.* I *p.* 13. *Schult. aust.*
Alsine folio hirsutiore, floribus et loculis caulicuiis adhaerentibus. *Bauh. Hist.* III *p.* 367 cum icone.
Nasce negli Orti *e nei luoghi* sassosi; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta annuale.

7. 20. Klechner B. Kleiner B.

8. 5. Da aggiungere:

2. *V. officinalis*. (Officineler B.) V. officinale.
Foglie tutte pennate, con foglioline lanceolate dentate, fusto solcato. *L. Sp. Pers. Syn.* I *p.* 37. *Röhl. germ.* II *p.* 92.
V. sylvestris magna auuatica. *Bauh. Hist.* III *p.* 210.
Phu germanicum. *Fuchs Hist. p.* 853.
Phu minore. *Matth. p.* 44 cum icone.
Nasce in Campalto *appresso i* Fossi; *fiorisce nei mesi di* Maggio *e* Giugno, *ed è* pianta perenne.

8. 8. *F. ololitoria*. *F. olitoria*

12. 1. *C. monti* *C. Monti*

13. 13. *S. hollosclioenus* *S. Holloschoenus*

pag.	lin.		
19.	1.	purpurescente	purpurascente
19.	2.	plantagis	plantaginis
26.	13.	Da aggiungere. *P. trivialis*. (Gemeines R.) F. comune: Pannocchia diffusa, spighette triflore pubescenti alla base, culmo scabro quasi a due tagli, linguetta bislunga. *Pers. Syn.* I *p.* 89. *Röhl. germ.* II *p.* 121. *Savi bot. Etrusc. p.* 57. *Nasce comunemente negli* Orti; *fiorisce nei mesi di* Aprile *e* Maggio, *ed è* pianta perenne.	
29.	22.	Festuca.	FESTUCA
30.	26.	ob tusiuscula	obtusiuscula
35.	8.	Rauch H	Rauh H.
35.	13.	Calicybus	Calycibus
35.	21.	A. *donax*	*A. Donax*
36.	24.	SACHARUM.	SACCHARUM
41.	22.	*S. succisa*	*S. Succisa*
43.	17.	Cynanchicha	Cynanchica
57.	29.	Meerslrands W.	Meerstrands W.
58.	24.	Piramidenartige	Piramidenartige G.
59.	27.	Durchwarsene L.	Durchwachsene L.
65.	23.	*H. helix*	*H. Helix*
68.	22.	ERYTREA	ERYTRAEA
69.	14.	DYGYNIA	DIGYNIA
73.	23.	succolente	succolenti
87.	8.	*Rhöl.*	*Röhl.*
91.	17.	alternamente	alternativamente
97.	9.	Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne *Fusto foglioso*	Giugno *e* Luglio, *ed è* pianta perenne. *Fusto foglioso*.
104.	20.	Hidropiper	Hydropiper
106.	21.	Dreitheliger S.	Dreitheiliger S.
108.	15.	(Aufgeblasener T.C.)	(Aufgeblasener T.) C. genfio.

pag. lin.

109. 26. Da aggiungere:

S. conica. (Kouische L.) S. conica.

Calici del frutto conici striati, foglie lanceolate molli, petali bifidi: *Pers. Syn. p.* 498. *Röhl. germ. p.* 269.

Lychnis sylvestris angustifolia calyculis turgidis striatis. *Zann. Ven. p.* 175. *t.* 108.

Muscipula majori calyci ventricoso similis. *Bauh. Hist.* III *p.* 350 icone.

Nasce a Brondolo *nei luoghi* arenosi; *fiorisce nel mese di* Aprile, *ed è* pianta annuale.

109.	22.	leucosifolio	leucojifolio
110.	11.	Walde S.	Wald S.
111.	8.	cum icon. *Sapon. officinal.*	cum icone aliena
112.	22.	alternamente	alternativamente
118.	10.	*R. luta*	*R. lutea*
121.	20.	Granato	Melagrano
121.	23.	*G. comune*	*M. comune*
122.	23.	Peduncolis	Pedunculis
123.	9.	lanceolate acute	lanceolati acuti
124.	13.	Kund R.	Hund R.
130.	21.	Rittessporn	Rittersporn
144.	17.	Deutscher	Deutscher Z.
147.	27.	*Cal.* arido un poco piano nel margine. Labbro superiore fastigiato	*Cal.* arido un poco piano nel margine, col labbro superiore fastigiato
156.	11.	*caryphyllacea*	*caryophyllacea*
162.		SISIMBRIUM.	SISYMBRIUM.
173.	6.	*monospeliaca*	*monspeliaca*
179.	2.	fogliol. impari petiolate.	foglioline impari, picciolate.
181.	18.	Legumi nudi con due semi nudi	Legumi nudi con due semi
184.	9.	*arvensis*.	*arvense*

pag.	lin.		
195.	23.	(Vielblumis H.)	(Vielblumiges H.)
200.	7.	CARDIUS.	CARDUUS.
205.	1	*Picettacolo*	*Ricettacolo*
213	13.	CRITMUM	CRITHMUM
213.	8.	(Dichblättriger A.)	(Dickblättriger A.)
234	17.	anglie	angliae
243.	9	N.	Nymphea
245.	18.	*Schuit.*	*Schult.*
245.	24.	seesilibus	sessilibus
249.		Venetiänische	Venetianische
260.	19.	dicothoma	dichotoma
264.	9.	rem quasime ottissi	remotissime ottuse
265	6.	Borslenförmigen H.	Borstenförmiger H.
265	24.	Werlängerter H.	Verlängerter H.
268.	22.	dicotomia	dichotomias
270.	1.	semi strangolato-articolati	semistrangolato-articolati
271.	3.	inferormente	inferiormente
276.	16.	annuate	attenuate
280.	8.	Suberoso coriaceus.	Suberoso-coriaceus;

547690



Digitized by Google